3807 Bibl. Mont

<36623732170015 S
<36623732170015
Bayer. Staatsbibliothek

3807 Bibl. Mont

<36623732170015 S

<36623732170015

Bayer. Staatsbibliothek

Physiologie des Menschen

mit
durchgängiger Rücksicht
auf
die comparative
Physiologie der Thiere.

Zu
akademischen Vorlesungen
bearbeitet
von

Ph. Fr. Walther,
der Philosophie, Medicin und Chirurgie Doktor, Königl. Baier. Medicinalrath, öffentl. ordentl. Lehrer der Physiologie, Chirurgie und der chirurg. Clinik, Direktor des chirurgischen und des Augenkranken-Institutes an der Ludwig-Maximilians-Universität, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Zweiter Band.

Landshut. 1808.
bei Philipp Krüll, Universitätsbuchhändler.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Vorrede.

Mit dem zweyten Theile schliefst sich diefs Lehrbuch der Physiologie, nicht die Physiologie des Menschen selbst, welche in dem akademischen Studium des Arztes nur angefangen werden kann, aber durch sein ganzes praktisches Leben fortgesetzt werden, und stets sein erstes und letztes Augenmerk bleiben muss. Das Bestreben des Verfassers war, mehr die konkrete simultane Erscheinung des Lebens an dem menschlichen Organismus, im Momente seiner höchsten und kräftigsten Entwicklung, und somit auf mehr plastische Weise darzustellen. Die successive Erscheinung des Lebens durch die Lebensperioden des einzelnen Menschen und jene der Gattung hindurch, die Mannichfaltigkeit, welche in der menschlichen Gattung durch das in allen Dingen stets rege und lebendige Individualisirungsstreben, durch climatische Einwirkungen u. s. f. entsteht, bleibt der Vorwurf eines später unter dem Titel: Geschichte des menschlichen Lebens — herauszugebenden Werkes.

Wenn es ein Verdienst ist, dass ein zu akademischen Vorlesungen bestimmtes Lehrbuch reich an eigenen neuen Ansichten und Entdeckungen sey; so

darf der Verfaſſer bey der Herausgabe des zweyten Theiles mit etwas mehr Zuverſicht als bey jener des erſten Theiles auftreten. Seine hier aufgeſtellte Theorie des Blutumlaufes, (ſo wie die ſchon im erſten Theile enthaltene ihm eigenthümliche Lehre von der Blutbereitung), der Entzündung, der Sinneverrichtungen, der Sexualfunctionen &c. werden manches im erſten Theile Enthaltene erſt jetzt von der rechten Seite beleuchten, und das früher mangelhaft gebliebene ergänzen.

Dem aufmerkſamen Leſer iſt es wohl nicht verborgen geblieben, daſs die hier mitgetheilten phyſiologiſchen Darſtellungen die Keime zu den fruchtbarſten pathologiſchen und therapeutiſchen Unterſuchungen enthalten. Auch giebt die Einleitung den Grundriſs eines gröſſern und umfaſſendern Werkes, als das hier vorgelegte phyſiologiſche iſt. Die Phyſiologie iſt nur der Erſte Theil der ganzen Medicin; und der Verfaſſer hofft, auch die beyden andern Theile derſelben, die Pathologie und Therapie, nach denſelben und erweiterten Anſichten bearbeitet, dem literäriſchen Publikum vorlegen zu können. Die bereits ausgearbeiteten Elemente der Pathologie und Therapie werden in kurzem im Druck erſcheinen.

Anzeige
derjenigen Schriften,
welche
zur nähern Erläuterung der in dem zweiten Theile behandelten Gegenstände dienen.

Zur Lehre vom Blutumlauf und von der Respiration gehören:

G. Harvey Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Lugd. Bat. 1737. in 4.

Spallanzani Experiences sur la circulation etc. Trad. de l'Italien avec des notes par J. Tourdes. Paris. An 8. in 4.

Ferner die schon Theil I. bey der Lehre von der Blutbereitung angeführten Schriften.

Zur Lehre von der Ortsbewegung.

Alex. v. Humbold Über die gereitzte Muskel und Nervenfaser. Berl. 1799. I u. II Bd. in 8.

J. W. Ritter Beyträge zur nähern Kenntniss des Galvanismus. Jena. besonders II Bd. 3 u. 4tes Stück.

J. Bernoulli De motu musculorum. Venet. 1730. in 4.

Zur Lehre von den Sinne - Verrichtungen und von der Sensibilität überhaupt.

S. Th. Sömmering Icones et descriptio oculi humani. Frankf. 1801. in Fol.

Keyser Mehrere Abhandlungen über die Bildung des Auges; in der ophthalmologischen Bibliothek.

A. Scarpa De auditu et olfactu. Ticini. 1789. in Fol.

S. Th. Sömmering Icones organ. auditus human. Frkf. 1805. in Fol.

—— —— Icones organ. gustus et vocis human. Frankf. 1806. in Fol.

H. W. Nordhof Archiv für den thierischen Magnetism. Jena. 1804. in 8. 2 Hefte.

Zur Lehre von den Geschlechts - Verrichtungen und zur Physiologie des Fötus.

J. F. Ackermann De discrimine sexuum praeter genitalia. Mogunt. 1787. in 8.

G. Harvey Exercitationes de generatione animalium. Lond. 1657. in 4.

Oken Über die Zeugung. Bamb. u. Würzb. 1805. in 8.

Oken und Kieser Beyträge zur vergl. Zoologie, Anatomie, etc. Bamb. u. Würzb. 1806. II Hefte in 4.

S. Th. Sömmering Icones Embryonum human. Frkf. 1799. in Fol.

Fr. Lobstein Essai sur la nutrition du fötus. Strassb. 1802. in 4.

(übers. von Fr. Kestner. Halle. 1804. in 8.)

Zur Lehre von der Verwesung.

G. H. Schubert Ahnungen einer allg. Geschichte des Lebens. Leipz. 1806. im 2ten Th. 1te Abhandlung.

Inhalts-

Inhaltsanzeige
des zweiten Bandes.

		Seite
XIV. Kapitel.	Blutlauf durch die Höhlen des Herzens.	1
XV. Kap.	Blutlauf durch die Arterien.	40
XVI. Kap.	Blutlauf in den Venen.	67
XVII. Kap.	Blutlauf im Capillargefäſsſyſtem.	83
XVIII. Kap.	Verhältniſs der Arterien zu den Venen.	96
XIX. Kap.	Reſpiration.	105
XX. Kap.	Ortsbewegung.	157
XXI. Kap.	Stimme und Sprache.	218
XXII. Kap.	Thieriſche Wärme.	228
XXIII. Kap.	Selbſtgefühl und deſſen Affectionen.	242
XXIV. Kap.	Sinne.	249
XXV. Kap.	Gefühl — Geſchmack — und Geruch.	263
XXVI. Kap.	Gehör.	286

	Seite
XXVII. Kapitel. Gesicht.	301
XXVIII. Kap. Seelenverrichtungen.	338
XXIX. Kap. Schlaf, Wachen, thierischer Magnetismus.	358
XXX. Kap. Zeugung.	366
XXXI. Kap. Schwangerschaft — Physiologie des Fötus.	402
XXXII. Kap. Geburt. Wochenbett. Lactation.	422
Leztes Kapitel. Von dem Tode und von der Fäulniss.	427

Lebens-

Lebensfunctionen.

Classe I.

Lebensfunctionen des Individuums.

Ordnung II.

Functionen des irritabeln Systems.

Gattung 1.

Blutlauf.

XIV. Kapitel.

Blutlauf durch die Höhlen des Herzens.

§. 359.

In allen Dingen ist die zweyte Dimension als Bewegung offenbar. Denn diese ist die Selbstbekräftigung des Bandes von derjenigen Seite, wodurch die Vielheit in den Dingen, das Aussereinander, der reale Raum producirt wird; wodurch das einzelne Ding zu einem andern hinzukömmt, welches der Affirmation nach ihm gleich, als Affirmirtes aber von ihm getrennt und verschieden ist. So wie die erste Dimension Ausdruck des Ergänzungstriebes in den endlichen Dingen ist, und des Bestrebens, mit andern zusammen zu hängen und somit in der Totalität der endlichen Dinge die Identität zu offen-

baren; so ist die zweyte als Subsumtion des Endlichen unter das Unendliche ein lebendiges Bestreben, die Dinge aussereinander zu halten, auf dass sie nicht in dem Centrum ihrer Position in Eins zusammenfallen, — und einem jeden die Seele der Selbstheit, als relative Cohäsion, einzupflanzen. Die zweyte Dimension giebt den Dingen ihre Freyheit und Unabhängigkeit wieder, da die erste durch das Gesetz der Nothwendigkeit sie überwältiget. Die Freyheit jedes Dinges aber offenbart sich durch dessen Bewegung: welche die Befreyung des endlichen Dinges vom empirischen Raume ist. Denn Bewegung ist die relative Einbildung der Zeit in den Raum. Durch sie wird nicht die empirische Zeitbestimmung, das Nacheinander, im Raume, sondern die reinste Simultaneität im Aussereinander offenbar. Die Bewegung ist das Seyn des Dinges in verschiedenen Punkten des Raumes in steter Selbstgleichheit, somit das Bild der Art, wie die Dinge auf wahrhaft absolute Weise aussereinander sind.

§. 360.

Daher wird durch die Bewegung der Raum nicht von seiner unwesentlichen Seite bekräftigt, von welcher angesehen er der Zeit entgegengesetzt ist; sondern eben das Wesen der Zeit wird in dem Raume offenbar, d. h. der Raum wird durch die Bewegung als unendlich gesetzt. Das Bild des Raumes aber ist der Kreis, so wie die Zeit nur die lebendig gewordene Linie ist. Die kreisige Linie ist durch das ewig in sich selbst Wiederkehren, oh-

ne Anfang und ohne Ende, das vollkommenste Abbild der Immanenz der Idee. Wie in jedem Punkte der Peripherie das Centrum ist, aber in jedem auf andere Weise, und so wie die Punkte der Peripherie aussereinander sind, und dennoch alle im Centrum sich gleich; auf solche Weise, und nicht anders sind die Dinge aussereinander.

§. 361.

Immer ist die Centralposition einer Reihe von Dingen, d. h. die unmittelbare Selbstbekräftigung der Idee in ihnen, auch im Centrum der *Bewegung dieser Dinge*; diese nämlich bewegen sich kreisig um das Centrum ihrer Position; und das erste Gesetz der Phoronomie ist dieses: überall, wo zwey Dinge also untereinander verbunden werden, dass das Eine die Centralposition des Andern enthält, d. h. überall, wo höhere kosmische und siderische Beziehungen obwalten, oder wo das Eine die Beseelung von dem Andern erhält, da fängt das Zweyte an sich um das Erste im Kreise zu drehen. Diess nun ist das Gesetz des Umlaufs der Planeten, und dasselbe ist das Gesetz des Blutumlaufes.

Die Muskelbewegung beschreibt durch die beyden Richtungen, nach welchen sie geschieht, Streckung und Beugung, nur die beyden der Richtung nach verschiedenen Hälften einer Kreisbewegung, so dass beyde zusammengenommen, Strekung und Beugung vereint, wieder den ganzen Kreislauf herstellen. Die von Ritter und andern, vorzüglich von

Campetti, beobachteten Erscheinungen der drehenden Bewegung, in welche durch Einwirkung des Organischen, vorzugsweise beseelten, alles mit diesem Verbundene versetzt wird, sind die herrlichsten Offenbarungen dieses Grundgesetzes der Phoronomie. In jenen Erscheinungen giebt sich nicht allein das Schema der Muskelbewegung, sondern noch mehr jenes des Blutumlaufes kund.

§. 362.

Auf solche Weise kreiset das Blut im Organismus, als neu organisch gewordenes: jedes Blutkügelchen nicht nur sich um seine Axe drehend, nach siderischen Gesetzen; sondern auch in progressiver Kreisbewegung. Solche Beseelung ist es, was den Impuls zum Kreislauf des Blutes giebt, und wer sich die Blutmasse in mechanisch mitgetheilter Bewegung durch die Kraft des Herzens und der Blutgefäſse fortgetrieben denkt, der hat wirklich den Organismus, so sehr er sich sonst dagegen verwahren mag, in die vollkommenste hydraulische Maschine verwandelt. Das ganze Gefäſsesystem, mit Herz und Adern, ist nur das Gerüste des Kreislaufes, und empfängt sein Leben von dem Blute, welches in ihm flieſset. Der einzig bestimmende Grund des Kreislaufes ist das Gesetz, daſs alles, was mit dem organischen also verbunden wird, daſs es Beseelung von diesem empfange, sich um dieses, in welchem es das Centrum seiner Position gefunden hat, planetarisch im Kreise zu drehen anfange. — Das gänzlich Unzureichende der bisherigen mechanistischen Vorstellungsweise, um eine wahre Theorie des Kreislaufes zu begrün-

den, ist schon daraus einleuchtend, daſs durch die Propulsivkraft des Herzens, und die Maschineneinrichtung im Gefäſsesystem von der arteriellen Gefäſsebewegung nur einiges, aber nicht alles, z. B. nicht die Seitenbewegung des Blutes, — die venöse Gefäſsebewegung aber durchaus nicht erklärt wird. Es ist auch nicht einmal ein Versuch vorhanden, die letzte zu erklären. Die Venen würden aber gewiſs nicht im Stande seyn, das Blut gegen seine Schwere in die Höhe zu treiben, wenn dieſs nicht selbst das Bestreben hätte, auch die andere Hälfte seiner Kreisbewegung in der regressiven Richtung zu *vollenden*. Daher richtet sich der Kreislauf nach *keinem* einzigen Gesetze der Hydraulik. Die Ungleichheit des Calibers in den Gefäſsen, die Irregularität der Winkel an den Einmündungsstellen der Aeste in den Stamm, der geschlängelte, sinuöse Verlauf der Gefäſse haben nach Spallanzani's Versuchen sehr geringen Einfluſs auf den Kreislauf. Eben so kommen die Länge und der Diameter der Gefäſse, der Widerstand der mehr oder weniger compacten Schlagaderhäute gegen die ausdehnende Kraft der Blutströmung, die specifische Schwere des Blutes sehr wenig in Betrachtung.

§. 363.

Das Kreisige ist die Darstellung der vollkommensten Immanenz der Idee. Wie nun aber die absolute Identität nur in der Form der relativen Trennung der beyden absoluten Einheiten, der realen und idealen, sich darstellt; so geht alle Kreisbewegung in die elliptische über. Denn die

3807 Bibl. Mont

<36623732170015 S

<36623732170015

Bayer. Staatsbibliothek

Physiologie des Menschen

mit durchgängiger Rücksicht auf die comparative Physiologie der Thiere.

Zu akademischen Vorlesungen bearbeitet

von

Ph. Fr. Walther,

der Philosophie, Medicin und Chirurgie Doktor, Königl. Baier. Medicinalrath, öffentl. ordentl. Lehrer der Physiologie, Chirurgie und der chirurg. Clinik, Direktor des chirurgischen und des Augenkranken - Institutes an der Ludwig - Maximilians - Universität, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Zweiter Band.

Landshut. 1808.

bei Philipp Krüll, Universitätsbuchhändler.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Vorrede.

Mit dem zweyten Theile ſchlieſst ſich dieſs Lehrbuch der Phyſiologie, nicht die Phyſiologie des Menſchen ſelbſt, welche in dem akademiſchen Studium des Arztes nur angefangen werden kann, aber durch ſein ganzes praktiſches Leben fortgeſetzt werden, und ſtets ſein erſtes und letztes Augenmerk bleiben muſs. Das Beſtreben des Verfaſſers war, mehr die konkrete ſimultane Erſcheinung des Lebens an dem menſchlichen Organismus, im Momente ſeiner höchſten und kräftigſten Entwicklung, und ſomit auf mehr plaſtiſche Weiſe darzuſtellen. Die ſucceſſive Erſcheinung des Lebens durch die Lebensperioden des einzelnen Menſchen und jene der Gattung hindurch, die Mannichfaltigkeit, welche in der menſchlichen Gattung durch das in allen Dingen ſtets rege und lebendige Individualiſirungsſtreben, durch climatiſche Einwirkungen u. ſ. f. entſteht, bleibt der Vorwurf eines ſpäter unter dem Titel: Geſchichte des menſchlichen Lebens — herauszugebenden Werkes.

Wenn es ein Verdienſt iſt, daſs ein zu akademiſchen Vorleſungen beſtimmtes Lehrbuch reich an eigenen neuen Anſichten und Entdeckungen ſey; ſo

darf der Verfaſſer bey der Herausgabe des zweyten Theiles mit etwas mehr Zuverſicht als bey jener des erſten Theiles auftreten. Seine hier aufgeſtellte Theorie des Blutumlaufes, (ſo wie die ſchon im erſten Theile enthaltene ihm eigenthümliche Lehre von der Blutbereitung), der Entzündung, der Sinneverrichtungen, der Sexualfunctionen &c. werden manches im erſten Theile Enthaltene erſt jetzt von der rechten Seite beleuchten, und das früher mangelhaft gebliebene ergänzen.

Dem aufmerkſamen Leſer iſt es wohl nicht verborgen geblieben, daſs die hier mitgetheilten phyſiologiſchen Darſtellungen die Keime zu den fruchtbarſten pathologiſchen und therapeutiſchen Unterſuchungen enthalten. Auch giebt die Einleitung den Grundriſs eines gröſſern und umfaſſendern Werkes, als das hier vorgelegte phyſiologiſche iſt. Die Phyſiologie iſt nur der Erſte Theil der ganzen Medicin; und der Verfaſſer hofft, auch die beyden andern Theile derſelben, die Pathologie und Therapie, nach denſelben und erweiterten Anſichten bearbeitet, dem literäriſchen Publikum vorlegen zu können. Die bereits ausgearbeiteten Elemente der Pathologie und Therapie werden in kurzem im Druck erſcheinen.

Anzeige
derjenigen Schriften,
welche
zur nähern Erläuterung der in dem zweiten Theile behandelten Gegenstände dienen.

Zur Lehre vom Blutumlauf und von der Respiration gehören:

G. Harvey Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Lugd. Bat. 1737. in 4.

Spallanzani Experiences sur la circulation etc. Trad. de l'Italien avec des notes par J. Tourdes. Paris. An 8. in 4.

Ferner die schon Theil I. bey der Lehre von der Blutbereitung angeführten Schriften.

Zur Lehre von der Ortsbewegung.

Alex. v. Humbold Über die gereitzte Muskel und Nervenfaser. Berl. 1799. I u. II Bd. in 8.

J. W. Ritter Beyträge zur nähern Kenntniss des Galvanismus. Jena. besonders II Bd. 3 u. 4tes Stück.

J. Bernoulli De motu musculorum. Venet. 1730. in 4.

Zur Lehre von den Sinne-Verrichtungen und von der Sensibilität überhaupt.

S. Th. Sömmering Icones et descriptio oculi humani. Frankf. 1801. in Fol.

Keyser Mehrere Abhandlungen über die Bildung des Auges; in der ophthalmologischen Bibliothek.

A. Scarpa De auditu et olfactu. Ticini. 1789. in Fol.

S. Th. Sömmering Icones organ. auditus human. Frkf. 1805. in Fol.

—— —— Icones organ. guſtus et vocis human. Frankf. 1806. in Fol.

H. W. Nordhof Archiv für den thieriſchen Magnetism. Jena. 1804. in 8. 2 Hefte.

Zur Lehre von den Geſchlechts - Verrichtungen und zur Phyſiologie des Fötus.

J. F. Ackermann De diſcrimine ſexuum praeter genitalia. Mogunt. 1787. in 8.

G. Harvey Exercitationes de generatione animalium. Lond. 1657. in 4.

Oken Über die Zeugung. Bamb. u. Würzb. 1805. in 8.

Oken und Kieser Beyträge zur vergl. Zoologie, Anatomie, etc. Bamb. u. Würzb. 1806. II Hefte in 4.

S. Th. Sömmering Icones Embryonum human. Frkf. 1799. in Fol.

Fr. Lobstein Eſſai ſur la nutrition du fötus. Straſsb. 1802. in 4.

(überſ. von Fr. Kestner. Halle. 1804. in 8.)

Zur Lehre von der Verweſung.

G. H. Schubert Ahnungen einer allg. Geſchichte des Lebens. Leipz. 1806. im 2ten Th. 1te Abhandlung.

Inhalts-

Inhaltsanzeige
des zweiten Bandes.

		Seite
XIV. Kapitel.	Blutlauf durch die Höhlen des Herzens.	1
XV. Kap.	Blutlauf durch die Arterien.	40
XVI. Kap.	Blutlauf in den Venen.	67
XVII. Kap.	Blutlauf im Capillargefäſsſyſtem.	83
XVIII. Kap.	Verhältniſs der Arterien zu den Venen.	96
XIX. Kap.	Reſpiration.	105
XX. Kap.	Ortsbewegung.	157
XXI. Kap.	Stimme und Sprache.	218
XXII. Kap.	Thieriſche Wärme.	228
XXIII. Kap.	Selbſtgefühl und deſſen Affectionen.	242
XXIV. Kap.	Sinne.	249
XXV. Kap.	Gefühl — Geſchmack — und Geruch.	263
XXVI. Kap.	Gehör.	286

Seite

XXVII. Kapitel. Gesicht. 301

XXVIII. Kap. Seelenverrichtungen. 338

XXIX. Kap. Schlaf, Wachen, thierischer Magnetismus. 358

XXX. Kap. Zeugung. 366

XXXI. Kap. Schwangerschaft. — Physiologie des Fötus. 402

XXXII. Kap. Geburt. Wochenbett. Lactation. 422

Leztes Kapitel. Von dem Tode und von der Fäulniss. 427

Lebens-

Lebensfunctionen.

Classe I.

Lebensfunctionen des Individuums.

Ordnung II.

Functionen des irritabeln Systems.

Gattung 1.

B l u t l a u f.

XIV. Kapitel.

Blutlauf durch die Höhlen des Herzens.

§. 359.

In allen Dingen ist die zweyte Dimension als Bewegung offenbar. Denn diese ist die Selbstbekräftigung des Bandes von derjenigen Seite, wodurch die Vielheit in den Dingen, das Aussereinander, der reale Raum producirt wird; wodurch das einzelne Ding zu einem andern hinzukömmt, welches der Affirmation nach ihm gleich, als Affirmirtes aber von ihm getrennt und verschieden ist. So wie die erste Dimension Ausdruck des Ergänzungstriebes in den endlichen Dingen ist, und des Bestrebens, mit andern zusammen zu hängen und somit in der Totalität der endlichen Dinge die Identität zu offen-

baren; so ist die zweyte als Subsumtion des Endlichen unter das Unendliche ein lebendiges Bestreben, die Dinge aussereinander zu halten, auf dass sie nicht in dem Centrum ihrer Position in Eins zusammenfallen, — und einem jeden die Seele der Selbstheit, als relative Cohäsion, einzupflanzen. Die zweyte Dimension giebt den Dingen ihre Freyheit und Unabhängigkeit wieder, da die erste durch das Gesetz der Nothwendigkeit sie überwältiget. Die Freyheit jedes Dinges aber offenbart sich durch dessen Bewegung: welche die Befreyung des endlichen Dinges vom empirischen Raume ist. Denn Bewegung ist die relative Einbildung der Zeit in den Raum. Durch sie wird nicht die empirische Zeitbestimmung, das Nacheinander, im Raume, sondern die reinste Simultaneität im Aussereinander offenbar. Die Bewegung ist das Seyn des Dinges in verschiedenen Punkten des Raumes in steter Selbstgleichheit, somit das Bild der Art, wie die Dinge auf wahrhaft absolute Weise aussereinander sind.

§. 360.

Daher wird durch die Bewegung der Raum nicht von seiner unwesentlichen Seite bekräftigt, von welcher angesehen er der Zeit entgegengesetzt ist; sondern eben das Wesen der Zeit wird in dem Raume offenbar, d. h. der Raum wird durch die Bewegung als unendlich gesetzt. Das Bild des Raumes aber ist der Kreis, so wie die Zeit nur die lebendig gewordene Linie ist. Die kreisige Linie ist durch das ewig in sich selbst Wiederkehren, oh-

ne Anfang und ohne Ende, das vollkommenste Abbild der Immanenz der Idee. Wie in jedem Punkte der Peripherie das Centrum ist, aber in jedem auf andere Weise, und so wie die Punkte der Peripherie aussereinander sind, und dennoch alle im Centrum sich gleich; auf solche Weise, und nicht anders sind die Dinge aussereinander.

§. 361.

Immer ist die Centralposition einer Reihe von Dingen, d. h. die unmittelbare Selbstbekräftigung der Idee in ihnen, auch im Centrum der Bewegung dieser Dinge; diese nämlich bewegen sich kreisig um das Centrum ihrer Position; und das erste Gesetz der Phoronomie ist dieses: überall, wo zwey Dinge also untereinander verbunden werden, dass das Eine die Centralposition des Andern enthält, d. h. überall, wo höhere kosmische und siderische Beziehungen obwalten, oder wo das Eine die Beseelung von dem Andern erhält, da fängt das Zweyte an sich um das Erste im Kreise zu drehen. Diess nun ist das Gesetz des Umlaufs der Planeten, und dasselbe ist das Gesetz des Blutumlaufes.

Die Muskelbewegung beschreibt durch die beyden Richtungen, nach welchen sie geschieht, Streckung und Beugung, nur die beyden der Richtung nach verschiedenen Hälften einer Kreisbewegung, so dass beyde zusammengenommen, Strekung und Beugung vereint, wieder den ganzen Kreislauf herstellen. Die von **Ritter** und andern, vorzüglich von

Campetti, beobachteten Erſcheinungen der drehenden Bewegung, in welche durch Einwirkung des Organiſchen, vorzugsweiſe beſeelten, alles mit dieſem Verbundene verſetzt wird, ſind die herrlichſten Offenbarungen dieſes Grundgeſetzes der Phoronomie. In jenen Erſcheinungen giebt ſich nicht allein das Schema der Muskelbewegung, ſondern noch mehr jenes des Blutumlaufes kund.

§. 362.

Auf ſolche Weiſe kreiſet das Blut im Organismus, als neu organiſch gewordenes: jedes Blutkügelchen nicht nur ſich um ſeine Axe drehend, nach ſideriſchen Geſetzen; ſondern auch in progreſſiver Kreisbewegung. Solche Beſeelung iſt es, was den Impuls zum Kreislauf des Blutes giebt, und wer ſich die Blutmaſſe in mechaniſch mitgetheilter Bewegung durch die Kraft des Herzens und der Blutgefäſse fortgetrieben denkt, der hat wirklich den Organismus, ſo ſehr er ſich ſonſt dagegen verwahren mag, in die vollkommenſte hydrauliſche Maſchine verwandelt. Das ganze Gefäſseſyſtem, mit Herz und Adern, iſt nur das Gerüſte des Kreislaufes, und empfängt ſein Leben von dem Blute, welches in ihm fließet. Der einzig beſtimmende Grund des Kreislaufes iſt das Geſetz, daſs alles, was mit dem organiſchen alſo verbunden wird, daſs es Beſeelung von dieſem empfange, ſich um dieſes, in welchem es das Centrum ſeiner Poſition gefunden hat, planetariſch im Kreiſe zu drehen anfange. — Das gänzlich Unzureichende der bisherigen mechaniſtiſchen Vorſtellungsweiſe, um eine wahre Theorie des Kreislaufes zu begrün-

den, ist schon daraus einleuchtend, dass durch die Propulsivkraft des Herzens, und die Maschineneinrichtung im Gefässesystem von der arteriellen Gefässebewegung nur einiges, aber nicht alles, z. B. nicht die Seitenbewegung des Blutes, — die venöse Gefässebewegung aber durchaus nicht erklärt wird. Es ist auch nicht einmal ein Versuch vorhanden, die letzte zu erklären. Die Venen würden aber gewiss nicht im Stande seyn, das Blut gegen seine Schwere in die Höhe zu treiben, wenn diess nicht selbst das Bestreben hätte, auch die andere Hälfte seiner Kreisbewegung in der regressiven Richtung zu vollenden. Daher richtet sich der Kreislauf nach keinem einzigen Gesetze der Hydraulik. Die Ungleichheit des Calibers in den Gefässen, die Irregularität der Winkel an den Einmündungsstellen der Aeste in den Stamm, der geschlängelte, sinuöse Verlauf der Gefässe haben nach Spallanzani's Versuchen sehr geringen Einfluss auf den Kreislauf. Eben so kommen die Länge und der Diameter der Gefässe, der Widerstand der mehr oder weniger compacten Schlagaderhäute gegen die ausdehnende Kraft der Blutströmung, die specifische Schwere des Blutes sehr wenig in Betrachtung.

§. 363.

Das Kreisige ist die Darstellung der vollkommensten Immanenz der Idee. Wie nun aber die absolute Identität nur in der Form der relativen Trennung der beyden absoluten Einheiten, der realen und idealen, sich darstellt; so geht alle Kreisbewegung in die elliptische über. Denn die

beyden Brennpunkte der Ellipſe ſtellen nur in relativer Duplicität, was das Centrum des Kreiſes in der Identität dar. So iſt die Bahn der Planeten elliptiſch, und wirklich iſt auch die Figur des Gefäſseſyſtems nicht vollkommen gerundet und kreiſig; die Gefäſsebewegung in dieſem iſt nicht eigentlich Kreisbewegung; ſondern die Totalgeſtaltung des Gefäſseſyſtems iſt die Ellipſe, die Bahne der Blutkügelchen iſt elliptiſch; nämlich in der Ellipſe herrſchen die beyden Brennpunkte, jeder als ein untergeordnetes Centrum für ſich. An der Eygeſtalt iſt das Eine Ende das contrahirte, in ſich zurückgehende, der Apex aber iſt das Expandirte, aus ſich hervortretende Ende. Die beyden Brennpunkte der Ellipſe werden hier durch die beyden Gefäſspole, den arteriellen und den venöſen, repräſentirt.

§. 364.

Es giebt aber nur Einen Kreislauf des Blutes. Der ſogenannte groſse und kleine, der Aortenkreislauf und der Lungenkreislauf ſtellen zuſammengenommen nur Eine Kreisbewegung des Blutes her; keiner von beyden iſt kreiſig in ſich vollendet, und in ſich ſelbſt wiederkehrend. Jeder ergänzt den andern und kehrt in ihm wieder. Denn alle Bewegung iſt nur nach zwey ſich entgegengeſetzten Richtungen möglich; von der Linken zur Rechten, und umgekehrt: jene iſt ein unendliches Expanſions - Streben, dieſe iſt ein ewiges in ſich ſelbſt Wiederkehren; und ſo wie das Licht nur das Beſtreben der Subſtanz iſt, ſich auszubreiten, und ſich

in den Dingen zu entfalten, die Schwere aber ein ewiges Wiederkehren der Subſtanz in den Dingen; ſo iſt die Möglichkeit aller Bewegung durch die zwey Lebensprincipien der Dinge, das Licht und die Schwere, urbildlich dargeſtellt. In dieſer aber erſcheint die Subſtanz äuſſerlich ruhend, in jenem in unendlicher Bewegung. Die expanſive Bewegung iſt daher auch die Bewegung κατ' Εξοχην, die auch in ihrer Beſonderheit wieder das Weſen der Bewegung darſtellende, von daher die poſitive, da hingegen die contractive, gleich der Schwere, mehr Bewegung in der Ruhe, negative Bewegung iſt. Alle Gefäſsebewegung iſt daher nur entweder arterielle, poſitive, expanſive, oder venöſe, negative, contractive Bewegung. Die erſte repräſentirt die Lichtſeite, die andere die Nachtſeite des Gefäſseſyſtems.

§. 365.

Nämlich, da im Blute Herz und Arterie und Vene in Eines zuſammenfallen, das Blut von daher das erſte, lebenskräftigſte und belebende im Gefäſseſyſtem iſt, ſo erhält jedes Gefäſs ſeine beſondere Bedeutung von dem Blute, welches daſſelbe führt; und es giebt daher nur zweyerley Gefäſse: — Gefäſse zur Fortbewegung des rothen, und Gefäſse zur Fortbewegung des ſchwarzen Blutes. Auf die arterielle Seite fallen die Lungenvenen, der Lungenvenenſack, der hintere Ventrikel, die Aorte und ihre Verzweigungen bis zu dem Capillargefäſseſyſtem. — Zur venöſen Hälfte gehören die beyden Hohladern mit ihren Wurzeläſten, der vordere Vorhof, der vordere Ventrikel, und die

Lungenarterien. Nämlich, ſo wie das Herz den Gattungscharakter des Gefäſseſyſtems überhaupt ausdrückt, ſo bezeichnet der vordere Ventrikel den Gattungscharakter der Venoſität; der hintere aber den Gattungscharakter der Arteriellität, und ſomit iſt in der Bildung des Herzens der generiſche Charakter der beyden Gefäſsformationen bezeichnet. Von dem hintern Ventrikel aus entwickelt ſich die Arteriellität, da jeder Theil im Organismus dem Ganzen gleich iſt, wieder unter gedoppelter Form. Die Arteriellität unter der arteriellen Gefäſseform iſt ausgedrückt in der Bildung der Aorte und ihrer Verzweigungen: unter der venöſen Form aber iſt ſie dargeſtellt in der Bildung der Lungen - Venen, welche arterielle Venen ſind, und, ſo wie die Arterien überhaupt, ein oxydirtes Blut führen. — Eben ſo entwickelt ſich die Venoſität von dem vordern Ventrikel aus unter gedoppelter Form. Sie geſtaltet ſich unter der arteriellen Gefäſseform in den Lungenarterien, welche venöſe Arterien ſind. Sie geſtaltet ſich unter der venöſen Gefäſseform in der Bildung der Hohladern und ihrer Verzweigungen.

§. 366.

Das Gefäſseſyſtem geht ſomit in arterielle Arterien und in venöſe Arterien, in arterielle Venen und in venöſe Venen auseinander. Alle aber ſind auf ſolche Weiſe in einander aufgenommen und verſchlungen, daſs dadurch nur Eine elliptiſche Bahn für den Blutumlauf entſteht. Der Lungenkreislauf iſt überall, auch in den höheren Thieren, nur eine Fraction des groſsen Kreislaufes,

und dessen Ergänzung. Das Aortensystem, das Hohladersystem, das Lungenschlagadersystem und das Lungenblutadersystem stellen, jedes einen besondern Quadranten des Kreises dar, welchen der Blutumlauf beschreibt.

§. 367.

So wie der ganze Kreislauf des Blutes vorzugsweise ein electrischer Prozefs (ein Electricitäts- und Wärmeleitungsprozefs) ist; so ist die venöse Gefäfsebewegung (da im electrischen Prozesse sich auch der magnetische als Moment der Adhäsion, und in allem Höhern das Niedere wiederholt) das magnetische; — die arterielle Gefäfsebewegung aber ist das electrische Moment. Denn das Wesen der venösen Gefäfsebildung ist Contractions-Streben, so wie im magnetischen Prozesse ein fixirtes und bleibendes Uebergewicht der Contraction ist. Das Wesen der arteriellen Gefäfsebildung aber ist Expansions-Streben. Daher ist jenes Gefäfsegeschlecht anscheinend ruhend, dieses aber ist vorzugsweise thätig. Die Arterien repräsentiren die positive, expansive Seite des Gefäfsesystems; die Venen aber dessen negative, contractive Seite. In den Venen geschieht die Fortleitung des Blutes nach demselben Gesetze, welches das Aufsteigen des Pflanzensaftes in den Pflanzen bestimmt. Der venöse Blutlauf ist eine stets sich erneuende Einsaugung. Nur durch ihren Gegensatz mit den Arterien sind die Venen in das irritable System aufgenommen. Ohne diesen sind sie als Lymphgefäfse in das reproductive System versenkt. Das Blut verhält sich weder posi-

darf der Verfaſſer bey der Herausgabe des zweyten Theiles mit etwas mehr Zuverſicht als bey jener des erſten Theiles auftreten. Seine hier aufgeſtellte Theorie des Blutumlaufes, (ſo wie die ſchon im erſten Theile enthaltene ihm eigenthümliche Lehre von der Blutbereitung), der Entzündung, der Sinneverrichtungen, der Sexualfunctionen &c. werden manches im erſten Theile Enthaltene erſt jetzt von der rechten Seite beleuchten, und das früher mangelhaft gebliebene ergänzen.

Dem aufmerkſamen Leſer iſt es wohl nicht verborgen geblieben, daſs die hier mitgetheilten phyſiologiſchen Darſtellungen die Keime zu den fruchtbarſten pathologiſchen und therapeutiſchen Unterſuchungen enthalten. Auch giebt die Einleitung den Grundriſs eines gröſſern und umfaſſendern Werkes, als das hier vorgelegte phyſiologiſche iſt. Die Phyſiologie iſt nur der Erſte Theil der ganzen Medicin; und der Verfaſſer hofft, auch die beyden andern Theile derſelben, die Pathologie und Therapie, nach denſelben und erweiterten Anſichten bearbeitet, dem literäriſchen Publikum vorlegen zu können. Die bereits ausgearbeiteten Elemente der Pathologie und Therapie werden in kurzem im Druck erſcheinen.

Anzeige
derjenigen Schriften,
welche
zur nähern Erläuterung der in dem zweiten Theile behandelten Gegenstände dienen.

Zur Lehre vom Blutumlauf und von der Respiration gehören:

G. Harvey Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Lugd. Bat. 1737. in 4.

Spallanzani Experiences sur la circulation etc. Trad. de l'Italien avec des notes par J. Tourdes. Paris. An 8. in 4.

Ferner die schon Theil I. bey der Lehre von der Blutbereitung angeführten Schriften.

Zur Lehre von der Ortsbewegung.

Alex. v. Humbold Über die gereitzte Muskel und Nervenfaser. Berl. 1799. I u. II Bd. in 8.

J. W. Ritter Beyträge zur nähern Kenntniss des Galvanismus. Jena. besonders II Bd. 3 u. 4tes Stück.

J. Bernoulli De motu musculorum. Venet. 1730. in 4.

Zur Lehre von den Sinne - Verrichtungen und von der Sensibilität überhaupt.

S. Th. Sömmering Icones et descriptio oculi humani. Frankf. 1801. in Fol.

Keyser Mehrere Abhandlungen über die Bildung des Auges; in der ophthalmologischen Bibliothek.

A. Scarpa De auditu et olfactu. Ticini. 1789. in Fol.

S. Th. Sömmering Icones organ. auditus human. Frkf. 1805. in Fol.

—— —— Icones organ. gustus et vocis human. Frankf. 1806. in Fol.

H. W. Nordhof Archiv für den thierischen Magnetism. Jena. 1804. in 8. 2 Hefte.

Zur Lehre von den Geschlechts-Verrichtungen und zur Physiologie des Fötus.

J. F. Ackermann De discrimine sexuum praeter genitalia. Mogunt. 1787. in 8.

G. Harvey Exercitationes de generatione animalium. Lond. 1657. in 4.

Oken Über die Zeugung. Bamb. u. Würzb. 1805. in 8.

Oken und Kieser Beyträge zur vergl. Zoologie, Anatomie, etc. Bamb. u. Würzb. 1806. II Hefte in 4.

S. Th. Sömmering Icones Embryonum human. Frkf. 1799. in Fol.

Fr. Lobstein Essai sur la nutrition du fötus. Strasb. 1802. in 4.

(übers. von Fr. Kestner. Halle. 1804. in 8.)

Zur Lehre von der Verwesung.

G. H. Schubert Ahnungen einer allg. Geschichte des Lebens. Leipz. 1806. im 2ten Th. 1te Abhandlung.

Inhalts-

Inhaltsanzeige

des zweiten Bandes.

		Seite
XIV. Kapitel.	Blutlauf durch die Höhlen des Herzens.	1
XV. Kap.	Blutlauf durch die Arterien.	40
XVI. Kap.	Blutlauf in den Venen.	67
XVII. Kap.	Blutlauf im Capillargefäſsſyſtem.	83
XVIII. Kap.	Verhältniſs der Arterien zu den Venen.	96
XIX. Kap.	Reſpiration.	105
XX. Kap.	Ortsbewegung.	157
XXI. Kap.	Stimme und Sprache.	218
XXII. Kap.	Thieriſche Wärme.	228
XXIII. Kap.	Selbſtgefühl und deſſen Affectionen.	242
XXIV. Kap.	Sinne.	249
XXV. Kap.	Gefühl — Geſchmack — und Geruch.	263
XXVI. Kap.	Gehör.	286

Seite

XXVII. Kapitel. Geſicht. 301

XXVIII. Kap. Seelenverrichtungen. 338

XXIX. Kap. Schlaf, Wachen, thieriſcher Magnetismus. 358

XXX. Kap. Zeugung. 366

XXXI. Kap. Schwangerſchaft — Phyſiologie des Fötus. 402

XXXII. Kap. Geburt. Wochenbett. Lactation. 422

Leztes Kapitel. Von dem Tode und von der Fäulniſs. 427

Lebensfunctionen.

Classe I.

Lebensfunctionen des Individuums.

Ordnung II.

Functionen des irritabeln Systems.

Gattung 1.

Blutlauf.

XIV. Kapitel.

Blutlauf durch die Höhlen des Herzens.

§. 359.

In allen Dingen ist die zweyte Dimension als Bewegung offenbar. Denn diese ist die Selbstbekräftigung des Bandes von derjenigen Seite, wodurch die Vielheit in den Dingen, das Aussereinander, der reale Raum producirt wird; wodurch das einzelne Ding zu einem andern hinzukömmt, welches der Affirmation nach ihm gleich, als Affirmirtes aber von ihm getrennt und verschieden ist. So wie die erste Dimension Ausdruck des Ergänzungstriebes in den endlichen Dingen ist, und des Bestrebens, mit andern zusammen zu hängen und somit in der Totalität der endlichen Dinge die Identität zu offen-

baren; so ist die zweyte als Subsumtion des Endlichen unter das Unendliche ein lebendiges Bestreben, die Dinge aussereinander zu halten, auf dass sie nicht in dem Centrum ihrer Position in Eins zusammenfallen, — und einem jeden die Seele der Selbstheit, als relative Cohäsion, einzupflanzen. Die zweyte Dimension giebt den Dingen ihre Freyheit und Unabhängigkeit wieder, da die erste durch das Gesetz der Nothwendigkeit sie überwältiget. Die Freyheit jedes Dinges aber offenbart sich durch dessen Bewegung: welche die Befreyung des endlichen Dinges vom empirischen Raume ist. Denn Bewegung ist die relative Einbildung der Zeit in den Raum. Durch sie wird nicht die empirische Zeitbestimmung, das Nacheinander, im Raume, sondern die reinste Simultaneität im Aussereinander offenbar. Die Bewegung ist das Seyn des Dinges in verschiedenen Punkten des Raumes in steter Selbstgleichheit, somit das Bild der Art, wie die Dinge auf wahrhaft absolute Weise aussereinander sind.

§. 360.

Daher wird durch die Bewegung der Raum nicht von seiner unwesentlichen Seite bekräftigt, von welcher angesehen er der Zeit entgegengesetzt ist; sondern eben das Wesen der Zeit wird in dem Raume offenbar, d. h. der Raum wird durch die Bewegung als unendlich gesetzt. Das Bild des Raumes aber ist der Kreis, so wie die Zeit nur die lebendig gewordene Linie ist. Die kreisige Linie ist durch das ewig in sich selbst Wiederkehren, oh-

ne Anfang und ohne Ende, das vollkommenste Abbild der Immanenz der Idee. Wie in jedem Punkte der Peripherie das Centrum ist, aber in jedem auf andere Weise, und so wie die Punkte der Peripherie aussereinander sind, und dennoch alle im Centrum sich gleich; auf solche Weise, und nicht anders sind die Dinge aussereinander.

§. 361.

Immer ist die Centralposition einer Reihe von Dingen, d. h. die unmittelbare Selbstbekräftigung der Idee in ihnen, auch im Centrum der Bewegung dieser Dinge; diese nämlich bewegen sich kreisig um das Centrum ihrer Position; und das erste Gesetz der Phoronomie ist dieses: überall, wo zwey Dinge also untereinander verbunden werden, dass das Eine die Centralposition des Andern enthält, d. h. überall, wo höhere kosmische und siderische Beziehungen obwalten, oder wo das Eine die Beseelung von dem Andern erhält, da fängt das Zweyte an sich um das Erste im Kreise zu drehen. Diess nun ist das Gesetz des Umlaufs der Planeten, und dasselbe ist das Gesetz des Blutumlaufes.

Die Muskelbewegung beschreibt durch die beyden Richtungen, nach welchen sie geschieht, Streckung und Beugung, nur die beyden der Richtung nach verschiedenen Hälften einer Kreisbewegung, so dass beyde zusammengenommen, Strekung und Beugung vereint, wieder den ganzen Kreislauf herstellen. Die von Ritter und andern, vorzüglich von

Campetti, beobachteten Erſcheinungen der drehenden Bewegung, in welche durch Einwirkung des Organiſchen, vorzugsweiſe beſeelten, alles mit dieſem Verbundene verſetzt wird, ſind die herrlichſten Offenbarungen dieſes Grundgeſetzes der Phoronomie. In jenen Erſcheinungen giebt ſich nicht allein das Schema der Muskelbewegung, ſondern noch mehr jenes des Blutumlaufes kund.

§. 362.

Auf ſolche Weiſe kreiſet das Blut im Organismus, als neu organiſch gewordenes: jedes Blutkügelchen nicht nur ſich um ſeine Axe drehend, nach ſideriſchen Geſetzen; ſondern auch in progreſſiver Kreisbewegung. Solche Beſeelung iſt es, was den Impuls zum Kreislauf des Blutes giebt, und wer ſich die Blutmaſſe in mechaniſch mitgetheilter Bewegung durch die Kraft des Herzens und der Blutgefäſse fortgetrieben denkt, der hat wirklich den Organismus, ſo ſehr er ſich ſonſt dagegen verwahren mag, in die vollkommenſte hydrauliſche Maſchine verwandelt. Das ganze Gefäſseſyſtem, mit Herz und Adern, iſt nur das Gerüſte des Kreislaufes, und empfängt ſein Leben von dem Blute, welches in ihm flieſset. Der einzig beſtimmende Grund des Kreislaufes iſt das Geſetz, daſs alles, was mit dem organiſchen alſo verbunden wird, daſs es Beſeelung von dieſem empfange, ſich um dieſes, in welchem es das Centrum ſeiner Poſition gefunden hat, planetariſch im Kreiſe zu drehen anfange. — Das gänzlich Unzureichende der bisherigen mechaniſtiſchen Vorſtellungsweiſe, um eine wahre Theorie des Kreislaufes zu begrün-

den, ist schon daraus einleuchtend, dass durch die Propulsivkraft des Herzens, und die Maschineneinrichtung im Gefässesystem von der arteriellen Gefässebewegung nur einiges, aber nicht alles, z. B. nicht die Seitenbewegung des Blutes, — die venöse Gefässebewegung aber durchaus nicht erklärt wird. Es ist auch nicht einmal ein Versuch vorhanden, die letzte zu erklären. Die Venen würden aber gewiss nicht im Stande seyn, das Blut gegen seine Schwere in die Höhe zu treiben, wenn diess nicht selbst das Bestreben hätte, auch die andere Hälfte seiner Kreisbewegung in der regressiven Richtung zu vollenden. Daher richtet sich der Kreislauf nach keinem einzigen Gesetze der Hydraulik. Die Ungleichheit des Calibers in den Gefässen, die Irregularität der Winkel an den Einmündungsstellen der Aeste in den Stamm, der geschlängelte, sinuöse Verlauf der Gefässe haben nach Spallanzani's Versuchen sehr geringen Einfluss auf den Kreislauf. Eben so kommen die Länge und der Diameter der Gefässe, der Widerstand der mehr oder weniger compacten Schlagaderhäute gegen die ausdehnende Kraft der Blutströmung, die specifische Schwere des Blutes sehr wenig in Betrachtung.

§. 363.

Das Kreisige ist die Darstellung der vollkommensten Immanenz der Idee. Wie nun aber die absolute Identität nur in der Form der relativen Trennung der beyden absoluten Einheiten, der realen und idealen, sich darstellt; so geht alle Kreisbewegung in die elliptische über. Denn die

beyden Brennpunkte der Ellipſe ſtellen nur in relativer Duplicität, was das Centrum des Kreiſes in der Identität dar. So iſt die Bahn der Planeten elliptiſch, und wirklich iſt auch die Figur des Gefäſseſyſtems nicht vollkommen gerundet und kreiſig; die Gefäſsebewegung in dieſem iſt nicht eigentlich Kreisbewegung; ſondern die Totalgeſtaltung des Gefäſseſyſtems iſt die Ellipſe, die Bahne der Blutkügelchen iſt elliptiſch; nämlich in der Ellipſe herrſchen die beyden Brennpunkte, jeder als ein untergeordnetes Centrum für ſich. An der Eygeſtalt iſt das Eine Ende das contrahirte, in ſich zurückgehende, der Apex aber iſt das Expandirte, aus ſich hervortretende Ende. Die beyden Brennpunkte der Ellipſe werden hier durch die beyden Gefäſspole, den arteriellen und den venöſen, repräſentirt.

§. 364.

Es giebt aber nur Einen Kreislauf des Blutes. Der ſogenannte groſse und kleine, der Aortenkreislauf und der Lungenkreislauf ſtellen zuſammengenommen nur Eine Kreisbewegung des Blutes her; keiner von beyden iſt kreiſig in ſich vollendet, und in ſich ſelbſt wiederkehrend. Jeder ergänzt den andern und kehrt in ihm wieder. Denn alle Bewegung iſt nur nach zwey ſich entgegengeſetzten Richtungen möglich; von der Linken zur Rechten, und umgekehrt: jene iſt ein unendliches Expanſions - Streben, dieſe iſt ein ewiges in ſich ſelbſt Wiederkehren; und ſo wie das Licht nur das Beſtreben der Subſtanz iſt, ſich auszubreiten, und ſich

in den Dingen zu entfalten, die Schwere aber ein ewiges Wiederkehren der Subſtanz in den Dingen; ſo iſt die Möglichkeit aller Bewegung durch die zwey Lebensprincipien der Dinge, das Licht und die Schwere, urbildlich dargeſtellt. In dieſer aber erſcheint die Subſtanz äuſſerlich ruhend, in jenem in unendlicher Bewegung. Die expanſive Bewegung iſt daher auch die Bewegung κατ' Ἐξοχην, die auch in ihrer Beſonderheit wieder das Weſen der Bewegung darſtellende, von daher die poſitive, da hingegen die contractive, gleich der Schwere, mehr Bewegung in der Ruhe, negative Bewegung iſt. Alle Gefäſsebewegung iſt daher nur entweder arterielle, poſitive, expanſive, oder venöſe, negative, contractive Bewegung. Die erſte repräſentirt die Lichtſeite, die andere die Nachtſeite des Gefäſseſyſtems.

§. 365.

Nämlich, da im Blute Herz und Arterie und Vene in Eines zuſammenfallen, das Blut von daher das erſte, lebenskräftigſte und belebende im Gefäſseſyſtem iſt, ſo erhält jedes Gefäſs ſeine beſondere Bedeutung von dem Blute, welches daſſelbe führt; und es giebt daher nur zweyerley Gefäſse: — Gefäſse zur Fortbewegung des rothen, und Gefäſse zur Fortbewegung des ſchwarzen Blutes. Auf die arterielle Seite fallen die Lungenvenen, der Lungenvenenſack, der hintere Ventrikel, die Aorte und ihre Verzweigungen bis zu dem Capillargefäſseſyſtem. — Zur venöſen Hälfte gehören die beyden Hohladern mit ihren Wurzeläſten, der vordere Vorhof, der vordere Ventrikel, und die

Lungenarterien. Nämlich, ſo wie das Herz den Gattungscharakter des Gefäſseſyſtems überhaupt ausdrückt, ſo bezeichnet der vordere Ventrikel den Gattungscharakter der Venoſität; der hintere aber den Gattungscharakter der Arteriellität, und ſomit iſt in der Bildung des Herzens der generiſche Charakter der beyden Gefäſsformationen bezeichnet. Von dem hintern Ventrikel aus entwickelt ſich die Arteriellität, da jeder Theil im Organismus dem Ganzen gleich iſt, wieder unter gedoppelter Form. Die Arteriellität unter der arteriellen Gefäſseform iſt ausgedrückt in der Bildung der Aorte und ihrer Verzweigungen: unter der venöſen Form aber iſt ſie dargeſtellt in der Bildung der Lungen-Venen, welche arterielle Venen ſind, und, ſo wie die Arterien überhaupt, ein oxydirtes Blut führen. — Eben ſo entwickelt ſich die Venoſität von dem vordern Ventrikel aus unter gedoppelter Form. Sie geſtaltet ſich unter der arteriellen Gefäſseform in den Lungenarterien, welche venöſe Arterien ſind. Sie geſtaltet ſich unter der venöſen Gefäſseform in der Bildung der Hohladern und ihrer Verzweigungen.

§. 366.

Das Gefäſseſyſtem geht ſomit in arterielle Arterien und in venöſe Arterien, in arterielle Venen und in venöſe Venen auseinander. Alle aber ſind auf ſolche Weiſe in einander aufgenommen und verſchlungen, daſs dadurch nur Eine elliptiſche Bahn für den Blutumlauf entſteht. Der Lungenkreislauf iſt überall, auch in den höheren Thieren, nur eine Fraction des groſsen Kreislaufes,

und dessen Ergänzung. Das Aortensystem, das Hohladersystem, das Lungenschlagadersystem und das Lungenblutadersystem stellen, jedes einen besondern Quadranten des Kreises dar, welchen der Blutumlauf beschreibt.

§. 367.

So wie der ganze Kreislauf des Blutes vorzugsweise ein electrischer Prozeſs (ein Electricitäts- und Wärmeleitungsprozeſs) ist; so ist die venöse Gefäſsebewegung (da im electrischen Prozesse sich auch der magnetische als Moment der Adhäsion, und in allem Höhern das Niedere wiederholt) das magnetische; — die arterielle Gefäſsebewegung aber ist das electrische Moment. Denn das Wesen der venösen Gefäſsebildung ist Contractions-Streben, so wie im magnetischen Prozesse ein fixirtes und bleibendes Uebergewicht der Contraction ist. Das Wesen der arteriellen Gefäſsebildung aber ist Expansions-Streben. Daher ist jenes Gefäſsegeschlecht anscheinend ruhend, dieses aber ist vorzugsweise thätig. Die Arterien repräsentiren die positive, expansive Seite des Gefäſsesystems; die Venen aber dessen negative, contractive Seite. In den Venen geschieht die Fortleitung des Blutes nach demselben Gesetze, welches das Aufsteigen des Pflanzensaftes in den Pflanzen bestimmt. Der venöse Blutlauf ist eine stets sich erneuende Einsaugung. Nur durch ihren Gegensatz mit den Arterien sind die Venen in das irritable System aufgenommen. Ohne diesen sind sie als Lymphgefäſse in das reproductive System versenkt. Das Blut verhält sich weder posi-

tiv noch negativ im Gefäſseſyſtem und im irritabeln Syſteme überhaupt, ſondern es drückt die Indifferenz aus — den dritten, indifferenten Körper, durch deſſen Zerlegung die beyden Antipolaren ſtets ihre Differenz nach momentaner Ausgleichung wieder herſtellen.

§. 368.

Die vornehmſte und edelſte Bildung im Gefäſseſyſtem aber iſt das Herz. Denn dieſes drückt die Identität der ganzen Gefäſsebildung in ſich aus: von ihm aus beginnt die Evolution, und das ganze Gefäſseſyſtem ſproſst gleichſam aus dem Herzen hervor. Obgleich die Bewegungsrichtung in der Metamorphoſe der beyden Gefäſsegeſchlechter eine verſchiedene iſt, und jene des arteriellen Syſtems durch expanſive Bewegung, jene des Venöſen aber durch contractive Bewegung beherrſcht wird; ſo iſt doch die letzte ſelbſt nur als eine Secundäre zu betrachten, und gleichſam nur als Hemmung der urſprünglichen expanſiven Bewegung, welche in den Arterien die Metamorphoſe beſtimmt. Die Venen ſind nur Beſchränkungen, negative Gröſsen in der Progreſſion der arteriellen Gefäſsebildung. Das Herz aber ſtellt den Gattungscharakter der beyden Gefäſsarten dar, und das Generiſche beyder iſt, geſondert von ihrer ſpecifiſchen Differenz, an jenem in Erfüllung gegangen.

§. 369.

Das Centrum der Poſition eines ganzen Syſtems, oder was die Identität in dieſem darſtellt, iſt aber die unmittelbare Selbſtbekräftigung des Bandes

in ihm und ſolches verhält ſich zu dem Beſondern, welches zu dem Ausdrucke der Totalität im Syſteme gehöret, wie das Band der Idee zu dem Verbundenen überhaupt. Daher iſt auch dieſes nur in und mit jenem, und ſein beſonderes Leben kömmt ihm aus dem Centrum ſeiner Poſition. So iſt es zu verſtehen, wenn behauptet wird, das Herz ſey das vornehmſte, ja das einzige Agens für den Blutumlauf. Das Leben und die Bewegung wird allen Gefäſsen nur von dem Herzen zugetheilt. — Jede andere Beziehung aber, in welcher jene Behauptung ſonſt wohl verſtanden wird, iſt durchaus unrichtig.

§. 370.

Das Herz aber, da es unmittelbar den Akt der Selbſtbekräftigung der Idee, und die Identität in einem ganzen, beſonders für ſich lebenden Syſteme ausdrückt, iſt auch ein unabhängig für ſich Lebendes. Daher ſeine groſse Unabhängigkeit vom Gehirne, welchem ſich das Herz allein herrſchend an die Seite ſtellt; — ſeine ſelbſtſtändige Bewegung, welche nicht der Herrſchaft der Nerven untergeben iſt, die geringe Anzahl der letzten überhaupt, und ſeiner Cerebral - Nerven insbeſondere. Kein wahrer Muskel beſitzt ſo wenige Nerven, als das Herz: und beynahe alle Herznerven entſtehen von den drey Halsknoten, oder dem erſten Bruſtknoten der ſympathiſchen Nerven; nur wenige kommen vom Stimmnerven her. In keinem Muskel iſt auch die irritable Bildung ſo unabhängig von der Nervenbildung: denn die Herznerven ſind gröſstentheils

als Gefäſsnerven zu betrachten. Nach dem Tode des Gehirnes lebt oft das Herz noch eine Zeit lang; und da bey der Apoplexie das Gehirn, mit ihm die Sinnesorgane und das willkührliche Bewegungsorgan getödtet oder wenigstens ſcheintodt ſind; dauert die Thätigkeit des Herzens, die Gefäſsebewegung, die Bewegung des Thorax fort.

§. 371.

Als ein in ſich ſelbſt vollendeter, höchſt individuell gebildeter Organismus hat das Herz eine eigene allgemeine Bedeckung, eine ſeröſe Haut, mit welcher es umkleidet iſt, den Herzbeutel, der eine gedoppelte Hülle, eine mit der Muskelſubſtanz des Herzens verwachsne, und eine dieſs Organ ſackförmig umgebende, bildet. Der zwiſchen beyden gegen einander gekehrten Oberflächen der ſeröſen Haut befindliche Zwiſchenraum iſt mit einer ſeröſen Dunſtflüſſigkeit erfüllt. Der Herzbeutel ſelbſt aber, da er mit dem Bruſtfell der benachbarten Theile zuſammenhängt, iſt als ein Ligament zu betrachten, durch welches die Bewegungen des Herzens eingeſchränkt ſind.

§. 372.

Alle Centralorgane, da in ihnen der Keim zur Evolution eines ganzen Syſtems niedergelegt iſt, ſind offenbar bey dem Fötus relativ gröſser und voluminöſer, als bey den Gebornen und Erwachſenen. Sie ſind eben darum auch früher gebildet; denn bey den Thieren geht alle Bildung von dem Oberſten und Höchſten aus. Die Bildung des ganzen Syſtems, deſſen Identität in jenen centrirenden Or-

ganen dargestellt ist, erscheint nur als eine weitere Evolution derselben, als eine Entwicklung dessen, was in jenem der Anlage nachgesetzt ist. So ist das Gehirn grösser relativ zur Grösse der Nerven bey dem Kinde etc., so auch das Herz zur Grösse der Gefässe.

§. 373.

Das Herz, obgleich sich in ihm die Identität der beyden Gefässformen darstellt, — ist doch, seiner Lage nach venös, zur linken Seite gelagert. Die positive, expansive Bewegung hat überhaupt die Richtung von der Linken zur Rechten: (daher ist das: Dextrum überall das Gute, Richtige, Wahre, das: Sinistrum ist überall das Böse, Falsche, Unheilbringende. Darnach richtet sich auch die Bewegung der Himmelskörper). So geht daher der arterielle Blutumlauf von der Linken gegen die Rechte. Aber das Herz ist in seinem Baue arteriell: es pulsirt wie eine Arterie, ist muskulöser Struktur, hat deutlich unterscheidbare Nervenfaden. Es neigt sich auch überall im System der Gefässe mehr auf die Seite der Arterien, als auf jene der Venen. Die Grösse des Herzens nimmt gleichzeitig mit der Grösse der Arterien durch die ganze Thierreihe hindurch zu und ab, und beyde stehen überall im umgekehrten Verhältnisse der Grösse der Venen; so ist bey Fleischfressern offenbar das Herz nebst den Arterien grösser relativ zur Grösse des ganzen Körpers, eben so haben Menschen von kleiner Statur ein relativ grösseres Herz. Von der relativen Grösse des Herzens hängt die irritable Stimmung aller Organe,

die Anlage zu Entzündungskrankheiten, zu aktiven Hämorrhagien ab. — Daſs das Herz aber, und mit ihm das ganze Gefäſseſyſtem urſprünglich arterieller Natur ſey, ſomit in dieſem die Arterie ſich poſitiv, die Vene aber negativ verhalte, erhellet beſonders aus der frühern Bildung des hintern arteriellen Ventrikels vor dem vordern venöſen ſowohl in den untern Thierklaſſen, als auch in den frühern Perioden der Geſtation des menſchlichen Fötus. Der vordere Ventrikel iſt nämlich offenbar nach vergleichender anatomiſcher Betrachtung nur als eine Zugabe, als ein Anſatz zu dem hintern zu betrachten; er iſt daher auch anfangs ſehr klein, und erweitert ſich nur in der Folge. Der hintere hat auch ganz die (eyförmige) Geſtalt des Herzens.

§. 374.

Das Gefäſseſyſtem tritt zuerſt beſtimmt, und als ſolches individualiſirt in den Fiſchen hervor: denn dieſe ſind die Reproductionsthiere unter den Irritabilitätsthieren. Bey allen nicht mit rothem Blut und einem gegliederten Skelet verſehenen Thieren iſt noch immer die Reproduction die relativ - vorherrſchende Potenz innerhalb des durch die Irritabilität gezogenen Kreiſes des thieriſchen Lebens. Daher iſt noch immer Secretion, zuletzt zum Kunſttriebe geſteigert, dort das Höchſte: und es beſteht die gröſste Ueppigkeit der zeugenden Kraft in der Fortpflanzung der Gattung. Da das Gefäſseſyſtem durchaus ſeine Bedeutung vom Blute erhält, ſo iſt erſt bey den rothblutigen Thieren wahres Blut zugegen: in den untern Claſſen iſt das Blut immer noch mehr

oder weniger Pflanzensaft. Daher ist auch erst bey den Fischen das Herz eine constante, auf bestimmte Weise individualisirte Bildung. Bey den Schaalthieren ist das Herz noch sehr unbeständig. Einige besitzen zwar ein circumscriptes, eyförmiges, in der Mitte des Thorax gelagertes Herz. Bey andern aber ist das Herz länglicht, erstreckt sich von einem Ende des Körpers zu dem andern, und stellt deutlich eine Uebergangsformation zu dem Rücken - Blutgefäss der gegliederten Würmer, und durch dieses zum Rückengefäss der Insekte dar.

Das Herz der Mollusken ist ein Aortenherz, da wo es einfach vorhanden ist: wo mehrere Lungenherzen sind, bleiben diese getrennt und unvereint.

§. 375.

Das einkammrige Herz der Fische wird nur uneigentlich Lungenherz genannt. Denn eigentlich ist die erste Kammer immer Aortenherz, und nur da, wo eine zweyte von dieser räumlich geschiedene sich anlegt, erhält diese die Bedeutung eines Lungenherzens. Aus dem Herzen der Fische geht zwar der Arterienstiel hervor, und dieser theilt sich in die Kiemenarterien, welche, nachdem sie die Kiemen nach Art der Lungenarterien durchgangen haben, sich untereinander zu der itzt erst sogenannten Aorte vereinigen. Eigentlich ist aber schon jener Arterienstiel eine wahre Aorte: nur zufällig verbreitet sich diese auf ihrem Wege in den Kiemen, so, dass jeder Kiemen immer eine besondere Arterie erhält. Wegen der Unvollkommenheit der Bildung des Lungensystems, — welches erst bey den Amphibien sich

mehr entwickelt, tritt dieſs hier nur als Zwiſchenbildung ein, wodurch die Einſtämmigkeit der Aorte momentan unterbrochen wird. Daher ſind auch die Gefäſse, welche das Blut aus den Kiemen zurückführen, keine Venen. Ihre membranöſen Wandungen haben eine ganz den Arterien gleiche Bildung, von jedem Kiemen geht eine beſondere Arterie aus, und ehe dieſe untereinander in den zur Aufnahme der Aorte beſtimmten knorpelichen Canale einſtämmig zuſammenmünden, giebt ſchon jede von ihnen insbeſondere wichtige Arterien zum Halſe, zu dem Haupte, zu dem Herzen ſelbſt ab. Sogar die Carotis entſteht von der Arterie des erſten Kiemens. Bey der Vereinzelung der Kiemen in der Claſſe der Fiſche — hat jedes wichtigere Organ ſeine beſondere Lunge, und die Aeſte der Aorte durchgehen, ehe sie zu den ihnen entſprechenden Organen hingelangen, ihre beſondere Lungen, in welchen sie sich ausbreiten, und aus denen sie wieder einſtämmig hervorgehen. Offenbar verhalten ſich hier die Kiemen zu den Arterien, welche in ſie eingehen, und wieder als arterielle Gefäſse aus ihnen hervortreten, wie die conglobirten Drüſen zu den ſie hindurchgehenden Lymphgefäſsen.

§. 376.

Bey den Amphibien behält das Herz noch immer ſeine erſte Bedeutung, als Aortenherz, der Lungenkreislauf iſt nur ein Bruch des allgemeinen

Kreis-

Kreislaufes; das Herz treibt einen Theil des ihm zugeführten venöſen Blutes in die Lungengefäſse über; der gröſste Theil aber, mit dem aus den Lungen zurückkehrenden Blute vermiſcht, wird von den verſchiedenen Buchten in die Aorten übergetrieben. Jedoch iſt in der Claſſe der Amphibien ſchon der erſte Verſuch zur Bildung eines eigenen Lungenherzens, da hier zuerſt ein eigener linker Vorhof vermöge der Zuſammenmündung der Lungenvenen angelegt iſt, auch ſchon in einzelnen Familien, wie bey den Krokodillen, eine eigene Bucht in der Herzenskammer ſich befindet, welche das *Blut* in die Lungenarterien übertreibt. Jedoch ſind die drey Buchten hier nicht vollkommen getrennt, ſie ſtehen durch mehrere Löcher ineinander offen. Erſt bey den Vögeln und Säugethieren legt ſich dem Aortenherzen ein Lungenherz an, und wächſt mit ihm zu Einer Maſſe zuſammen.

§. 377.

Der hintere oder Aortenventrikel iſt daher auch als das primitive Herz, und der vordere oder Lungenventrikel iſt nur als ein ſecundär beygegebenes Herz zu betrachten. Dieſer iſt durchaus von venöſer Natur, und der erſte verhält ſich zu dem zweyten wie Arterie zur Vene. Denn die beyden Herzkammern verhalten ſich untereinander, wie ſich das in ſie aufgenommene Blut verhält. Gleich den Venen aber enthält der vordere Ventrikel ein ſchwarzes, verwaſſerſtofftes und kohlenſaures, venöſes Blut.

Gleich den Arterien enthält der hintere ein rothes, neu oxydirtes, arterielles Blut.

§. 378.

Auch die Struktur des Aortenherzens ist arteriell, die Struktur des Lungenherzens ist venös. Zuerst sind beyde durch die Farbe ihrer Wandungen auffallend unterschieden. Von der innern Oberfläche her gesehen, erscheint die Muskelsubstanz der vordern Kammer mehr dunkelroth, jene der hintern mehr hellroth. Der Unterschied in der Farbe zwischen beyden, so wie er nach dem Tode bemerkt wird, ist wohl nicht eine Folge der früheren Fäulniss der vordern, gewöhnlich noch mit Blut angefüllten Kammer. Sondern die lebhaftere Röthung des Muskelfleisches ist hier so wie überall ein Ausdruck der höhern irritabeln Stimmung. Da in den Venen die Metamorphose der Gefässebildung von dem relativen Maximum der Expansion beginnt, in den Arterien aber vom relativen Maximum der Contraction; so sind auch die Venen, verhältnissmässig zu den Arterien, im ursprünglichen Expansions- diese im Contractions - Zustande. Daher ist die Capacität der gesammten Gefässhöhle in den Venen weit grösser als in den Arterien, und im Verhältnisse wie 4 zu 1. Eben so ist auch die Höhle des vordern, venösen Ventrikels ansehnlich grösser, als jene des hintern, arteriellen Ventrikels. Diess relative Uebergewicht der Grösse der Capacität in der vordern Kammer ist zwar nach dem Tode, besonders nach asphyctischen Todesarten, ungleich beträchtlicher, als während des Lebens; so wie auch die Ve-

nen während des Lebens nicht so sehr erweitert und ausgedehnt sind, als sie sich am Leichname darstellen. Aber daſs die Capacität der venösen Herzkammer auch während des Lebens gröſser sey, als jene der arteriellen, und zwar im Verhältnisse wie 7 zu 5, beweist die Autopsie bey der Vivisection von Thieren.

§. 379.

Eben so ist die relative Erweiterung des vordern und die gleichzeitige Verengerung des hintern Ventrikels in den früheren Lebensaltern geringer, als in den spätern; — so wie bey dem Fötus zuerst das Verhältniſs von beyden das umgekehrte war, und bey dem Neugebohrnen beyde der Capacität nach einander gleich sind. Am beträchtlichsten wird sie alsdann, wenn bey sinkender Energie im Gefäſsesystem überhaupt zuerst die Arterie, als die Stärkere, ihr Uebergewicht über die Vene verliert. Bey sanguinischen Menschen und bey vorzüglich irritabeln Thieren (z. B. den Raubthieren, welche in ihrem Verhältnisse zu den Wiederkäuern den Gegensatz der Irritabilitäts- und der Reproductionsthiere innerhalb der Classe der Säugthiere wiederholen) bleibt auch durch die ganze Lebenszeit hindurch der Unterschied in der Capacität beyder geringer. Bey den Cholerischen aber findet das Gegentheil statt.

§. 380.

Die arterielle Natur der Aortenkammer offenbart sich aber besonders in dem höhern Cohäsions-

Grade ihrer membranöſen und muskulöſen Wandungen, in der gröſsern Dicke derſelben, in der Derbheit ihres Muskelfleiſches, in der gröſsern Anzahl von Fleiſchbalken; — im gröſsern Reichthum an gangliöſen Nerven? — Daher erliſcht auch nach dem Tode die Reitzbarkeit, ſo wie ſich dieſe im Galvaniſchen Experimente und auf andere Weiſe offenbart, beſonders nach einigen Todesarten, ungleich ſpäter in der Aortenkammer, als in der Lungenkammer; ſo wie auch die Arterien bey weitem ſpäter als die Venen ſterben.

§. 381.

Indem nun der Autagonismus zwiſchen Beugemuskeln und Streckmuskeln nur eine Wiederholung des urſprünglichen Gegenſatzes zwiſchen arterieller und venöſer Gefäſsebildung iſt; ſo verhalten ſich auch die beyden Herzen, das Aortenherz und das Lungenherz zu einander, wie der Beugemuskel zum Streckmuskel. Es iſt ſomit Autagonismus zwiſchen beyden Kammern, und das Herz, als ein unpaariger Muskel, hat ſeinen Gegenſatz, und ſeinen Autagoniſten in ſich ſelbſt.

§. 382.

Die Scheidewand des Herzens ſtellt die Indifferenz zwiſchen den beyden ſich entgegengeſetzten Kammern dar. Daher ſie auch weder der einen noch der andern allein und ausſchlieſsend angehörig iſt. Deutlich unterſcheidet man in der musculöſen Scheidewand die mehr dunkeln Faſern, welche dem vordern Ventrikel angehören, von den

mehr hellrothen Fasern des hintern Ventrikels: so wie jedoch in der Bildung des Herzens die Aortenkammer überhaupt vorherrschend und die andere dieser nur secundär beygeordnet ist, so geht auch die Bildung der Scheidewand mehr von dem Aortenherzen aus; und das Septum ist gegen die Lungenkammer aufgewölbt, als stellte es bloss die Schlusswandung der Aortenkammer dar. — Indem nun die Fasern aus den Wandungen der beyden Herzen sich nicht vermischen, nur verweben, nur in Contiguität, nicht in Continuität stehen; bleiben zwischen ihren netzförmigen Verflechtungen leere Zwischenräume und trichterförmige Vertiefungen zurück, welche man ehemals für offene Poren und Verbindungscanäle beyder Kammern ansah.

§. 383.

Da in der Bildung des Herzens die erste Potenzirung der Fleischhaut zum Muskel gesetzt ist; so sind die Muskelfasern des Herzens noch auf das mannigfachste und in den verschiedensten Richtungen unter einander gewirrt: bald streifenartig ausstrahlend, bald in Bündel gesammelt: nach der Länge, quer und in schiefer Richtung verlaufend. Es sind so wie in den Fleischhäuten, in dem Herzen noch mehrere Faserlagen unterscheidbar; und die einzelnen Schichtungen sind im Gegensatze gegen einander gebildet. Vermöge des zwischen beyden Herzen bestehenden Autagonismus ist auch die Richtung der Fasern in ihnen eine verschiedene; da in der Aortenkammer die Fasern mehr nach der Länge, in der Lungenkammer mehr in die Quere verlau-

fen. Vermöge der individuelleren Bildung der Aortenkammer überhaupt ist auch das intriguirte Faserngewebe in den Wandungen der Lungenkammer schwerer als in jener zu entwirren.

§. 384.

Die am meisten individualisirten Muskeln sind, so wie überall, so auch in den Fleischwandungen des Herzens, diejenigen, welche aus dem vielfach verflochtenen Gewebe von Fasernbündeln hervortreten, sich diesen entwinden und entweder von der Spitze des Herzens gegen seine Basis hin, oder von einer Seite zur andern immer in etwas schiefer Richtung verlaufen. So wie den Muskelfasern der Fleischhäute die tendinöse und fibröshäutige Bildung überhaupt fremd ist, und diese erst in den mehr individualisirten willkührlich beweglichen Muskeln entsteht; so kömmt auch in diesen Fleischsäulchen die erste Spur von tendinöser Bildung vor. Offenbar verlieren sich mehrere dieser kleinen Muskeln in fibröshäutige Fortsätze, zum Theil in rundliche Sehnen, welche die Klappen der arteriellen und venösen Mündungen des Herzens bewegen.

§. 385.

So wie das Verhältniss der vordern Kammer zur hintern überhaupt das Verhältniss der Vene zur Arterie ist, so verhalten sich die beyden Vorkammern oder Sinus wieder venös zu den beyden Kammern selbst. Die Ventrikeln sind die arteriellen Höhlen, die Sinus sind die venösen Höhlen des

Herzens. Denn da das Herz, obgleich die Identität im Gefäſsesyſtem überhaupt und auf allgemeine Weiſe bezeichnend, dennoch mehr auf die Seite der Arterien ſich neigt, und ſeiner Natur nach ſelbſt mehr arteriell iſt, ſo projicirt es ſeinen venöſen Gegenſatz auſſer ſich, und dieſer geſtaltet ſich unter der Form beſonderer Gefäſsehöhlen, welche die Vorkammern ſind.

§. 386.

Die beyden Herzen, das Lungenherz und das Aortenherz hängen nicht unmittelbar mit den ihnen angehörigen Venen zuſammen. Zur Bildung des Herzens kömmt es erſt da, wo die Totalcontraction des venöſen Syſtems erreicht iſt. Nun aber contrahiren ſich weder die Hohladern, noch die Lungenblutadern, in einen gemeinſamen Stamm; ſondern die Hohlvenen verlaufen mit 2 getrennten, und die Lungenblutadern mit 4 Stammungen. Es liegen daher zwiſchen den beyden Venenſyſtemen, und ihren reſpectiven Herzen kleine fleiſchicht - membranöſe Säcke innen, welche mit ihren Wandungen aneinander ſtoſsen, das Blut aus den Venen in ſich aufnehmen, und in die Herzkammern fortleiten.

§. 387.

Der Hohlvenenſack drückt deutlich auch in ſeiner beſondern Bildung, und in der Art ſeiner Entſtehung die Tendenz zur Totalcontraction im Venenſyſtem aus. Denn die beyden Hohladern, die obere und die untere, verlaufen nicht in convergirender Richtung, (warum es eben nicht zur Totalcontraction in beyden venöſen Gefäſseſtammungen

kommen kann) die obere Hohlader gehört ihrer Lage nach entſchieden dem Hohlvenenſacke an; die untere aber neigt ſich urſprünglich eben ſo wohl gegen den linken als rechten Vorhof, und verliert ſich ſelbſt nicht ſogleich bey ihrem Eintritte in die Wandungen des Vorhofes, ſondern ſetzt ſich in deſſen Höhle mittelſt einer eignen Klappe, der Euſtachiſchen Klappe fort: und da bey dem Fötus das Euſtachiſche Loch noch nicht geſchloſſen iſt, gelangt auch das meiſte Blut aus der untern Hohlader mit Vorübergehung der venöſen Oeffnung des rechten Ventrikels durch das eyförmige Loch in dem linken Vorhofe, da umgekehrt das meiſte Blut aus der obern Hohlader, welche ſich ganz in der Direktion der Herzbeutelöffnung des rechten Vorhofes einmündet, gröſstentheils in den linken Ventrikel gelangt, und aus dieſem durch den Botalſchen Canal in die abſteigende Aorte, ſo daſs offenbar hier eine Art von doppelter Kreuzung der Blutſtröme unter der Form des Achters im Gefäſsefyſtem geſchieht: da alsdann das Blut des linken Ventrikels gröſstentheils durch die Aorte, und die in ihrer Direktion liegenden Carotiden und Subclaviculararterien dem Kopfe und den obern Extremitäten, das Blut des rechten Ventrikels aber gröſstentheils durch den Botalſchen Canal der abſteigenden Aorte, und durch dieſe den Baucheingeweiden und untern Extremitäten zugeführt wird.

Das Bauchſtück der erſten iſt gröſstentheils Fortſetzung des Botalſchen Canales, und das Bogenſtück derſelben iſt bloſs ein Verbindungscanal, wel-

cher in der Folge den Arteriengang erſetzt. Denn in der Progreſſion des Lebens wird die vorhin mehr dem Haupte, und den Theilen oberhalb des Zwergfelles zugewendete gröſsere Quantität des Blutes mehr den untern Theilen zugetheilt. Daher erweitert ſich ſo anſehnlich das Bogenſtück der Aorte, indeſs ihr Bogen ſelbſt etwas weniger gekrümmt wird. — Der Kreislauf bey dem menſchlichen Fötus iſt hierin dem Kreislauf der untern Thiere, z. B. der Amphibien in einigen Gattungen, vergleichbar. Bey dieſen iſt das Herz in mehrere Buchten getheilt. welche aber unmittelbar unter einander communiciren: es giebt nicht Eine, ſondern mehrere Aorten: eine rechte, linke, vordere etc. Offenbar iſt nun die ganze Conſtruction der Präcordialgefäſse bloſs ſecundäre Nachgebildung des Kreislaufes, ſo wie er urſprünglich im Fötus ausgeübt wird; die ganze Conſtruction des Hohlvenenſacks geht darauf hin, die Totalcontraction im venöſen Syſteme zu vollenden, die beyden Hohladern zur convergirenden Richtung zu bringen, und ſomit den Einfluſs beyder Blutſtröme gemeinſchaftlich in dem rechten Ventrikel zu beſtimmen. Darum bildet ſich nun aus der Euſtachiſchen Klappe die Schlieſswandung des eyförmigen Loches, und zuletzt erſcheint die Euſtachiſche Klappe ſelbſt nur noch als ein aufgeworfner wulſtiger Ring um die eyförmige Grube, der nun von dieſer Grube ſelbſt die Blutſtrömung aus der untern Hohlvene abhält, und derſelben die Richtung gegen die Herzbeutelöffnung des rechten Vorhofes beſtimmt. — Daſs die beyden venöſen Säcke bloſs im Conflikte der entgegengeſetzten Be-

wegungsrichtungen in den Blutströmungen gebildet seyen, erweisst sich auch darin, dass jeder derselben gleichsam in der Direktion jener Strömungen liegt, und so diese von 2 oder 4 Seiten her aufnimmt. Daher liegt der Sack der Hohlvenen mit seinem grössern Durchmesser nach der Axe des Körpers, jener der Lungenvenen aber mehr in die Quere. Beyde Venensäcke stossen nur eine sehr kleine Strecke lang, gegen die rechte Seite hin, aneinander, da, wo ehemals das eyförmige Verbindungsloch zwischen ihnen bestand: — und mehr gegen die linke Seite zu entfernen sich ihre einander zugekehrte Wandungen, so dass hier die Lungenschlagader in ihren Zwischenraum eintritt. Da sie aber den Uebergang der venösen Gefässe zu den Herzensventrikeln bilden, und gleichsam die noch divergirenden venösen Blutstrahlen zur convergirenden Richtung, und zur endlichen Reflexion durch die Wandungen der Ventrikeln selbst bringen, so ist auch in ihnen schon die erste Anlage zu jenem Muskelgewebe gesetzt, welches in den Wandungen der Ventrikeln mehr entfaltet, und zu höherem Potenzgrad gesteigert ist; — die Fasern verlaufen in dem rechten Vorhof nach Art der venösen Gefässebildung mehr länglicht, und in der Wandung des linken Venensacks nach Art der arteriellen Gefässebildung mehr in die Quere. Weit dünner aber ist in den Ventrikeln selber die innere Haut, als in den Vorhöfen, und an einigen Stellen der Ventrikeln höchst dünne, und kaum gewahrnehmbar (im rechten Ventrikel verhindert sie die unmittelbare Berührung der muskulösen Wandung mit dem venösen

Blute, welches das narcotiſche, tödtende Princip der Muskeln in ſich trägt). Die innere Haut der Gefäſse, von welcher urſprünglich die ganze Metamorphoſe in der Gefäſsebildung ausgeht, kömmt mit dem relativ gröſsten Cohärenzgrade vor in den Venensäcken, und die muskulöſe Haut in den Wandungen der Ventrikeln ſelbſt. — Bey dem Uebergange der Vorhöfe in die Ventrikeln verdoppelt ſich die innere Haut zu Klappen, deren an jenem des Hohlvenenſackes in den rechten Ventrikel 3 ſind (dreyzackige Klappe), und an jener des Lungenvenenſacks in den linken Ventrikel zwey (mützenförmige Klappe). Da in dieſen die höchſte Metamorphoſe jener innern ſchon fibröſen Haut erreicht iſt; ſo ſchreitet hier die Metamorphoſe von dem fibröſen Gewebe zur fibröscartilaginöſen Gebildung fort, und bey einigen Thieren ſind in dieſen Klappen wirkliche Knorpel, bey einigen ſelbſt Knochen gebildet. Bey Menſchen iſt aber die Metamorphoſe im gewöhnlichen Zuſtande ſelten bis zur wirklichen cartilaginöſen Produktion vorgeſchritten, ſondern meiſtentheils auf der Individualiſirungsſtufe des fibröscartilaginöſen Gewebes befangen. Krankhafte Zuſtände ſteigern hier die Metamorphoſe bis zu dem Uebergange in das Knochengewebe. Es entſteht Verknöcherung der mützenförmigen und der dreyzackigen Klappe.

§. 388.

Das Muskelgewebe der Venensäcke contrahirt ſich in dieſen zu den ſogenannten Herzohren. Dieſe ſtellen offenbar den Contractionspol der Mus-

kelhaut jener Säcke dar; und nun erst, nachdem schon die erste Contraction jenes muskulösen Gewebes zur Muskelproduktion in den Herzensohren versucht ist, kömmt es zur Evolution eines wirklichen Muskels in den Wandungen des Herzens.

§. 389.

Der Rhythmus bey der Zusammenziehung der beyden Herzenskammern und Herzenssäcke wird gewöhnlich auf folgende Weise angegeben: das Blut gelanget aus den beyden Hohladern und der Kreuzblutader des Herzens in den rechten Vorhof. Die Wandungen dieses Vorhofes ziehen sich zusammen, und das Blut, eine incompressible Flüssigkeit, fliefst in geringer Quantität in die Venen zurück, welcher Zurückflufs nicht ganz geläugnet werden kann, obgleich es nicht mit der pulsirenden Bewegung der Hohlvenen in der Nähe ihrer Einmündungsstelle verwechselt werden darf. Aber der gröfste Theil des Blutes gelanget bey jener Zusammenziehung in die rechte Herzenskammer. Darauf verengert sich wieder der rechte Vorhof bis zu neuer Ausdehnung durch die neu zuströmende Blutwelle. Der rechte Ventrikel nun durch die Blutwelle ausgedehnt, zieht sich über diese zusammen, und das Blut wird gegen die beyden Mündungen dieses Ventrikels, nämlich gegen seine Vorhofmündung, und gegen seine arterielle Mündung hingetrieben. Aber die erste wird durch die dreyzipfliche Klappe verschlossen. Denn diese weicht dem in den Ventrikel einströmenden Blute, und legt sich den Wandungen des Ventrikels selbst an; aber sobald derselbe mit Blut an-

gefüllt ist, entfernt sich die Klappe von der Wandung des Ventrikels, und bildet in ihrer Adhäsionslinie mit jenem einen blinden Sack. Aber die 3 Zacken dieser Klappe können nicht in den Vorhof hinausgestoſsen, und die Klappe selbst also in entgegengesetzter Richtung geöffnet werden; denn der freye Rand jener Zacken wird gegen die Höhle des Ventrikels durch die Fleischsäulchen, und deren tendinöse Verlängerungen angezogen. Doch ist die Vorhofmündung durch jene Klappe nicht vollkommen geschlossen, die Klappe selber ist in ihren Zipfeln durchlöchert: und es gelangt also immer ein Theil des Blutes, besonders aber derjenige, welcher den kegelförmigen Zwischenraum zwischen den äussern Oberflächen der nach innen zu angezogenen Klappen ausfüllt, in den Vorhof zurück. Aber der gröſste Theil des Blutes wird nun durch die Lungenschlagadernmündung in die Canäle dieser letzten eingetrieben. Aus den Lungenschlagadern würde das Blut bey eintretender Diastole des Herzens wieder in den Ventrikel selbst zurückflieſsen, wenn nicht die Sigmaförmige Klappe dieſs verhinderte. Nun vertheilt sich das Blut in den Aesten, Zweigen der Schlagadern, und im Capillargefäſsesystem der gleichzeitig ausgedehnten Lungen. Es geht von da in die Lungenblutadern über, und gelangt aus diesen in den linken Vorhof, bey dessen Zusammenziehung ein Theil des Blutes in die Lungenvenen zurückflieſst, aber der gröſste Theil in den linken Ventrikel eingeht; die mützenförmige Klappe verhindert den Rückfluſs des Blutes aus dem Ventrikel in den Vorhof, und nun treibt der sich

zusammenziehende Ventrikel das Blut mit Macht in die Aorte über, an deren Mündung sich eine halbmondförmige Klappe anlegt, und den Rückfluss des Blutes aus der Aorte in den linken Ventrikel verhindert.

§. 390.

Es ist leicht einzusehen, dass diese Angabe der Art und Weise, wie der Durchgang des Blutes durch die vier Höhlen des Herzens geschehe, ganz unstatthaft sey. Selbst den Anforderungen der Reflexionsansicht auf befriedigende Erklärung aus Natursachen vermag sie nicht Genüge zu leisten, und die Voraussetzungen, auf welchen sie beruhet, sind ganz unrichtig. Denn zuerst ist in jener Erklärung in einzelne getrennte Perioden auseinander gezogen, was in der Funktion selbst synchronisch, in Einem und demselben ungetheilten Zeitmoment vereinigt ist. Es ist keine Aufeinanderfolge in den Zusammenziehungen der vordern und der hintern Herzenskammer, sondern bey der Systole und bey der Diastole trift in demselben Momente zusammen. Eben so verengern und erweitern sich auch die beyden Vorhöfe gleichzeitig. Wenn man bey einem lebenden Thiere den Herzbeutel öffnet und das Herz blos legt, sieht man bestimmt die beyden Herzenskammern synchronisch pulsiren, und alternativ mit ihnen die beyden Vorhöfe sich zusammenziehen. Bey jener Erklärung wird ferner ein blutleeres Herz angenommen, in welches die erste Blutwelle eindringe, und so, wie sie dessen einzelnen Höhlen durchgeht, ihre Wandungen zur Zusammenziehung bestimme. Aber es ist nicht eine Blutwelle,

welche einzeln jene Höhlen durchgeht, und jene erträumte Maschieneneinrichtung in Bewegung setzt. Zu gleicher Zeit schlägt die venöse Blutwelle an die Wandungen des vordern, und die arterielle an die Wandungen des hintern Ventrikels. Im Momente der Systole wird auch keine Kammer vollkommen blutleer; sondern es bleibt immer ein Theil des Blutes, auch im Zustande der Verengerung, in jeder Höhle des Herzens verhalten. — Auch werden die Höhlen nicht mechanisch durch das in sie eindringende Blut ausgedehnt: die Erweiterung ist nicht eine Folge der Congestion; sondern das Blut fliesst in sie ein, weil sie sich erweitern. Denn auch das aus der Brusthöhle genommene, von seinen Gefäßeverbindungen getrennte, und durch Verblutung vollkommen entleerte Herz zieht sich zusammen, und erweitert sich. Jedoch dauert die Pulsation desjenigen Vorhofes und derjenigen Kammer am längsten fort, in welche das Blut fortdauernd einfliesst; wenn man durch Einschnitte oder Unterbindung der zuführenden Gefäſse nur die Eine Kammer blutleer macht. Ueberhaupt ist die pulsirende Bewegung des Herzens keine ihm von aussenher mechanisch oder durch reitzende Einwirkung mitgetheilte; denn das Herz pulsirt auch noch unter der Glocke, im luftleeren Raume, im Zustande der grössten Beschattung, Erkältung. Mit Recht wird daher von Galenus dem Herzen eine eigene, selbstthätige pulsative Kraft zugeschrieben. — Eben so ist es ganz irrig, das Herz nur im Momente der Systole als thätig, sich bewegend, und im Momente der Diastole als lediglich passiv, nachgebend und bloss

als bewegtes vorzuſtellen. Ueberhaupt wird höchſt unrichtig in den Irritabilitätsäuſſerungen die expanſive Bewegung insgemein als leidend, als ein Zuſtand von Unthätigkeit betrachtet; da ſie doch gerade die vornehmſte, ſtärkſte, eigentlich poſitive iſt: — ſo z. B. in den Bewegungen der Iris, wo die expanſive Thätigkeit der Verengerung der Pupille entſpricht; in den Bewegungen der Sphinctéren. — Wenn man bey einem lebendig geöffneten Thiere in das eingeſchnittene Herz den Finger einbringt, empfindet man ſehr beſtimmt, mit welcher Kraft ſich jene Spalte bey der Diaſtole erweitere. — Zuletzt iſt die Klappenvorrichtung an den arteriellen und an den venöſen Mündungen für ſich ſelbſt unzureichend, um den Umlauf des Blutes durch die Höhlen des Herzens zu reguliren, und in beſtimmter Richtung zu erhalten. Denn nicht alle Mündungen ſind durch Klappen verſchloſſen und eine wirkliche, vollkommene Verſchlieſsung findet auch nicht an Einer Mündung ſtatt; der Zurückfluſs des Blutes in der, ſeiner natürlichen entgegengeſetzen, Richtung, würde alſo durch die Klappen nicht verhindert werden; wäre nicht die Richtung der Blutſtrömung auf andere Weiſe dynamiſch prädeſtinirt.

§. 391.

Zuerſt nun hat das Blut das eigene Beſtreben, die einzelnen Höhlen des Herzens, und die zwiſchen ihnen inne liegenden Lungengefäſse in beſtimmter Richtung zu durchgehen. Denn das erſte und vorzüglichſte Agens, welches den Impuls zum

Kreis-

Kreislaufe giebt, ist das Gesetz der Kreisbewegung alles in die Sphäre des Organismus aufgenommenen. Der Kreislauf ist ein siderischer Prozeſs, und die Umlaufszeit der Blutkügelchen ist eben so bestimmt, als jene der Planeten, und der Monde. Nicht durch den Druck der nachfolgenden Blutsäule, und nicht durch die Klappen, welche die Gefäſshöhle verschlieſsen, wird das Blut im Rückflusse gehindert, wozu es durchaus kein Bestreben, keine Neigung hat.

§. 392.

Ferner erfolgt die Zusammziehung des Einen Ventrikels nur im Gegensatze der synchronischen Zusammenziehung des andern, und die Zusammenziehung beyder Kammern nur im Gegensatze der Zusammenziehung der beyden Vorhöfe; zuletzt die Systole des Herzens nur im Gegensatze seiner Diastole, die contractive Bewegung nur im Gegensatze der expansiven. Das Herz ist das irritabelste Gebilde unter allen, der Focus der am reinsten als solche hervorgetretenen, und keiner höhern Funktion untergebenen Irritabilität, das Centrum des irritabeln Lebens. Daher ist es auch eine wahrhafte konkrete Darstellung der Antithese. Das Herz ist gleich dem ganzen Gefäſsesystem, und nimmt alles das, in Eins gebildet, in sich auf, was jenes in der Differenz und in der relativen Totalität ausdrückt. Das Herz empfängt daher jeden Gegensatz der ihrer Natur nach antagonistischen Gefäſsebildung überhaupt; das Herz ist nur thätig im Gegensatze, und

ist so lange thätig, als irgend ein Gegensatz in ihm rege ist: seine Thätigkeit ist selbst nur Ausdruck des Antagonismus.

§. 393.

So wie nun die beyden Kammern schon ursprünglich im wechselseitigen Gegensatze gebildet sind, — so wird diese Antithese der Polaritäten stets durch das Blut, was beyde in sich aufnehmen, nur angeregt, und der Intensitätsgrad der Spannung im Gefäßsesysteme erhöhet. Denn das Blut ist im Gefäßesysteme überall der dritte indifferente Körper, durch dessen Zerlegung die beyden antipolaren Metalle, welche hier durch das arterielle und venöse Gefäß repräsentirt werden, stets ihre Differenz nach momentan eingetretener Indifferenz wieder herstellen. Die Diastole des Herzens ist nun der Moment der Ladung der beyden Kammern mit sich entgegengesetzten Electricitäten aus ihren zuführenden venösen Gefäßen. So wie beyde Höhlen mit Blut von entgegengesetzter Qualität angefüllt, und die Antithese und electrische Spannung zwischen ihren Wandungen angeregt ist; so erfolgt ein electrischer Ausgleichungsprozeß, der von der Scheidewand, als durch welche die Indifferenz bezeichnet ist, ausgeht. Die Systole beyder Kammern ist somit gleich einem electrischen Schlage, wodurch eine Entladung geschieht: und die beyden Bewegungen des Herzens, Diastole und Systole, stellen die beyden Formen des electrischen Prozesses dar, den Electricitäts - Erregungsprozeß, und den electrischen Ausgleichungsprozeß. Die Diastole ist aber die expansive Bewe-

gung des Herzens, und die Syſtole iſt deſſen contractive Bewegung. Die expanſive Bewegung, welche unrichtig in muskulöſen Theilen ihre Erſchlaffung genannt wird, iſt bey langen Muskeln mit Vermehrung der Länge verbunden, da hingegen durch die contractive Thätigkeit die Länge beſchränkt, und die Breite hervorgerufen wird. Jedoch iſt hier die Bekräftigung der Dimenſion der Breite, und die negirte Ausdehnung nach der Länge in ſolchem Verhältniſſe, daſs mit der Zuſammenziehung irgend eines Muskels eine wahre Verminderung ſeines Volumens, und mit ſeiner Ausdehnung zugleich eine Vermehrung ſeines Volumens eintritt. Bey hohlen Muskeln iſt aus demſelben Grunde bey der Zuſammenziehung eine Verminderung der Capacität der Höhle, und bey der Ausdehnung eine Vermehrung ihrer räumlichen Capacität zugegen; jedoch iſt bey der erſten keine gänzliche Vernichtung aller Capacität, ſomit auch keine gänzliche Entleerung denkbar.

§. 394.

Es iſt aus dem vorhergehenden einleuchtend, daſs nie Zuſammenziehung der Ventrikeln des Herzens gleichzeitig ſeyn müſſe, — daſs in der Diaſtole, vermöge der Trennung der expanſiven und contractiven Thätigkeit in der Funktion des Herzens, der Grund der auf ſie folgenden Syſtole liege, und umgekehrt; — zuletzt daſs im normalen Zuſtande die Zuſammenziehung des Lungenherzens eben ſo nur dann erfolgen könne, wenn ſeine Höhle mit

schwarzem Blute erfüllt ist, als das Aortenherz sich nur über rothes Blut zusammenzieht. Beyde Arten des Blutes, das schwarze und das rothe, sind aber nicht bloss durch das quantitative Verhältniss ihrer Bestandtheile, und die heftiger reitzende Einwirkung des Einen vor dem Andern, sondern durch einen totalen Gegensatz der Qualitäten unterschieden. Indem jedoch das Blut in den Höhlen des Herzens nicht unmittelbar durch seine reitzende Einwirkung die Wandungen derselben zur Zusammenziehung solicitirt, sondern nur in so fern es diese in antipolaren Zustand versetzt, so dass das schwarze Blut im Lungenventrikel eben so wohl auf die Aktion des Aortenventrikels influirt, und umgekehrt; da ferner der Gegensatz der beyden Kammern ein höchst innerlicher, nicht von aussen her mitgetheilter, und auch nicht geradezu von der Gegenwart des Blutes abhängig ist; so ist wohl einzusehen, warum der Herzschlag noch fortdauert, auch wenn die hintere Kammer mit desoxydirtem, venösem Blute angefüllt ist; warum er jedoch nothwendig aufhört, sobald die Muskelsubstanz des Herzens und seine Kranzgefäfse mit schwarzem Blute durchdrungen sind. — Ferner pulsirt im normalen Zustande der hintere Ventrikel nur im Gegensatze des vordern; da jedoch dieser Antagonismus der beyden Kammern nicht der einzige in der Bildung des Herzens überhaupt ist, so kann auch im widernatürlichen Zustande, oft kurze Zeit vor dem Tode nur Ein Ventrikel sich zusammenziehen, indess der andere stille steht.

§. 395.

Die Herzenskammern verhalten ſich zu ihren Arterien, wie Identität zur Totalität: und daſſelbe Verhältniſs findet ſtatt zwiſchen den Vorhöfen, und den dieſen angehörigen Venen. Auf ſolche Weiſe ſind die Arterien im Gegenſatze mit den Herzenskammern und die Venen mit den Vorhöfen. Hiedurch iſt der Rhythmus in der Gefäſsebewegung beſtimmt. Die Syſtole der Herzenskammern trift mit der Diaſtole der Arterien zuſammen. Die ſynchroniſche Pulſation der beyden Venenſäcke iſt der Syſtole der Arterien entſprechend. Zuerſt ziehen ſich die Hohlvenen und gleichzeitig die Lungenvenen zuſammen. Dadurch werden die Venenſäcke mit Blut angefüllt. Dann folgt die Zuſammenziehung der Venenſäcke, und jetzt dringt das Blut in die Herzenskammern ein. Darauf entſteht die Syſtole der Kammern, dieſe aber iſt gleichzeitig die Zuſammenziehung der Venen: nun vermehrt ſich die Quantität des Blutes in den Arterien. Zuletzt ziehen ſich die Arterien zuſammen, und ihre Syſtole entſpricht der Syſtole der Venenſäcke. — Gleichzeitig alſo iſt im Gefäſseſyſtem die arterielle Richtungspolarität, und im Herzen die venöſe, gleichzeitig die venöſe im Gefäſseſyſtem, und die arterielle im Herzen prävalent. Es iſt nun einleuchtend, daſs bey der Fortbewegung des Blutes in den Gefäſsen die Blutſäule nicht gebrochen werde, da es im geſunden Zuſtande keine partielle Zuſammenziehungen einzelner Gefäſse giebt, — und

dafs die Continuität in dieser nirgends als durch die Klappen in den Venen aufgehoben werde.

Es giebt eigentlich vier Strömungen des Blutes: die erste erstreckt sich von der venösen Mündung des Aortenherzens durch dieses und das ganze Aortensystem: die zweyte von den Uranfängen der kleinsten Venen durch die beyden Hohladersysteme und den Hohlvenensack bis zur venösen Mündung des Lungenherzens: die dritte fängt von dieser Mündung an, und geht durch das Lungenherz, und das ganze System der Lungenschlagader hindurch: an deren Endigung im Capillargefäfsesystem die vierte Strömung anfängt, durch das Lungenvenensystem und den Lungenvenensack bis zur arteriellen Mündung von diesem sich fortsetzt. Von den vier Höhlen des Herzens aber gehört der vordere Sack den Hohlvenen, die vordere Kammer der Lungenschlagader, der hintere Sack den Lungenvenen, und die hintere Kammer der Aorte an.

§. 396.

Die Kraft der mitgetheilten Bewegung, mit welcher das Blut von dem Herzen fortgetrieben wird, läfst sich nicht im Allgemeinen bestimmen. Einige Jatromathematiker schätzen diese nur auf wenige Unzen, andere über 1000 Pfunde. Sowohl die anatomischen Voraussetzungen, auf welche ihre Berechnungen sich gründen, als die Berechnungen selbst, sind gröfstentheils irrig. — Gewifs ist die Kraft, mit der das Blut aus dem Herzen in die Arterien eingetrieben wird, bey den einzelnen Thieren nicht allein nach Verschiedenheit der Gattung und Art,

ſondern auch bey einzelnen Menſchen nach Verſchiedenheit der individuellen Conſtitution, des Alters, der Tageszeit, der gerade gegenwärtigen irritablen Stimmung, und auf andere Weiſe verſchieden.

§. 397.

Im Momente der Syſtole verlängert ſich das Herz von der Baſis gegen die Spitze hin; — ſo wie auch eine Verlängerung des Thorax im Momente der Exſpiration ſtatt findet. Beyde treten hier unter das Schema des Magnetismus. Dagegen geſchieht die Ausdehnung des Herzens und jene des Thorax — im Momente der Diaſtole und in jenem der Inſpiration beſonders nach der Breite. Vermöge jener Verlängerung des Herzens gegen die Spitze hin — im Momente der Syſtole — ſtöſst daſſelbe an die Wandung der Bruſthöhle mehr nach hinten im fünften und ſechſten — linken Intercoſtalraume. Und dieſs iſt der Grund des Herzſchlages. Irrig wird angenommen, die Urſache des Herzſchlages ſey die Blutanhäufung in den nach hinten gelagerten Vorhöfen, deren Ausdehnung, wobey ſie die Kammern vorwärts und abwärts verſchieben. Eben ſo wenig iſt der Herzensſchlag die Folge der Einſpritzung des Blutes in die Aorte, und der Gewalt, mit welcher hiebey die paraboliſche Krümmung dieſer Arterien ausgeglichen wird, wobey das an ihr gleichſam ſuſpendirte Herz eine Dislocation erleidet. — Allerdings aber findet eine Ortsveränderung des Herzens im Momente der Syſtole ſtatt. Das Herz, in Maſſe betrachtet, beſchreibt in

ſeinen verſchiedenen Bewegungen ein Stück von einer Axendrehung: und da die Baſis nach hinten befeſtiget iſt, ſo bewegt ſich die Spitze abwärts und vorwärts, — und in der entgegengeſetzten Richtung.

XV. Kapitel.

Blutlauf durch die Arterien.

§. 398.

Die Arterien gehen einſtämmig aus dem Herzen hervor: und das ganze arterielle Gefäſseſyſtem iſt als eine Evolution der Aorte zu betrachten. Die arterielle Gefäſsebildung iſt aber nicht nur eine Veräſtung der Stammhöhle, ſondern die Veräſtung iſt zugleich mit einer Vermehrung der Capacität der Stammhöhle verbunden: die Theilung des Stammgefäſses z. B. durch Bifurcation, iſt ſelbſt nur das äuſſere Zeichen jener Ausdehnung der Gefäſsehöhle, und der expanſiven Metamorphoſe, wodurch die Gefäſsebildung beſtimmt iſt. Arterien, welche beträchtliche Strecken durchlaufen, ohne Aeſte abzugeben, und ſolche, von welchen verhältniſsmäſsig nur wenige Aeſte entſpringen, — die gemeinſame Carotis, — die Vertebralarterie — verlieren nichts an der Gröſse ihres Durchmeſſers: ſie ſind vollkommen cylindriſch und nicht coniſch. — Die Summe der Durchmeſſer der Aeſte iſt aber gröſſer, als der Durchmeſſer des in ihnen expandirten Stammes. Das Blut bewegt ſich daher in den Arterien aus den minder geräumigen Höhlen in Gefäſshöhlen von gröſſerer Ca-

pacität. So wie nun die Expansion des ursprünglich contrahirten gleichmäßsig in der arteriellen Gefäßsebildung fortschreitet; so sind die kleinsten Arterien im Verhältnisse zu ihren Stammungen mehr expandirt, als die unmittelbaren Abkömmlinge der Aorte im Verhältniſs zu dieser: und in gleichem Verhältniſs nimmt die Differenz zwischen der Gröſse der Durchmesser des Stammes und jener der Summe der Aeste zu. Sonst richtet sich dieser Gröſsenunterschied wohl nach der Gröſse des Sinus des Winkels, in welchem die Aeste vom Stamme abgehen.

§. 399.

Denn die Stammarterie läſst strahlenförmig ihre Aeste sich ausbreiten, und diese gehen immer in gröſserem oder geringerem Winkel aus dem Stamme hervor. Da das ganze Gefäſsesystem in seiner besondern Bildung einem Electromotor vergleichbar, und der Kreislauf nur ein electrischer Leitungsprozeſs ist; da der electrische Prozeſs nun zu seinem Schema die Form des Winkels hat; so ist auch die Vertheilung unter der Form des Winkels ein allgemeines Gesetz der Gefäſsebildung. Alle Gefäſsehöhlen münden daher ineinander ein, und überall ist die innere Gefäſsehaut in Continuität. — Die Vertheilung des Stammes in den Aesten ist selbst nur ein büschelförmiges Zerfahren der Electricität des Stammes: und in der Figur der Aorte und ihrer zahlreichen Verästungen sind die divergirenden Büschel der positiven Electricität, die ihr eignen, auf dem bestäubten Harzkuchen gebildeten, langen, ästigauseinander gehenden Streifen, und in der Figur,

welche die Hohlvene mit ihren zahlreichen Verwurzelungen beſchreibt, ſind die rundlichen Flecken und die convergirenden Kegel, welche der negativen Electricität eigen ſind, dargeſtellt. So wie aber in jenen Büſcheln des poſitiv electriſchen Lichtes die Strahlen immer unter ſpitzen Winkeln ausgehen, ſo auch alle arterielle Aeſte vom Stamme. Je mehr ſich übrigens der Winkel, unter dem ein arterieller Aſt irgend eines Organes von ſeinem Stamme abgeht, der Rechtwinkelform nähert, je mehr alſo die Richtung des Aſtes von der Richtung des Stammes divergirt; deſto verſchiedener iſt die irritable Spannung jener Organe, zu welchen der Aſt hingeht, von der irritabeln Spannung des Organes, zu welchem ſich der Stamm begiebt. Die groſse Deflexion der Richtung der Nierenſchlagader vom Bauchſtück der Aorte beynahe unter der Form des rechten Winkels, deutet auf die wichtige Veränderung, welche dort das Blut in der kürzeſten Zeit erfährt. Merkwürdig iſt in dieſer Beziehung die Conſtruction des Bogens der Aorte. Die Carotiden ſind eigentlich ganz in der Direktion des Stammes der Aorte; es iſt alſo das in den Lungen neu oxydirte, neu belebte Blut, was zum Gehirne emporſteigt; die weitere Verbogung und Fortſetzung der Aorte aber iſt ganz auſſer der Direktion des Stammes, und es iſt wirklich nur ein Aſt der Aorte, der als umgebogene Aorte in ihrem Bruſt- und Bauchſtück herabſteigt: daher iſt die irritable Stimmung in den obern und in den untern Theilen, in den Bruſtgliedern und Beckengliedern ſo ſehr verſchieden; die Umbeugung der Aorte iſt übrigens das

einzige Beyſpiel einer ſolchen Anfractuoſität eines Arterienſtammes. Allenthalben entſtehen ſonſt die Aeſte unter ſpitzen Winkeln aus dem Stamme und im lebenden Zuſtande, wo die Celluloſität, welche die Arterie als dritte Haut und als celluloſe Atmosphäre umgiebt, in den Winkeln der Aeſte mit den Stämmen eigene Bändchen (ligamentula angularia) bildet, welche verſchwinden, wenn man das umgebende Zellengewebe von der Arterie lospräparirt, wo alsdann die Aeſte ſich mehr aufrichten, — ſind dieſe Winkel noch kleiner, als man ſie gewöhnlich an injicirten Arterienskeleten ſieht. Durch die Ermeſſungen jener Winkel an ausgetrockneten Arterien irregeleitet geben noch immer einige Anatomen jene Winkel zum Theil als rechte, zum Theil ſelbſt als ſtumpfe an. Uebrigens findet keine Progreſſion in der Zu- oder Abnahme der Gröſse der Winkel von den primären zu den ſecundären und weitern Veräſtungen hin ſtatt, und der Winkel, welchen ein Aſtgefäſs mit ſeinem Stamme beſchreibt, richtet ſich einzig nach der Differenz der irritabeln Stimmung der Organe. Die Anaſtomoſen der Arterien ſind ein Zeichen der Unvollkommenheit der arteriellen Gefäſsebildung. Zwar ſind die Anaſtomoſen im arteriellen Gefäſsegeſchlecht bey weitem minder zahlreich als im venöſen, und im venöſen minder als im lymphatiſchen, in welchem es über der Frequenz der Anmündung ganz nicht zur Individualiſirung des Gefäſses ſelber kömmt. Jede Anaſtomoſe nämlich iſt eine momentane Aufhebung der individuellen Bildung der anaſtomoſirenden Gefäſse. Man giebt drey Formen arterieller Anaſtomoſen an,

1) die Form eines arteriellen Gefäſsebogens, 2) jene der Transverſaläſte, 3) den gemeinſchaftlichen Uebergang zweyer Arterien in eine Dritte. Allein dieſe drey Formen ſtellen nur Varietäten Einer und derſelben Bildung, nämlich das Zurücklaufen der arteriellen in die venöſe Gefäſsebildung dar. Die Anmündung geſchieht in der dritten Art unter der Form des Winkels, in der erſten unter der Form des Bogens dieſes Winkels, in der zweyten unter der Form der Sehne dieſes Bogens. Es iſt aber immer nur jener Winkel, der durch dieſe Sehne und den von ihr geſpannten Bogen gemeſſen wird. Und immer iſt es die Vereinigung zweyer kleiner Arterien in eine dritte, deren Durchmeſſer gröſſer iſt als der Durchmeſſer jeder der beyden erſten einzeln genommen, und kleiner als die Summe der Durchmeſſer beyder. Es ſind alſo ganz die Geſetze der venöſen Gefäſsebildung, nach welchen die Anaſtomoſe der Arterienzweige geſchieht: ſo wie weiterhin die kropfartige Erweiterung der Venen im Zurückſinken der Venoſität in die lymphatiſche Gefäſseform iſt. Daher haben die edelſten Arterien die wenigſten Anaſtomoſen ihrer Aeſte. Zwey Arterien tendiren aber um ſo mehr zur Gemeinſchaft untereinander mittelſt anaſtomoſirender Communicationsäſte zu gelangen, je gröſſer die Differenz zwiſchen beyden, und je ungleicher ihre irritable Spannung iſt; daher die Anaſtomoſe zwiſchen den tiefen Aeſten der Baſilararterien, die aus der Vereinigung der beyden Vertebralarterien entſteht, und dem hintern Aſt der Carotiden. Die Anaſtomoſe, ſo wie ſie ſelber nach dem Geſetze der venöſen Gefäſsebildung geſchieht,

stellt selbst den Uebergang der Arterien in Venen dar, und die Arteriennetze sind nur gebildet durch die frequentesten Anastomosen der Capillararterien. Die Anastomose wird also um so häufiger, je kleiner die Arterien werden; aber die kleinen Arterien sind auch die am meisten individualisirten. Das Malpighische Netz, die cavernöse Substanz der höhlichten Körper des männlichen Gliedes und der Harnröhre, die arteriellen Häute und das gefäſsreiche Parenchym einiger Organe sind bloſs durch die Ausbreitung der kleinsten Arterien mittelst der frequentesten Anastomose gebildet.

§. 400.

Zur vollesten Entwicklung sind in den Wandungen der Arterien die drey Häute gediehen, welche schon minder entwickelt in den Venen vorkommen. Die muskulöse Haut ist bey weitem mehr individualisirt in den Arterien, als in den Venen, sie ist dicht, hart, gelblich, und besteht aus deutlich unterscheidbaren Ringfasern. Jedoch wird von den Muskelfasernringen der Cylinder der Arterie nicht ganz umfaſst, noch weniger winden sich die Fasern spiralförmig um die Arterie; sondern so wie die Knorpelringe der Luftröhre keine ganzen Ringe bilden, so auch die Fasern der Muskelhaut der Arterien. Die Ringfasern der Arterien sind im Gegensatze der länglichen Fasern in den Venen gebildet, und so wie in andern Fleischhäuten die Schichtung der länglichen Fasern gegen jene der Ringfasern Polarität zeigt, so sind hier beyde an die sich entgegengesetzten Hälften des Gefäſssy-

ſtems vertheilt. Dagegen kommen in den Wandungen der Arterien der kaltblütigen Thiere, bey welchen überhaupt die Arterien den Grad der Individualiſirung erreicht haben, welchen die Venen in den warmblütigen Thieren, und bey welchen ſich die Venen wie die Lymphgefäſse bey den letzten verhalten, offenbar Longitudinalfaſern vor.

§. 401.

Die äuſſere Haut iſt zellicht, bald mehr bald weniger verdichtet, nur an einzelnen Stellen, da, wo die Arterien am Bruſtfell, oder Bauchfell vorbeyſtreichen, als ſeröſe Haut geſtaltet, — ein Grenzgebilde, was zur Eigenthümlichkeit der Gefäſsebildung nichts beyträgt. Die innere Haut und die mittlere verhalten ſich in den Gefäſsen zu einander, wie die Schleimhaut und die Fleiſchhaut in der Bildung des Darmcanales, und ähnlicher Höhlen. Die Tendenz der arteriellen Gefäſsebildung geht nun darauf hin, die Fleiſchhaut übergewichtig über die innere Haut zu ſetzen, und je mehr die erſte an individueller Bildung gewinnt, deſto mehr tritt die innere Haut zurück, und erhält in den Arterien zuletzt nur die Bedeutung einer Epidermoidalbildung. Je mehr dagegen in den Venen die Bildung der Fleiſchhaut beſchränkt iſt, deſto mehr präponderirt die innere Haut, die ſich hier in Klappen verlängert, ähnlich den Klappen der Schleimhaut des Darmcanales u. ſ. f. Es iſt daher der Gegenſatz der innern Haut, und der eigenthümlichen Gefäſsehaut, welcher die Gefäſsebewegung beſtimmt.

§. 402.

So wie das Bildungsgesetz des Organismus dieses ist, daſs alles in allem wiederkehre, und immer das Eine sich im Andern wiederhole, so besitzen die Arterien zahlreiche Nerven, die in verschiedenen Geflechten, einem näher anliegenden, und einem mehr entfernten sie umgeben. Das entferntere, durch Zellengewebe getrennte, Nervengeflecht, welches den Stamm einer Arterie umstrickt, legt sich in der Folge unmittelbar dem Aste an: und die beyden Nervengeflechte, das nähere und entferntere, vermitteln den Gegensatz des Stammes und der *Aeste* überhaupt. In den Wandungen der gröſsern Gefäſse erkennt man deutlich wieder Arterien und Venen, welche sich zu ihnen, wie die Kranzgefäſse zu dem Herzen verhalten.

Im arteriellen Gefäſsegeschlechte sind die Stämme die frühest gebildeten, in denen der Keim der ganzen Evolution niedergelegt ist. Das Gegentheil findet in den Venen statt. Daher sind in den Arterien die Aeste individueller gebildet als die Stämme, und die Zweige sind mehr individualisirt als die Aeste. In den Venen aber, welche durch Contraction sich gestalten, ist in den Stämmen die gröſste Vollkommenheit der Bildung. Die Vollkommenheit der arteriellen Gefäſsebildung beruht aber auf der Entwicklung des Muskelgewebes: daher sind die Fleischfasern in den Häuten der kleinen Arterien mehr individualisirt, mehr geröthet, und wirklichen Muskelfasern gleich gebildet, als in den Stämmen. Daher widerstehen die kleinen Arterien mehr

als die grofsen der Zerreiffung, und die Aneurisme derfelben find felten. Eben fo befitzen auch die kleinften Arterien eine verhältnifsmäfsig gröffere Anzahl von Nerven: — die Geflechte, welche fich in der Nähe der Zellhaut der gröffern Arterien befinden, ohne in fie einzugehen, bleiben diefen felbft fremde; und fie nähern fich den Wandungen der Arterien um fo mehr, je kleiner fie werden, und verlieren fich zuletzt in die Kleinften. Vermöge diefer mehreren Entwicklung der Fleifchhaut, und vermöge des höher potenzirten Gegenfatzes zwifchen ihr und den Gefäfsnerven ift auch die irritable Stimmung in den kleinern Gefäfsen höher als in den gröffern, daher ift hier die eigenthümliche Gefäfsebewegung energifcher; und fo wie die Fortleitung des Blutes in den gröffern Arterien, befonders in den Präcordialgefäfsen, mehr unter der Herrfchaft des Herzens und feiner Propulfativkraft fteht, ohne darum die, obgleich geringere, Selbftthätigkeit ihrer Wandungen ganz auszufchlieffen; fo hört der Einflufs des Herzens in den kleinften Arterien und in den arteriellen Endigungen beynahe ganz auf, und die Wirkung der vis a tergo ift im Capillargefäfsefyftem ganz auf Null gebracht.

§. 403.

Die Arterien, als die edelfte Art in der Gefäfsegattung, find auch die mindeft zahlreichen. Beynahe jede beträchtliche Arterie wird wenigftens von einem Zwillingspaar von Venen begleitet. Ueberall haben fich auch die Arterien nur im Gegenfatze der vollen-

vollendetern, meist individualisirten Venen gebildet. Den oberflächlichen Venen entsprechen keine Arterien, eben so wenig als den Venen, welche in den Interstitien der einzelnen Fasernbündel der Muskeln kriechen; — die Arterien suchen überall die Tiefe, und gleichsam ihr Edelstes, hat die Natur sie allenthalben von der Oberfläche weg in die Tiefe geflüchtet, und so vor äussern Verletzungen bewahret.

§. 404.

Die Durchmesser der Arterien sind vollkommen entschieden: es ist die grösste Constanz in jenem Gesetz der Zunahme der Capacität; noch bey den Venen finden beträchtliche Abweichungen statt. Aber bey den Arterien verlauft die Metamorphose nach einer unwandelbaren Regel. Eben so ist die Gestaltung im arteriellen Systeme, und dessen Verzweigung noch immer einigen, obgleich bey weitem wenigern Abweichungen, als jene im Venensysteme, unterworfen. Die Arterien künden sich eben dadurch als das edelste Gefäsgeschlecht an.

§. 405.

So wie in den Arterien die Metamorphose in der Gefäsebildung fortschreitet durch die Expansion der Stämme in den Aesten, und so wie die Verästung der Aorte selbst nichts anders ist als das Symbol jener expansiven Metamorphose, — so folgt auch das Blut jener Bewegungsrichtung, und wird in den Arterien von dem Herzen aus in die Stammarterie, von dieser in ihre Aeste, deren

Zweige und Endigungen getrieben. Dieſs erweiſst ſich durch die Maſchineneinrichtung, nach welcher das arterielle Gefäſseſyſtem conſtruirt iſt, durch die Anſchwellung der Arterien oberhalb eines um ſie angelegten Bandes, die Stillung arterieller Blutungen aus verwundeten Gefäſsen bey Unterbindung oder Zuſammendrückung der Arterie während ihres Verlaufes zwiſchen dem Herzen und der Wundſtelle, mit Ausnahme der anaſtomoſirenden Arterien. Zuletzt kann man die progreſſive Bewegung des Blutes in den Arterien beſonders bey kaltblütigen Thieren, namentlich in der Harnblaſe der Fröſche, mit bewaffneten Augen ſehen. Wenn die Arterien nach dem Tode blutleer angetroffen werden, ſo kömmt dieſs von daher, weil die Arterien ſpäter ſterben als die Venen, folglich zuletzt das Blut in das Capillargefäſseſyſtem und durch dieſes in die Venen übertreiben. Aber auch nach dem Tode, und ſelbſt nach dem asphyctiſchen Tode findet man beynahe nie die Arterien und den linken Ventrikel des Herzens ganz leer, ſondern immer iſt etwas Blut darin enthalten.

§. 406.

Das Blut wird in die Arterien nicht nur von den Stämmen gegen die Aeſte bewegt, und ſeine Bewegung folgt alſo der expanſiven Richtung, welche der fortſchreitenden Metamorphoſe der arteriellen Gefäſsebildung ſelbſt eigen iſt; ſondern das Blut wird in der Progreſſion des arteriellen Kreislaufes ſelbſt expandirt, und ſomit verdünnt. Die Rarefaction des Blutes aber iſt nicht gemäſs der Börhav'ſchen Theorie die Folge einer mechaniſchen

Theilung, wodurch die rothen Kügelchen in gelbe, und diese in weisse, in Uebereinstimmung mit der Grösse der Durchmesser der Gefässe zerfallen; sondern die Verdünnung und Auflösung des Blutes, und namentlich der Blutkügelchen, ist auf dynamische Weise als eine Qualitätsveränderung derselben vorstellbar. Das Blut wird in der Progression des arteriellen Kreislaufes stetig desoxydirt, in demselben Verhältnisse, als die Versauerstoffung der arteriellen Gefässewandungen durch die Zerlegung des Blutes vor sich geht. Da nun aber die Bildung der Kügelchen im Blute besonders von der Gegenwart des Faserstoffes abhängig ist, die Röthung aber von der Gegenwart des colorirenden Bestandtheiles, und von dem Oxydationsgrade des Eyweissstoffes; da somit die Oxydation des Blutes die Bildung der rothen Kügelchen bestimmt; so ist begreiflich, dass bey fortschreitender Desoxydation des Blutes in der Progression des arteriellen Kreislaufes, und mit der Absetzung des Sauerstoffes an die Wandungen der Arterien die rothen Kügelchen im Blute endlich verschwinden; gleichzeitig wird das Serum über den Faser- und Färbestoff überwiegend, und im Serum wieder das Wasser und die Salze über den Eyweissstoff. Einige Capillargefässe, welche aus der Verzweigung der Arterien, und aus den arteriellen Endigungen gebildet sind, führen noch rothes, obgleich immer mehr blasses und missfärbiges, Fleischwasser ähnliches Blut; — andere führen ein wirkliches Serum, weisse oder gelbliche Säfte.

Gewiſs geht aber die Expanſion des Blutes in den kleinſten Gefäſsen noch weiter, bis zur Auflöſung in Dunſtflüſſigkeit; und diejenigen Capillargefäſse, welche weder rothes Blut, noch weiſſe Säfte führen, und von welchen insgemein angenommen wird, daſs ſie leer ſeyen (was ſelbſt noch Bichat behauptet), ſind höchſt wahrſcheinlich mit dem am meiſten expandirten Theil des Blutes, nämlich mit Blutgaſs angefüllt. Das Blutgaſs iſt aber auch der am meiſten desoxydirte Theil des Blutes, oder das Blut ſelbſt im Zuſtande der relativ gröſsten Entſauerſtoffung, womit ſein eigenthümlicher thieriſcher Geruch, ſeine ammoniacaliſche Natur, ſeine ſchnelle Corruptel übereinſtimmt. Wenn nun in ſolchen Capillargefäſsen bey gegebenen Veränderungen rothes Blut oder weiſſe Säfte erſcheinen, ſo iſt dieſs nicht ſowohl eine Folge des Andranges neuen Blutes in vorher entleerte Gefäſse, ſondern des Niederſchlages von Blutdunſt, der vorher ſchon in jenen Gefäſsen enthalten war, in tropfbarflüſſiger Geſtalt. Der turga vitalis iſt eben ſo nicht bloſs eine Folge des Expanſionszuſtandes des Zellengewebes, ſondern eben ſo der Erfüllung der Capillargefäſse mit Blutdunſt.

§. 407.

Die einzig mögliche Endigung der Arterien iſt von daher jene im Capillargefäſseſyſtem; in dieſem erliſcht die arterielle Gefäſsepolarität und gleichzeitig verſchwindet auch, jedoch nicht überall vollkommen, der arterielle Charakter des Blutes. Nirgendswo enden die Arterien wirklich in exhalirende Ge-

fäſse, ſondern die exhalirenden Canäle entſpringen einzig aus dem Capillargefäſseſyſtem, welches hier als vermittelndes eintritt. Noch weniger geſchieht die Exhalation aus den Seitenporen der Arterien, oder aus offenſtehenden Endigungen derſelben. Aber eben ſo gewiſs iſt es auch, daſs keine Umbeugung der kleinſten Arterien in wirkliche Venen ſtatt findet. Alle Venen entſpringen aus dem Capillargefäſseſyſtem, und es giebt eben ſo wenig abſorbirende Venen, als exhalirende Arterien. Abſorption und Exhalation iſt nur durch Gefäſse vom kleinſten Durchmeſſer vermittelt. Gäbe es wirklich einen unmittelbaren Uebergang der Arterien in die Venen, ſo müſste im Verlaufe irgend eines Gefäſses eine Stelle vorkommen, wo daſſelbe zugleich Arterie und Vene wäre. Glücklich geleitete feinere Injectionsmaſſen dringen zuerſt aus den Arterien nur in das Capillargefäſseſyſtem ein, und nur in der Folge und wenn ſie noch weiter dringen, regurgitiren ſie durch die Venen.

§. 408.

Die Gefäſse beſtimmter Organe ſind zwar in der Metamorphoſe dieſer letzten durch die Thierreiche hindurch nicht ſo ſehr nach unwandelbaren Typen, als die Nerven gebildet; da immer auch bey der gröſsten räumlichen Verſchiedenheit in der Lage der Organe die nämlichen Nervenpaare zu ihnen gelangen; da hingegen ihre Gefäſse oft dem Urſprunge nach wechſeln, und von benachbarten Stämmen entſpringen. So entſpringen bey Thieren mit ſehr langem Halſe auch die untern Schilddrü-

ſenſchlagadern nicht mehr von der ſehr entfernten Achſelſchlagader, ſondern mittelbar von der Carotis. Aber da, wo dieſs von wichtigern Arterien und gröſſern Stämmen der Fall iſt, treten immer auch mit dem veränderten Urſprunge der Arterien wichtige Veränderungen in der Bildung und Bedeutung der Organe ſelbſt ein. Die Bedeutung und die individuelle Bildung eines Organes iſt überhaupt um ſo höher geſteigert, je gröſſer die Dignität ſeiner Gefäſse iſt, je mehr dieſe daher Arterien der zweyten Ordnung ſind u. ſ. f. Je mehr ſie aber an Dignität verlieren, und von den Arterien anderer Theile entſpringen, deſto mehr verliert auch das Organ am Grade ſeiner Entwicklung und individuellen Ausbildung. Schon bey vielen Säugethieren entſtehet die Carotis der linken Seite nicht mehr von der Aorte, ſondern häufig gleich jener der rechten Seite mit der Subclavia in gemeinſamem Stamme. In demſelben Verhältniſſe tritt aber auch die Gehirnbildung, zuerſt von der linken Seite, zurück.

Bey den Vögeln ſind die Carotiden nicht mehr Arterien der erſten Ordnung, ſondern ſie entſtehen zugleich mit den Vertebralarterien von den Unterſchlüſſelbeinſchlagadern, ſelbſt nachdem dieſe ſchon beträchtliche Gefäſse an die Seitentheile des Halſes, an den Oeſophagus etc. abgegeben haben. Daher das ſchon hier verſchwindende Uebergewicht der Gehirnbildung. Bey den Amphibien erliſcht ſchon der Gegenſatz der äuſſern und der innern Carotis: da ſich der Stamm derſelben nicht mehr theilet. Und in abſteigender Ordnung durch die Thierreiche hindurch verlieren weiter hin die Caro-

tiden immer mehr an Selbſtſtändigkeit in gleichem Verhältniſſe als die Bildung des Gehirnes zurücktritt.

Daſſelbe Verhältniſs waltet ob bey den Schlagadern der Milz, der Nieren, und anderer Theile.

§. 409.

So wie die Aorte bey den höhern Thieren einſtämmig iſt, ſo gelangt auch zu jedem wichtigern Organe nur Ein Hauptgefäſs. Eben ſo beſitzt jede Extremität Einen gröſſern Arterienſtamm. Da aber keine Arterie ihre Bedeutung aus ſich ſelbſt hat, ſondern jede für ſich Bedeutungslos iſt, und ihr beſonderes Leben aus dem ganzen Syſteme herleitet, in welches ſie aufgenommen iſt; ſo iſt auch das Leben keines Organes von Einer Arterie allein abhängig; ſondern der Hauptarterie gegen über bilden ſich mehrere Nebenarterien, welche zum Theil von ganz andern, und entlegenen Stämmen entſpringen. So im Gegenſatze der groſsen Schenkelſchlagader die Verſtopfungs- die Gefäſsemuskel- die Sitzbeinſchlagader, und andere. Die Abkömmlinge dieſer letzten anaſtomoſiren ſo häufig mit jenen der erſten, daſs auch, wenn der Canal der Hauptſchlagader an einer beſtimmten Stelle verſchloſſen und undurchgängig iſt, der Blutlauf durch die erweiterten Seitengefäſse in dem Gliede, auch tiefer unten in den Abkömmlingen der Hauptſchlagader unterhalten werden kann. Eben ſo giebt die Hauptſchlagader eines Gliedes immer ſchon hoch oben groſse, ſie begleitende Nebenarterien ab, deren Abkömmlinge mit ihren ſpätern Aeſten

daſs die Continuität in dieſer nirgends als durch die Klappen in den Venen aufgehoben werde.

Es giebt eigentlich vier Strömungen des Blutes: die erſte erſtreckt ſich von der venöſen Mündung des Aortenherzens durch dieſes und das ganze Aortenſyſtem: die zweyte von den Uranfängen der kleinſten Venen durch die beyden Hohladerſyſteme und den Hohlvenenſack bis zur venöſen Mündung des Lungenherzens: die dritte fängt von dieſer Mündung an, und geht durch das Lungenherz, und das ganze Syſtem der Lungenſchlagader hindurch: an deren Endigung im Capillargefäſseſyſtem die vierte Strömung anfängt, durch das Lungenvenenſyſtem und den Lungenvenenſack bis zur arteriellen Mündung von dieſem ſich fortſetzt. Von den vier Höhlen des Herzens aber gehört der vordere Sack den Hohlvenen, die vordere Kammer der Lungenſchlagader, der hintere Sack den Lungenvenen, und die hintere Kammer der Aorte an.

§. 396.

Die Kraft der mitgetheilten Bewegung, mit welcher das Blut von dem Herzen fortgetrieben wird, läſst ſich nicht im Allgemeinen beſtimmen. Einige Jatromathematiker ſchätzen dieſe nur auf wenige Unzen, andere über 1000 Pfunde. Sowohl die anatomiſchen Vorausſetzungen, auf welche ihre Berechnungen ſich gründen, als die Berechnungen ſelbſt, ſind gröſstentheils irrig. — Gewiſs iſt die Kraft, mit der das Blut aus dem Herzen in die Arterien eingetrieben wird, bey den einzelnen Thieren nicht allein nach Verſchiedenheit der Gattung und Art,

ſondern auch bey einzelnen Menſchen nach Verſchiedenheit der individuellen Conſtitution, des Alters, der Tageszeit, der gerade gegenwärtigen irritablen Stimmung, und auf andere Weiſe verſchieden.

§. 397.

Im Momente der Syſtole verlängert ſich das Herz von der Baſis gegen die Spitze hin; — ſo wie auch eine Verlängerung des Thorax im Momente der Exſpiration ſtatt findet. Beyde treten hier unter das Schema des Magnetismus. Dagegen geſchieht die Ausdehnung des Herzens und jene des Thorax — im Momente der Diaſtole und in jenem der Inſpiration beſonders nach der Breite. Vermöge jener Verlängerung des Herzens gegen die Spitze hin — im Momente der Syſtole — ſtöſst daſſelbe an die Wandung der Bruſthöhle mehr nach hinten im fünften und ſechſten — linken Intercoſtalraume. Und dieſs iſt der Grund des Herzſchlages. Irrig wird angenommen, die Urſache des Herzſchlages ſey die Blutanhäufung in den nach hinten gelagerten Vorhöfen, deren Ausdehnung, wobey ſie die Kammern vorwärts und abwärts verſchieben. Eben ſo wenig iſt der Herzensſchlag die Folge der Einſpritzung des Blutes in die Aorte, und der Gewalt, mit welcher hiebey die paraboliſche Krümmung dieſer Arterien ausgeglichen wird, wobey das an ihr gleichſam ſuſpendirte Herz eine Dislocation erleidet. — Allerdings aber findet eine Ortsveränderung des Herzens im Momente der Syſtole ſtatt. Das Herz, in Maſſe betrachtet, beſchreibt in

ſeinen verſchiedenen Bewegungen ein Stück von einer Axendrehung: und da die Baſis nach hinten befeſtiget iſt, ſo bewegt ſich die Spitze abwärts und vorwärts, — und in der entgegengeſetzten Richtung.

XV. Kapitel.

Blutlauf durch die Arterien.

§. 398.

Die Arterien gehen einſtämmig aus dem Herzen hervor: und das ganze arterielle Gefäſseſyſtem iſt als eine Evolution der Aorte zu betrachten. Die arterielle Gefäſsebildung iſt aber nicht nur eine Veräſtung der Stammhöhle, ſondern die Veräſtung iſt zugleich mit einer Vermehrung der Capacität der Stammhöhle verbunden: die Theilung des Stammgefäſses z. B. durch Bifurcation, iſt ſelbſt nur das äuſſere Zeichen jener Ausdehnung der Gefäſsehöhle, und der expanſiven Metamorphoſe, wodurch die Gefäſsebildung beſtimmt iſt. Arterien, welche beträchtliche Strecken durchlaufen, ohne Aeſte abzugeben, und ſolche, von welchen verhältniſsmäſsig nur wenige Aeſte entſpringen, — die gemeinſame Carotis, — die Vertebralarterie — verlieren nichts an der Gröſse ihres Durchmeſſers: ſie ſind vollkommen cylindriſch und nicht coniſch. — Die Summe der Durchmeſſer der Aeſte iſt aber gröſſer, als der Durchmeſſer des in ihnen expandirten Stammes. Das Blut bewegt ſich daher in den Arterien aus den minder geräumigen Höhlen in Gefäſshöhlen von gröſſerer Ca-

pacität. So wie nun die Expansion des ursprünglich contrahirten gleichmäßsig in der arteriellen Gefäſsebildung fortschreitet; so sind die kleinsten Arterien im Verhältnisse zu ihren Stammungen mehr expandirt, als die unmittelbaren Abkömmlinge der Aorte im Verhältniſs zu dieser: und in gleichem Verhältniſs nimmt die Differenz zwischen der Gröſse der Durchmesser des Stammes und jener der Summe der Aeste zu. Sonst richtet sich dieser Gröſsenunterschied wohl nach der Gröſse des Sinus des Winkels, in welchem die Aeste vom Stamme abgehen.

§. 399.

Denn die Stammarterie läſst strahlenförmig ihre Aeste sich ausbreiten, und diese gehen immer in gröſserem oder geringerem Winkel aus dem Stamme hervor. Da das ganze Gefäſsesystem in seiner besondern Bildung einem Electromotor vergleichbar, und der Kreislauf nur ein electrischer Leitungsprozeſs ist; da der electrische Prozeſs nun zu seinem Schema die Form des Winkels hat; so ist auch die Vertheilung unter der Form des Winkels ein allgemeines Gesetz der Gefäſsebildung. Alle Gefäſsehöhlen münden daher ineinander ein, und überall ist die innere Gefäſsehaut in Continuität. — Die Vertheilung des Stammes in den Aesten ist selbst nur ein büschelförmiges Zerfahren der Electricität des Stammes: und in der Figur der Aorte und ihrer zahlreichen Verästungen sind die divergirenden Büschel der positiven Electricität, die ihr eignen, auf dem bestäubten Harzkuchen gebildeten, langen, ästigauseinander gehenden Streifen, und in der Figur,

welche die Hohlvene mit ihren zahlreichen Verwurzelungen beſchreibt, ſind die rundlichen Flecken und die convergirenden Kegel, welche der negativen Electricität eigen ſind, dargeſtellt. So wie aber in jenen Büſcheln des poſitiv electriſchen Lichtes die Strahlen immer unter ſpitzen Winkeln ausgehen, ſo auch alle arterielle Aeſte vom Stamme. Je mehr ſich übrigens der Winkel, unter dem ein arterieller Aſt irgend eines Organes von ſeinem Stamme abgeht, der Rechtwinkelform nähert, je mehr alſo die Richtung des Aſtes von der Richtung des Stammes divergirt; deſto verſchiedener iſt die irritable Spannung jener Organe, zu welchen der Aſt hingeht, von der irritabeln Spannung des Organes, zu welchem ſich der Stamm begiebt. Die groſse Deflexion der Richtung der Nierenſchlagader vom Bauchſtück der Aorte beynahe unter der Form des rechten Winkels, deutet auf die wichtige Veränderung, welche dort das Blut in der kürzeſten Zeit erfährt. Merkwürdig iſt in dieſer Beziehung die Conſtruction des Bogens der Aorte. Die Carotiden ſind eigentlich ganz in der Direktion des Stammes der Aorte; es iſt alſo das in den Lungen neu oxydirte, neu belebte Blut, was zum Gehirne emporſteigt; die weitere Verbogung und Fortſetzung der Aorte aber iſt ganz auſſer der Direktion des Stammes, und es iſt wirklich nur ein Aſt der Aorte, der als umgebogene Aorte in ihrem Bruſt- und Bauchſtück herabſteigt: daher iſt die irritable Stimmung in den obern und in den untern Theilen, in den Bruſtgliedern und Beckengliedern ſo ſehr verſchieden; die Umbeugung der Aorte iſt übrigens das

einzige Beyſpiel einer ſolchen Anfractuoſität, eines Arterienſtammes. Allenthalben entſtehen ſonſt die Aeſte unter ſpitzen Winkeln aus dem Stamme und im lebenden Zuſtande, wo die Celluloſität, welche die Arterie als dritte Haut und als celluloſe Atmosphäre umgiebt, in den Winkeln der Aeſte mit den Stämmen eigene Bändchen (ligamentula angularia) bildet, welche verſchwinden, wenn man das umgebende Zellengewebe von der Arterie lospräparirt, wo alsdann die Aeſte ſich mehr aufrichten, — ſind dieſe Winkel noch kleiner, als man ſie gewöhnlich an injicirten Arterienskeleten ſieht. Durch die Ermeſſungen jener Winkel an ausgetrockneten Arterien irregeleitet geben noch immer einige Anatomen jene Winkel zum Theil als rechte, zum Theil ſelbſt als ſtumpfe an. Uebrigens findet keine Progreſſion in der Zu- oder Abnahme der Gröſse der Winkel von den primären zu den ſecundären und weitern Veräſtungen hin ſtatt, und der Winkel, welchen ein Aſtgefäſs mit ſeinem Stamme beſchreibt, richtet ſich einzig nach der Differenz der irritabeln Stimmung der Organe. Die Anaſtomoſen der Arterien ſind ein Zeichen der Unvollkommenheit der arteriellen Gefäſsebildung. Zwar ſind die Anaſtomoſen im arteriellen Gefäſsegeſchlecht bey weitem minder zahlreich als im venöſen, und im venöſen minder als im lymphatiſchen, in welchem es über der Frequenz der Anmündung ganz nicht zur Individualiſirung des Gefäſses ſelber kömmt. Jede Anaſtomoſe nämlich iſt eine momentane Aufhebung der individuellen Bildung der anaſtomoſirenden Gefäſse. Man giebt drey Formen arterieller Anaſtomoſen an,

1) die Form eines arteriellen Gefäſsebogens, 2) jene der Transverſaläſte, 3) den gemeinſchaftlichen Uebergang zweyer Arterien in eine Dritte. Allein dieſe drey Formen ſtellen nur Varietäten Einer und derſelben Bildung, nämlich das Zurücklaufen der arteriellen in die venöſe Gefäſsebildung dar. Die Anmündung geſchieht in der dritten Art unter der Form des Winkels, in der erſten unter der Form des Bogens dieſes Winkels, in der zweyten unter der Form der Sehne dieſes Bogens. Es iſt aber immer nur jener Winkel, der durch dieſe Sehne und den von ihr geſpannten Bogen gemeſſen wird. Und immer iſt es die Vereinigung zweyer kleiner Arterien in eine dritte, deren Durchmeſſer gröſſer iſt als der Durchmeſſer jeder der beyden erſten einzeln genommen, und kleiner als die Summe der Durchmeſſer beyder. Es ſind alſo ganz die Geſetze der venöſen Gefäſsebildung, nach welchen die Anaſtomoſe der Arterienzweige geſchieht: ſo wie weiterhin die kropfartige Erweiterung der Venen im Zurückſinken der Venoſität in die lymphatiſche Gefäſseform iſt. Daher haben die edelſten Arterien die wenigſten Anaſtomoſen ihrer Aeſte. Zwey Arterien tendiren aber um ſo mehr zur Gemeinſchaft untereinander mittelſt anaſtomoſirender Communicationsäſte zu gelangen, je gröſſer die Differenz zwiſchen beyden, und je ungleicher ihre irritable Spannung iſt; daher die Anaſtomoſe zwiſchen den tiefen Aeſten der Baſilararterien, die aus der Vereinigung der beyden Vertebralarterien entſteht, und dem hintern Aſt der Carotiden. Die Anaſtomoſe, ſo wie ſie ſelber nach dem Geſetze der venöſen Gefäſsebildung geſchieht,

ſtellt ſelbſt den Uebergang der Arterien in Venen dar, und die Arteriennetze ſind nur gebildet durch die frequenteſten Anaſtomoſen der Capillararterien. Die Anaſtomoſe wird alſo um ſo häufiger, je kleiner die Arterien werden; aber die kleinen Arterien ſind auch die am meiſten individualiſirten. Das Malpighiſche Netz, die cavernöſe Subſtanz der höhlichten Körper des männlichen Gliedes und der Harnröhre, die arteriellen Häute und das gefäſsreiche Parenchym einiger Organe ſind bloſs durch die Ausbreitung der kleinſten Arterien mittelſt der frequenteſten Anaſtomoſe gebildet.

§. 400.

Zur volleſten Entwicklung ſind in den Wandungen der Arterien die drey Häute gediehen, welche ſchon minder entwickelt in den Venen vorkommen. Die muskulöſe Haut iſt bey weitem mehr individualiſirt in den Arterien, als in den Venen, ſie iſt dicht, hart, gelblich, und beſteht aus deutlich unterſcheidbaren Ringfaſern. Jedoch wird von den Muskelfaſernringen der Cylinder der Arterie nicht ganz umfaſst, noch weniger winden ſich die Faſern ſpiralförmig um die Arterie; ſondern ſo wie die Knorpelringe der Luftröhre keine ganzen Ringe bilden, ſo auch die Faſern der Muskelhaut der Arterien. Die Ringfaſern der Arterien ſind im Gegenſatze der länglichen Faſern in den Venen gebildet, und ſo wie in andern Fleiſchhäuten die Schichtung der länglichen Faſern gegen jene der Ringfaſern Polarität zeigt, ſo ſind hier beyde an die ſich entgegengeſetzten Hälften des Gefäſsſy-

ſtems vertheilt. Dagegen kommen in den Wandungen der Arterien der kaltblütigen Thiere, bey welchen überhaupt die Arterien den Grad der Individualiſirung erreicht haben, welchen die Venen in den warmblütigen Thieren, und bey welchen ſich die Venen wie die Lymphgefäſse bey den letzten verhalten, offenbar Longitudinalfaſern vor.

§. 401.

Die äuſſere Haut iſt zellicht, bald mehr bald weniger verdichtet, nur an einzelnen Stellen, da, wo die Arterien am Bruſtfell, oder Bauchfell vorbeyſtreichen, als ſeröſe Haut geſtaltet, — ein Grenzgebilde, was zur Eigenthümlichkeit der Gefäſsebildung nichts beyträgt. Die innere Haut und die mittlere verhalten ſich in den Gefäſsen zu einander, wie die Schleimhaut und die Fleiſchhaut in der Bildung des Darmcanales, und ähnlicher Höhlen. Die Tendenz der arteriellen Gefäſsebildung geht nun darauf hin, die Fleiſchhaut übergewichtig über die innere Haut zu ſetzen, und je mehr die erſte an individueller Bildung gewinnt, deſto mehr tritt die innere Haut zurück, und erhält in den Arterien zuletzt nur die Bedeutung einer Epidermoidalbildung. Je mehr dagegen in den Venen die Bildung der Fleiſchhaut beſchränkt iſt, deſto mehr präponderirt die innere Haut, die ſich hier in Klappen verlängert, ähnlich den Klappen der Schleimhaut des Darmcanales u. ſ. f. Es iſt daher der Gegenſatz der innern Haut, und der eigenthümlichen Gefäſsehaut, welcher die Gefäſsebewegung beſtimmt.

§. 402.

So wie das Bildungsgesetz des Organismus dieses ist, dass alles in allem wiederkehre, und immer das Eine sich im Andern wiederhole, so besitzen die Arterien zahlreiche Nerven, die in verschiedenen Geflechten, einem näher anliegenden, und einem mehr entfernten sie umgeben. Das entferntere, durch Zellengewebe getrennte, Nervengeflecht, welches den Stamm einer Arterie umstrickt, legt sich in der Folge unmittelbar dem Aste an: und die beyden Nervengeflechte, das nähere und entferntere, vermitteln den Gegensatz des Stammes und der Aeste überhaupt. In den Wandungen der grössern Gefäfse erkennt man deutlich wieder Arterien und Venen, welche sich zu ihnen, wie die Kranzgefäfse zu dem Herzen verhalten.

Im arteriellen Gefäfsegeschlechte sind die Stämme die frühest gebildeten, in denen der Keim der ganzen Evolution niedergelegt ist. Das Gegentheil findet in den Venen statt. Daher sind in den Arterien die Aeste individueller gebildet als die Stämme, und die Zweige sind mehr individualisirt als die Aeste. In den Venen aber, welche durch Contraction sich gestalten, ist in den Stämmen die grösste Vollkommenheit der Bildung. Die Vollkommenheit der arteriellen Gefäfsebildung beruht aber auf der Entwicklung des Muskelgewebes: daher sind die Fleischfasern in den Häuten der kleinen Arterien mehr individualisirt, mehr geröthet, und wirklichen Muskelfasern gleich gebildet, als in den Stämmen. Daher widerstehen die kleinen Arterien mehr

als die groſsen der Zerreiſſung, und die Aneurisme derſelben ſind ſelten. Eben ſo beſitzen auch die kleinſten Arterien eine verhältniſsmäſsig gröſſere Anzahl von Nerven: — die Geflechte, welche ſich in der Nähe der Zellhaut der gröſſern Arterien befinden, ohne in ſie einzugehen, bleiben dieſen ſelbſt fremde; und ſie nähern ſich den Wandungen der Arterien um ſo mehr, je kleiner ſie werden, und verlieren ſich zuletzt in die Kleinſten. Vermöge dieſer mehreren Entwicklung der Fleiſchhaut, und vermöge des höher potenzirten Gegenſatzes zwiſchen ihr und den Gefäſsnerven iſt auch die irritable Stimmung in den kleinern Gefäſsen höher als in den gröſſern, daher iſt hier die eigenthümliche Gefäſsebewegung energiſcher; und ſo wie die Fortleitung des Blutes in den gröſſern Arterien, beſonders in den Präcordialgefäſsen, mehr unter der Herrſchaft des Herzens und ſeiner Propulſativkraft ſteht, ohne darum die, obgleich geringere, Selbſtthätigkeit ihrer Wandungen ganz auszuſchlieſſen; ſo hört der Einfluſs des Herzens in den kleinſten Arterien und in den arteriellen Endigungen beynahe ganz auf, und die Wirkung der vis a tergo iſt im Capillargefäſseſyſtem ganz auf Null gebracht.

§. 403.

Die Arterien, als die edelſte Art in der Gefäſsegattung, ſind auch die mindeſt zahlreichen. Beynahe jede beträchtliche Arterie wird wenigſtens von einem Zwillingspaar von Venen begleitet. Ueberall haben ſich auch die Arterien nur im Gegenſatze der vollen-

vollendetern, meist individualisirten Venen gebildet. Den oberflächlichen Venen entsprechen keine Arterien, eben so wenig als den Venen, welche in den Interstitien der einzelnen Fasernbündel der Muskeln kriechen; — die Arterien suchen überall die Tiefe, und gleichsam ihr Edelstes, hat die Natur sie allenthalben von der Oberfläche weg in die Tiefe geflüchtet, und so vor äussern Verletzungen bewahret.

§. 404.

Die Durchmesser der Arterien sind vollkommen entschieden: es ist die grösste Constanz in jenem Gesetz der Zunahme der Capacität; noch bey den Venen finden beträchtliche Abweichungen statt. Aber bey den Arterien verlauft die Metamorphose nach einer unwandelbaren Regel. Eben so ist die Gestaltung im arteriellen Systeme, und dessen Verzweigung noch immer einigen, obgleich bey weitem wenigern Abweichungen, als jene im Venensysteme, unterworfen. Die Arterien künden sich eben dadurch als das edelste Gefässegeschlecht an.

§. 405.

So wie in den Arterien die Metamorphose in der Gefässebildung fortschreitet durch die Expansion der Stämme in den Aesten, und so wie die Verästung der Aorte selbst nichts anders ist als das Symbol jener expansiven Metamorphose, — so folgt auch das Blut jener Bewegungsrichtung, und wird in den Arterien von dem Herzen aus in die Stammarterie, von dieser in ihre Aeste, deren

Zweige und Endigungen getrieben. Dieſs erweiſst ſich durch die Maſchineneinrichtung, nach welcher das arterielle Gefäſseſyſtem conſtruirt iſt, durch die Anſchwellung der Arterien oberhalb eines um ſie angelegten Bandes, die Stillung arterieller Blutungen aus verwundeten Gefäſsen bey Unterbindung oder Zuſammendrückung der Arterie während ihres Verlaufes zwiſchen dem Herzen und der Wundſtelle, mit Ausnahme der anaſtomoſirenden Arterien. Zuletzt kann man die progreſſive Bewegung des Blutes in den Arterien beſonders bey kaltblütigen Thieren, namentlich in der Harnblaſe der Fröſche, mit bewaffneten Augen ſehen. Wenn die Arterien nach dem Tode blutleer angetroffen werden, ſo kömmt dieſs von daher, weil die Arterien ſpäter ſterben als die Venen, folglich zuletzt das Blut in das Capillargefäſseſyſtem und durch dieſes in die Venen übertreiben. Aber auch nach dem Tode, und ſelbſt nach dem asphyctiſchen Tode findet man beynahe nie die Arterien und den linken Ventrikel des Herzens ganz leer, ſondern immer iſt etwas Blut darin enthalten.

§. 406.

Das Blut wird in die Arterien nicht nur von den Stämmen gegen die Aeſte bewegt, und ſeine Bewegung folgt alſo der expanſiven Richtung, welche der fortſchreitenden Metamorphoſe der arteriellen Gefäſsebildung ſelbſt eigen iſt; ſondern das Blut wird in der Progreſſion des arteriellen Kreislaufes ſelbſt expandirt, und ſomit verdünnt. Die Rarefaction des Blutes aber iſt nicht gemäſs der Börhav'ſchen Theorie die Folge einer mechaniſchen

Theilung, wodurch die rothen Kügelchen in gelbe, und diese in weisse, in Uebereinstimmung mit der Grösse der Durchmesser der Gefäſse zerfallen; sondern die Verdünnung und Auflösung des Blutes, und namentlich der Blutkügelchen, ist auf dynamische Weise als eine Qualitätsveränderung derselben vorstellbar. Das Blut wird in der Progression des arteriellen Kreislaufes stetig desoxydirt, in demselben Verhältnisse, als die Versauerstoffung der arteriellen Gefäſsewandungen durch die Zerlegung des Blutes vor sich geht. Da nun aber die Bildung der Kügelchen im Blute besonders von der Gegenwart des Faserstoffes abhängig ist, die Röthung aber von der Gegenwart des colorirenden Bestandtheiles, und von dem Oxydationsgrade des Eyweiſsstoffes; da somit die Oxydation des Blutes die Bildung der rothen Kügelchen bestimmt; so ist begreiflich, daſs bey fortschreitender Desoxydation des Blutes in der Progression des arteriellen Kreislaufes, und mit der Absetzung des Sauerstoffes an die Wandungen der Arterien die rothen Kügelchen im Blute endlich verschwinden; gleichzeitig wird das Serum über den Faser- und Färbestoff überwiegend, und im Serum wieder das Wasser und die Salze über den Eyweiſsstoff. Einige Capillargefäſse, welche aus der Verzweigung der Arterien, und aus den arteriellen Endigungen gebildet sind, führen noch rothes, obgleich immer mehr blasses und miſsfärbiges, Fleischwasser ähnliches Blut; — andere führen ein wirkliches Serum, weisse oder gelbliche Säfte.

Gewiſs geht aber die Expanſion des Blutes in den kleinſten Gefäſsen noch weiter, bis zur Auflöſung in Dunſtflüſſigkeit; und diejenigen Capillargefäſse, welche weder rothes Blut, noch weiſſe Säfte führen, und von welchen insgemein angenommen wird, daſs ſie leer ſeyen (was ſelbſt noch Bichat behauptet), ſind höchſt wahrſcheinlich mit dem am meiſten expandirten Theil des Blutes, nämlich mit Blutgaſs angefüllt. Das Blutgaſs iſt aber auch der am meiſten desoxydirte Theil des Blutes, oder das Blut ſelbſt im Zuſtande der relativ gröſsten Entſauerſtoffung, womit ſein eigenthümlicher thieriſcher Geruch, ſeine ammoniacaliſche Natur, ſeine ſchnelle Corruptel übereinſtimmt. Wenn nun in ſolchen Capillargefäſsen bey gegebenen Veränderungen rothes Blut oder weiſſe Säfte erſcheinen, ſo iſt dieſs nicht ſowohl eine Folge des Andranges neuen Blutes in vorher entleerte Gefäſse, ſondern des Niederſchlages von Blutdunſt, der vorher ſchon in jenen Gefäſsen enthalten war, in tropfbarflüſſiger Geſtalt. Der turga vitalis iſt eben ſo nicht bloſs eine Folge des Expanſionszuſtandes des Zellengewebes, ſondern eben ſo der Erfüllung der Capillargefäſse mit Blutdunſt.

§. 407.

Die einzig mögliche Endigung der Arterien iſt von daher jene im Capillargefäſseſyſtem; in dieſem erliſcht die arterielle Gefäſsepolarität und gleichzeitig verſchwindet auch, jedoch nicht überall vollkommen, der arterielle Charakter des Blutes. Nirgendswo enden die Arterien wirklich in exhalirende Ge-

fäſse, ſondern die exhalirenden Canäle entſpringen einzig aus dem Capillargefäſseſyſtem, welches hier als vermittelndes eintritt. Noch weniger geſchieht die Exhalation aus den Seitenporen der Arterien, oder aus offenſtehenden Endigungen derſelben. Aber eben ſo gewiſs iſt es auch, daſs keine Umbeugung der kleinſten Arterien in wirkliche Venen ſtatt findet. Alle Venen entſpringen aus dem Capillargefäſseſyſtem, und es giebt eben ſo wenig abſorbirende Venen, als exhalirende Arterien. Abſorption und Exhalation iſt nur durch Gefäſse vom kleinſten Durchmeſſer vermittelt. Gäbe es wirklich einen unmittelbaren Uebergang der Arterien in die Venen, ſo müſste im Verlaufe irgend eines Gefäſses eine Stelle vorkommen, wo daſſelbe zugleich Arterie und Vene wäre. Glücklich geleitete feinere Injectionsmaſſen dringen zuerſt aus den Arterien nur in das Capillargefäſseſyſtem ein, und nur in der Folge und wenn ſie noch weiter dringen, regurgitiren ſie durch die Venen.

§. 408.

Die Gefäſse beſtimmter Organe ſind zwar in der Metamorphoſe dieſer letzten durch die Thierreiche hindurch nicht ſo ſehr nach unwandelbaren Typen, als die Nerven gebildet; da immer auch bey der gröſsten räumlichen Verſchiedenheit in der Lage der Organe die nämlichen Nervenpaare zu ihnen gelangen; da hingegen ihre Gefäſse oft dem Urſprunge nach wechſeln, und von benachbarten Stämmen entſpringen. So entſpringen bey Thieren mit ſehr langem Halſe auch die untern Schilddrü-

ſenſchlagadern nicht mehr von der ſehr entfernten Achſelſchlagader, ſondern mittelbar von der Carotis. Aber da, wo dieſs von wichtigern Arterien und gröſſern Stämmen der Fall iſt, treten immer auch mit dem veränderten Urſprunge der Arterien wichtige Veränderungen in der Bildung und Bedeutung der Organe ſelbſt ein. Die Bedeutung und die individuelle Bildung eines Organes iſt überhaupt um ſo höher geſteigert, je gröſſer die Dignität ſeiner Gefäſse iſt, je mehr dieſe daher Arterien der zweyten Ordnung ſind u. ſ. f. Je mehr ſie aber an Dignität verlieren, und von den Arterien anderer Theile entſpringen, deſto mehr verliert auch das Organ am Grade ſeiner Entwicklung und individuellen Ausbildung. Schon bey vielen Säugethieren entſtehet die Carotis der linken Seite nicht mehr von der Aorte, ſondern häufig gleich jener der rechten Seite mit der Subclavia in gemeinſamem Stamme. In demſelben Verhältniſſe tritt aber auch die Gehirnbildung, zuerſt von der linken Seite, zurück.

Bey den Vögeln ſind die Carotiden nicht mehr Arterien der erſten Ordnung, ſondern ſie entſtehen zugleich mit den Vertebralarterien von den Unterſchlüſſelbeinſchlagadern, ſelbſt nachdem dieſe ſchon beträchtliche Gefäſse an die Seitentheile des Halſes, an den Oeſophagus etc. abgegeben haben. Daher das ſchon hier verſchwindende Uebergewicht der Gehirnbildung. Bey den Amphibien erliſcht ſchon der Gegenſatz der äuſſern und der innern Carotis: da ſich der Stamm derſelben nicht mehr theilet. Und in abſteigender Ordnung durch die Thierreiche hindurch verlieren weiter hin die Caro-

tiden immer mehr an Selbſtſtändigkeit in gleichem Verhältniſſe als die Bildung des Gehirnes zurücktritt.

Daſſelbe Verhältniſs waltet ob bey den Schlagadern der Milz, der Nieren, und anderer Theile.

§. 409.

So wie die Aorte bey den höhern Thieren einſtämmig iſt, ſo gelangt auch zu jedem wichtigern Organe nur Ein Hauptgefäſs. Eben ſo beſitzt jede Extremität Einen gröſſern Arterienſtamm. Da aber keine Arterie ihre Bedeutung aus ſich ſelbſt hat, ſondern jede für ſich Bedeutungslos iſt, und ihr beſonderes Leben aus dem ganzen Syſteme herleitet, in welches ſie aufgenommen iſt; ſo iſt auch das Leben keines Organes von Einer Arterie allein abhängig; ſondern der Hauptarterie gegen über bilden ſich mehrere Nebenarterien, welche zum Theil von ganz andern, und entlegenen Stämmen entſpringen. So im Gegenſatze der groſsen Schenkelſchlagader die Verſtopfungs- die Gefäſsemuskel- die Sitzbeinſchlagader, und andere. Die Abkömmlinge dieſer letzten anaſtomoſiren ſo häufig mit jenen der erſten, daſs auch, wenn der Canal der Hauptſchlagader an einer beſtimmten Stelle verſchloſſen und undurchgängig iſt, der Blutlauf durch die erweiterten Seitengefäſse in dem Gliede, auch tiefer unten in den Abkömmlingen der Hauptſchlagader unterhalten werden kann. Eben ſo giebt die Hauptſchlagader eines Gliedes immer ſchon hoch oben groſse, ſie begleitende Nebenarterien ab, deren Abkömmlinge mit ihren ſpätern Aeſten

wieder anaſtomoſiren. Nach demſelben Geſetze theilen ſich die Schlagadern der Organe in mehrere Aeſte; und ſie dringen nicht einſtämmig, ſondern ſchon vielfach getheilt in das Organ ſelbſt ein.

§. 410.

Da jede Arterie nur auf beſondere Weiſe daſſelbe, was das Herz auf allgemeine Weiſe, darſtellt, ſo haben auch die Arterien ihre Syſtole und Diaſtole gleich dem Herzen. Der Pulsſchlag iſt das Phönomen, welches aus dieſem Wechſel von Ausdehnung und Verengerung der Arterie entſteht. Der Puls wird irrig von der Retardation des Blutumlaufes in den Arterien, von der hierdurch bedingten Anhäufung des Blutes in denſelben, und von der Seitenbewegung des Blutes — noch irriger von dem mitgetheilten Stoffe des Herzens oder bloſs von der Dislocation der Arterien hergeleitet. Eine wirkliche Anhäufung des Blutes findet in den Arterien nicht ſtatt; denn um wie vieles der Kreislauf in ſeiner Progreſſion retardirt wird, um ſo vieles nimmt auch die Capacität der Veräſtungshöhlen zu.

§. 411.

Bey den Thieren ohne Herz pulſiren die Arterien nicht minder als bey den höhern Thieren. — Bey dem Pulsſchlage nimmt die Arterie gleichmäſsig nach allen Seiten am Durchmeſſer zu; jedoch möchte ſich wohl die Form der Durchſchnitte der Arterie hierbey in etwas verändern, und dieſe zwiſchen dem Oval und dem Kreiſe gleichſam oſcilliren, ſo

daſs die Durchſchnitte ſich bey der Syſtole mehr oval, bey der Diaſtole mehr kreiſig verhielten.

Bey Fröſchen pulſirt die herausgeſchnittene Aorte noch fort, nachdem ſie vom Herzen losgetrennt iſt, und blutleer auf eine Glasplatte gelegt wird; eben ſo dauert die Pulſation der Arterien noch lange Zeit fort, wenn man bey kaltblütigen Thieren das Herz gänzlich zerſtöret hat. Wäre die Pulſation der Arterie, z. B. der Aorte, die Folge des Stoſſes des Herzens, ſo müſste ihr dieſe mechaniſche Erſchütterung mittelſt des Blutes mitgetheilt werden, nun aber pulſirt auch die blutleere Aorte bey kaltblütigen Thieren noch eine Zeit lang fort.

§. 412.

Ein an zweyen Stellen unterbundenes Arterienſtück, z. B. die Carotis bey was immer für einem Thiere, ſchwingt noch fort in Syſtole und Diaſtole, ohne Einfluſs des Blutes, und ohne Fortbewegung deſſelben. — Wäre der Pulsſchlag eine bloſse Stoſserſchütterung der Arterien, ſo blieben die ſo ſehr mannigfaltigen Veränderungen deſſelben im krankhaften Zuſtande ganz unerklärbar. — Die Unabhängigkeit des Pulsſchlages der Arterien von den Bewegungen des Herzens erhellet auch beſonders daraus, daſs bey Krankheiten oft beyde weder in der Frequenz noch ſonſt übereinſtimmen. Daſs die Pulſation nicht eine Folge der bloſsen Dislocation der Arterie ſey, beweiſst die Autopſie; da man die gröſſern Arterien bey lebendig geöffneten Thieren wirklich nicht nur Schwingungen machen, ſondern deutlich ſich erweitern und verengern ſieht.

Dessenohngeachtet ist mit der Pulsation eine Schwingung der Arterie verbunden. Bey dem sehr geschlängelten, und vielfach gewundenen Verlaufe der Arterien beschreiben sie im Momente der Systole mehr die Sehne des Bogens, welchen ihr Verlauf bey der Diastole beschreibt: dieser wird mehr geradlinigt, und die Anfractuositäten gleichen sich aus. Die Arterie pendulirt also zwischen der Sehne und dem Bogen, ihre Bewegungen sind gleich der Streckung und Beugung; — so wie auch das Herz seine Lage, und seine räumlichen Beziehungen zu den dasselbe umgebenden Theilen im Momente der Systole und in jenem der Diastole verändert. Da die Systole das Moment der contractiven Thätigkeit der Arterien vermittelt, das Uebergewicht contractiver Thätigkeit aber den magnetischen Prozeſs bezeichnet, so sucht auch die Arterie im Momente der Systole vorzugsweise die Länge: — und ihr Verlauf wird, gleich jenem der Vene, mehr geradlinigt.

§. 413.

So wie von der einen Seite die Pulsation der Arterien eine dieser eigenthümliche Gefäſsebewegung, und unabhängig vom Eindrange und von der Anhäufung des Blutes ist; so ist doch der Erweiterung und der Verengerung der Arterien eine selbstständige expansive und contractive Bewegung des Blutes gleichzeitig entsprechend. Es ist bekannt, daſs das Blut bey einerley Quantität groſser Veränderung des Volums fähig ist, und bald die Gefäſsehöhlen mehr, bald weniger ausdehnt. Das Blut ist

nicht bloſs in mechaniſch mitgetheilter Bewegung, ſondern es oſcillirt ſelbſt zwiſchen Ausdehnung und Zuſammenziehung. Bey jedem Pulsſchlage findet eine totale Umkehrung aller Polaritäten im Organismus ſtatt: jede beſtimmte Qualität geht in die ihr entgegengeſetzte über: ſo wie daſſelbe bey der Inſpiration und Exſpiration der Fall iſt.

§. 414.

Da nun im arteriellen Gefäſseſyſtem die expanſive Bewegung die vorwaltende und die Metamorphoſe beſtimmende iſt, ſo iſt jede Zuſammenziehung irgend einer Arterie als eine Hemmung jenes Expansſtrebens, als eine Beſchränkung deſſelben durch das Moment der wieder eintretenden Contraction zu betrachten. Da nämlich das ganze Arterienſyſtem urſprünglich contrahirt iſt, und ſich nur in der Progreſſion ſeiner Metamorphoſe expanſiv geſtaltet, ſo ſtrebt es ſtetig in ſeinen urſprünglichen Contractionszuſtand wiederzukehren. Denn der Urſprung jedes Dinges kehrt ſtets auch in ſeinem zeitlichen Leben wieder. In den Arterien aber iſt der Contractionspol der Pluspol, und der Expanſivpol iſt der aus jenem projicirte: daher auch das Contractionsſtreben ſtets, die expanſive Metamorphoſe hemmend, wieder hervortritt. Der Pulsſchlag iſt von daher auch das wahre Zeitmaaſs des Lebens. Nur durch ihn iſt ein beſtimmter Rhythmus in der Gefäſsebewegung, ohne ihn käme es zur unendlichen Expanſion im arteriellen Gefäſseſyſtem; und ſo wie die Kreisverſchwingung deſſelben das Zeichen der Einbildung der Ewigkeit in die Zeit iſt,

ſo iſt der Pulsſchlag und die durch ihn bezeichnete Periode die Manifeſtatión ſeiner Zeitlichkeit. Je mehr nun in der Gefäſsebewegung und im Leben überhaupt das Zeitliche über das Ewige vorwaltet, deſto frequenter iſt der Puls. Daher nimmt die Frequenz deſſelben mit der Andauer des zeitlichen Lebens ab. Bey dem einjährigen Kinde hat die Ellbogenarterie in der Minute Schläge - 124
bey dem zweyjährigen - - - 110
in den Jahren der eingetretnen Pubertät - 80
im männlichen Alter - - - - 75
im 60ſten Lebensjahre - - - 60
u. ſ. f.

§. 415.

Sonſt iſt die Frequenz des Pulſes nach dem Geſchlechte, nach der Statur des Körpers, nach dem Temperamente, nach der individuellen Conſtitution, nach der Jahreszeit, nach der Tageszeit, nach dem Klima, nach der jedesmaligen irritabeln Stimmung verſchieden. So wie in Competti's Hand die geringſte Differenz, die leiſeſte Einwirkung ſogleich die Richtung der Bewegung des Balanciers verändert, und jede Polarität hierdurch auf das beſtimmteſte angegeben wird, ſo verändert jede, auch die leiſeſte Influenz, das Verhältniſs der Syſtole und Diaſtole, welche nur den beyderley Richtungen der Bewegung des Balanciers, der poſitiven und negativen gleich ſind. Ohnehin gehören Veränderungen des Pulſes unter die auffallendſten Erſcheinungen an Waſſer- und Metallfühlern in der Nähe dieſer Dinge.

§. 416.

Die sonstige Verschiedenheit des Pulses im gesunden und kranken Zustande, seine Grösse, Erhabenheit, Völle, Beschleunigung, Härte, seine wellenförmige oder vibrirende Beschaffenheit, sein Doppelschlag, seine Kleinheit, weiche, fadenförmige, Wurm-förmige, irreguläre, intermittirende Beschaffenheit etc., sind in dem verschiedenen Verhältnisse der expansiven zur contractiven Bewegung der Arterie gegründet. Es ist gewiss, was ältere Aerzte, und unter den neuern besonders Borden und Fouget behaupten, dass man aus dem Pulse allein den Charakter und den Sitz der meisten Krankheiten erkennen möge. Denn jedes Krankheitssymptom ist für die wahre Naturforschung pathognomisch, in jedem schaut diese die Krankheit selbst an, und in jeder Erscheinung ist das ganze Wesen der Krankheit entfaltet. Nur die Stumpfsinnigkeit und Unerfahrenheit der meisten hat die entgegengesetzte Behauptung, auch jene über die trügerische Beschaffenheit des Pulses, veranlasst. Nicht der Puls hat sie betrogen; sondern sie haben sich am Pulse betrogen, und die genauern Unterschiede und Nüancen desselben nicht scharfsinnig aufgefasst. — Allerdings zeigt der Puls eine andere Beschaffenheit während des Stadiums der Crudität, eine andere bey der Coction, und eine andere bey der Solution der Krankheiten. Anders ist er beschaffen bey idiopathischen Affectionen der einzelnen Systeme des Organismus, anders bey Reproductions- bey Irritabilitäts- und Sensibilitätskrankheiten, — anders bey Affectionen der Theile

oberhalb und unterhalb des Zwergfelles; es giebt einen pulſus cephalicus, pulmonalis, abdominalis, einen pulſus menſtrualis, haemorrhoidalis etc.

§. 417.

Die Frequenz des Pulſes wird beſtimmt durch das Vorherrſchen der Zeitlichkeit in der Gefäſsebewegung, welche, ewig im Kreiſe in ſich ſelbſt wiederkehrend, die Zeitlichkeit in ſich zu vertilgen beſtrebt iſt. Jeder Pulsſchlag iſt gleichſam eine Axendrehung des Organismus, und ſo wie die Axendrehung im Gegenſatze der progreſſiven und jährlichen Bewegung, jene die endliche, dieſe die unendliche iſt; ſo entſteht die Frequenz des Pulſes immer von der Vorherrſchaft des Endlichen, aus der Indifferenz getretenen. — Die Härte des Pulſes iſt eine Folge des Uebergewichts der Contraction in der Gefäſsebewegung, daher dieſe auch, in der Diaſtole durchgreifend, der Expanſion des Gefäſsecylinders widerſtrebt. Der wellenförmige Puls iſt ein Zeichen der Criſe, nämlich der Ausgleichung der Gegenſätze, daher jetzt expanſive und contractive Bewegung beyde wechſelweiſe und getrennt hervortreten, ſo daſs eine wellenförmige Bewegung der Blutmaſſe eintritt.

§. 418.

Die Geſchwindigkeit des Blutumlaufes iſt nun entſchieden nicht in allen Theilen des Gefäſseſyſtemes von gleicher Gröſse; obgleich ihre Verſchiedenheit durch die gewöhnlich dafür angeführten Gründe nicht genugthuend erwieſen wird. Denn die Retardation der Gefäſsebewegung in den Arterien, je

weiter ſich dieſe vom Herzen entfernen, iſt keineswegs die Folge der vermehrten Capacität der arteriellen Veräſtungshöhlen, oder des Widerſtandes, welchen die Krümmungen der Arterien dem Umlaufe des Blutes entgegenſetzen, und der vermehrten Reibung der Blutkügelchen an den im Flächeninhalte bedeutend vergröſſerten arteriellen Wandungen.

Die Retardation des Kreislaufes in den Arterien iſt eine nothwendige Folge der Abnahme der Energie im direkten Verhältniſſe der fortſchreitenden Veräſtung. Denn die gröſste Energie jedes Dinges iſt in ſeinem Urſprunge, und dieſe nimmt nothwendig ab, je mehr es ſich räumlich oder zeitlich ausbreitet. So verhält es ſich mit den Arterien, welche einſtämmig aus dem Herzen hervorgehen. Dagegen iſt die venöſe Gefäſsebewegung accelerirt von der peripheriſchen Termination gegen das Centrum, nicht weil in ihren Gefäſsehöhlen das Blut ſich aus den mehr geräumigen Schläuchen in die minder geräumigen bewegt; ſondern weil alles, was ſich empiriſch bildet und von der Vielheit ausgeht, je mehr es zur Einheit ſeiner ſelbſt gelangt, um ſo mehr in ſich verſtärkt wird.

In der Aorte durchflieſst das Blut in jeder Minute ohngefähr eine Länge von 8 Zollen: verhältniſsmäſsig nimmt nun dieſe Geſchwindigkeit der Bewegung von den Stämmen gegen die Aeſte hin ab.

§. 419.

Aber die Geſchwindigkeit der Fortbewegung des Blutes iſt auch, in jedem Organe, entſprechend der irritabeln Stimmung deſſelben, eine verſchie-

dene. Sicher ist der Blutlauf in den Unterleibsgefäfsen langsamer als in den Brustgefäfsen, langsamer in den Gefäfsen der Beckenorgane als in den Carotiden, langsamer in den Arterien der untern Extremitäten als in jenen der obern.

§. 420.

Der ganze Blutumlauf ist nur dadurch möglich und andauernd, dafs das Blut überall die der Polarität seiner Gefäfse entsprechende Qualität an sich trägt. So wie es arterielle und venöse Gefäfse giebt, und wie sich diese untereinander verhalten, so verhält sich das venöse zum arteriellen Blut. Jenes ist mit Hydrogen - Electricität, dieses mit Oxygen - Electricität geladen. In jenem ist der Oxygenpol nach innen zurückgedrängt, das Oxygen ist mit dem Kohlenstoff zum Oxyd vom ersten Grade verbunden; beyde sind durch einander ausgelöscht. Das arterielle Blut aber kehrt der Sauerstoffpol nach aussen. So wie nämlich der negative Pol der Volta'schen Säule Wasserstoffgafs aus dem Wasser entwickelt, und am positiven Pol der Säule der Sauerstoff aus der Zerlegung des Wassers hervortritt; so wird das Blut stets durch den Gegensatz der Richtungspolarität in den beyderley Gefäfsen polarisirt. Das Oxygen tritt am arteriellen Pole, das Hydrogen am venösen Pole der Säule hervor: das arterielle Blut wird bey jener Galvanischen Zerlegung oxydirt, das venöse wird hydrogenisirt. Aus dem aus der Ader gelassenen Blut entwickelt der negative Pol der Volta'schen Säule nicht Hydrogengafs, der positive nicht

Oxygen;

Oxygen; ſondern an jenem treten nur überwiegend die venöſen Qualitäten, an dieſem die arteriellen hervor.

§. 421.

Dieſs iſt der Grund von der Qualitätsverſchiedenheit der beyderley Arten des Blutes. Das arterielle Blut aber wirkt nun wieder oxydirend auf die Gefäſsehäute der Arterie, es ſetzt an dieſe ſeinen freien Sauerſtoff ab. Dadurch wird die innere Gefäſsehaut ſo ſehr verdichtet, — da alle Verdichtung des Zellengewebes in Membranen eine Folge des höhern Oxydationsgrades der ihm zum Grund liegenden Gallerte iſt. Die innere Gefäſsehaut verliert an Länge und Ausdehnung in demſelben Verhältniſſe, als ſie ſich in ihrer Cohäſion potenzirt: daher verſchwinden die Duplicaturen und Klappen. — Eben ſo bilden ſich die deutlicher gewahrnehmbaren, rötheren, und lebhafterer Zuſammenziehung fähigen Muskelfaſern in den Häuten der Arterien nur durch die ſtets fortgeſetzte Oxydation der eigenthümlichen Gefäſsehaut aus dem arteriellen Blut. — Da nun aber jeder Oxydationsprozeſs das Aequivalent einer Attractivkrafttheilung an den oxydabeln Körper und einer Negation der Ausdehnung iſt; ſo beſtimmt das arterielle Blut, indem die innere Gefäſsewandung ſich aus demſelben oxydirt, dieſe zur Zuſammenziehung.

§. 422.

So wie nun die electriſche Stimmung eine andere iſt in den Stämmen als in den Aeſten; ſo iſt

es auch ein anderes Blut, was die arteriellen Stämme, und ein anderes, was die arteriellen Aeſte zur Zuſammenziehung beſtimmt. Eine Blutwelle wird erſt dadurch, daſs ſie bereits die Stammhöhle durchgangen iſt, mit jener ihre Electricität ausgeglichen hat, und in die höhere dynamiſche Einheit mit dem Stamme aufgenommen wurde, — geſchickt, nun die Wandungen des Aſtes zur Zuſammenziehung aufzuregen. Zwar wird kein bedeutender Unterſchied zwiſchen dem Blut der Aorte und jenem der kleinſten Arterien wahrgenommen; gröſſer dagegen iſt der Unterſchied des Blutes, welches die kleinern Venen erfüllt, von demjenigen, welches in den groſsen Venenſtämmen angetroffen wird.

§. 423.

Es iſt aber nicht die gröſſere reizende Eigenſchaft des arteriellen neu oxydirten Blutes, was die Arterien zur Zuſammenziehung beſtimmt. Das neu oxydirte Blut, was durch die Lungenblutadern zu dem Herzen zurückkehrt, reitzt dieſe nicht zur Pulſation auf: und das höchſt desoxydirte, venöſe Blut macht die Hohladern, noch mehr den Hohlvenenſack, und zuletzt den vordern Ventrikel pulſiren. Auch der hintere Ventrikel zieht ſich über venöſes Blut zuſammen, wenn dieſs bey aſphyctiſchen Todesarten durch die Lungengefäſse zu ihm gelangt: und das Herz stirbt erst dann, wenn ſeine Kranzgefäſse mit ſchwarzem Blut durchdrungen ſind.

XVI. Kapitel.

Blutlauf in den Venen.

§. 424.

Was im System der Lymphgefäſse nur verſucht und noch unvollendet niedergelegt ist, das ist in der Bildung der Venen ſchon erreicht, und die Organiſation hier in ſich ruhend, und in ihrem Kreiſe geſchloſſen. Die Venen stellen ſchon eine edlere Art in der Gefäſsegattung als die Lymphgefäſse dar; daher ſind die Individuen in dieſer Art ſchon minder zahlreich; man gedenke der unzählbaren Menge von Lymphgefäſsen im Gegenſatze der bey weiterm geringern Anzahl von Venen.

§. 425.

Da die Venen höchst individualiſirte lymphatiſche Gefäſse darstellen, an welchen das urſprüngliche Contractionsstreben, ſo wie dieſes die Bildung der Lymphgefäſse beherrſcht, ſchon beſchränkt ist, ſo ſind die Durchmeſſer der Venen ſchon völlig entſchieden, und zwar nach den genauesten anatomiſchen Unterſuchungen ist die Summe der Durchmeſſer der Aeste gröſſer als der Durchmeſſer des Stammes. Denn die Progreſſion in der venöſen Gefäſsebildung geſchieht durch Contraction der Aeste in den Stamm; d. h. ſein Durchmeſſer ist geringer als die Summe der Durchmeſſer der Aeste. Eben ſo wächst die Energie der Gefäſsethätigkeit

im direkten Verhältniſſe der Progreſſion der Gefäſsebildung, und daher ist die Bewegung des Blutes eine accelerirte von der Peripherie gegen das Centrum, ſo wie jede centripetale Bewegung. — Aber die venöſe Gefäſsebildung geſchieht bloſs durch Contraction der Aeste im Stamme: der Durchmeſſer des Stammes ist alſo nur kleiner als die Summe der Durchmeſſer der Aeste, der Durchmeſſer irgend eines venöſen Gefäſses nimmt daher nicht ab in ſeiner Progreſſion; Senac fand bey genauen Ausmeſſungen, daſs eine Vene, welche eine gegebene Strecke hindurch fortſchreitet, ohne Anmündung neuer Aeste, keine coniſche, ſondern eine cylindriſche Form zeigt. Es ist bloſse Fiction, was man von der coniſchen Form der Venen behauptet hat; und die kleinsten Venen, welche ſich nicht mehr in kleinere theilen, ſind vollkommen cylindriſch.

§. 426.

Obgleich die Durchmeſſer der Venen, als ſchon ſehr individualiſirter Gefäſse, vollkommen entſchieden ſind, und jene progreſſive Abnahme der Capacität der Gefäſsehöhle ein allgemeines Geſetz der venöſen Gefäſsebildung iſt, ſo iſt doch dieſer Bau in ihnen noch weniger conſtant, als in den Arterien. Es giebt nämlich Venen, welche ſich, nach Art der lymphatiſchen Gefäſse, kropfartig an einzelnen Stellen erweitern; und varicöſe Anſchwellungen ſind nichts als ein neues Vorſchlagen der lymphatiſchen Gefäſseform im venöſen Geſchlecht. Eine varicöſe Vene iſt alſo eine wieder entbildete, in den Prozeſs der Gebildung zurück geworfene, unter der

Form eines lymphatischen Gefäßes gestaltete Vene. Solche kropfartige Erweiterungen finden aber nur statt an den äussern, oberflächlichen Venen, welche noch minder individualisirt, weniger vollkommen gebildet sind, als die tiefer liegenden, die Arterien begleitenden Venen. Offenbar stellen die ersten den Uebergang der venösen Gefäßsegattung in die lymphatische Gefäßseform, und die letzten den Uebergang des venösen Geschlechtes in eine edlere Gattung, nämlich die arterielle Form dar, weswegen sie auch schon zur Gemeinschaft und zur Begleitung der Arterien gelangt sind; sie zeigen daher eine grössere Compacticität in ihren Häuten; die mittlere, oder faserige Haut ist in den tiefern Venen mehr entwickelt als in den oberflächlichen; die ersten sind keinen venösen Anschwellungen unterworfen etc. Dagegen ist die äussere Jugularvene im gewöhnlichen Zustande etwas varicös erweitert, die Kniekehlenvene ist nach Morgagni's Zeugniß zwischen den Gelenkköpfen des Oberschenkelbeins mehr erweitert, als weiter nach oben.

§. 427.

Das venöse Gefäßsegeschlecht ist das ursprünglich expandirte im Capillargefäßsesystem. Die venöse Gefäßsebildung geschieht durch Contraction der Aeste im Stamm. Die Totalcontraction der Aeste wird aber in den venösen Gefäßsen selber nicht vollkommen erreicht. Es kömmt nicht zur Anmündung gesamter Venen in einen gemeinschaftlichen Stamm; die Venen inseriren sich noch mit zwey getrennten Stämmen, den beyden Hohladern, in dem Vorhofe

des venöſen Ventrikels, erſt in dieſem alſo iſt die Totalcontraction des venöſen Syſtemes erreicht. Aber das venöſe Syſtem, als das urſprünglich expandirte und nur in ſeiner Metamorphoſe contrahirte, iſt auch im Expanſionszuſtande gegen das arterielle, welches das urſprünglich contrahirte iſt. Daher iſt die Capacität der Venen zu jener der Arterien wie 4 zu 1. Auch enthalten ſie eine bey weitem gröſſere Quantität Blutes als die Arterien. Von 28 - 30 Pfunden Blutes, welche ein Erwachſener beſitzt, ſind mehr als 2/3 venöſes, und weniger als 1/3 arterielles Blut.

§. 428.

In den Venen iſt die innere Gefäſsehaut noch weniger durch die Vorherrſchaft der mittleren oder faſerigen überwältigt. Vermöge der mindern Individualiſirung der letzten praeponderirt noch die erſte, nur minder als in den Lymphgefäſsen. Denn durch die ganze Metamorphoſe der Gefäſseformation hindurch werden zuerſt die beyden Oberflächen der Gefäſsewandung immer mehr im Gegenſatze gegeneinander gebildet, dann zerfällt dieſe ſelbſt in mehrere Schichten, und weiter hin iſt die Tendenz, der Expanſionszuſtand der innern, in Duplicaturen und Klappen verlängerten Gefäſsehaut zu beſchränken, und die eigenthümliche Gefäſsehaut im Gegenſatze derſelben mehr zu individualiſiren. Indem die erſte (in der Bildung des Herzens) ganz verdünnt, zuletzt verdrängt wird, die letzte dagegen ſich immer mehr in einzelnen Faſerlagen und verſchiedenen Richtungen der Faſern-

bündel evolvirt, geht die Gefäſsebildung in die Muskelbildung über.

§. 429.

Daher iſt die Faſernhaut in den Venen dünner, ſchwächer als in den Arterien. Sie beſitzen keine Ringfaſern; die wenigen bloſsen Muskelfaſern verlaufen nach der Länge parallel mit der Gefäſseaxe. Der Verlauf der Muskelfaſern nach der Länge in den Venen iſt das Zeichen der Herrſchaft des Magnetismus. In den kleinen Venen verſchwinden auch dieſe, und nur in den gröſſern Stämmen, beſonders in den Präcordialvenen, welche die am meiſten individuell gebildeten ſind, werden mehrere Faſern deutlich unterſchieden. Die Hohladern beſitzen ſogar nahe bey ihrer Einmündungsſtelle in den Venenſack, Ringfaſern, gleich den Arterien. Eben ſo ſind auch nur in dieſen einzelne Nervenfaden vom gangliöſen Syſteme gewahrnehmbar. Vermöge des hier obwaltenden Gegenſatzes der Muskel- und Nervenfaſer findet auch eine wirkliche contractive und expanſive Bewegung an den beyden Hohladern ſtatt. Die Undulation, welche dort wahrgenommen wird, iſt nämlich keinesweges eine Folge der Regurgitation des Blutes aus dem Vorhofe in die Hohlvenen; ſie iſt keine mechaniſch mitgetheilte Bewegung. Sondern es iſt die gleichſam in eine Summe zuſammengewachſene Gefäſsebewegung aller Venen, die unmerklich klein in den venöſen Haarröhrchen, und in ihrer Progreſſion von Zweig zu Aſt, und von Aſt zu Stamm verſtärkt, — ſchon als wirkliche Pulſation auf das Herz trift, und, von die-

ſem aus reflectirt, als arterielle pulſirende Bewegung den Arterien mitgetheilt wird. Die Hohladern haben eine wahre Syſtole und Diaſtole, welche mit der Syſtole und Diaſtole der Herzenskammern zuſammentrift, und mit jener der Vorhöfe abwechſelt. Jene undulirende Bewegung wird nicht allein an der obern Hohlvene, deren Mündung offen und durch keine Klappe verſchloſſen iſt, ſondern auch an der untern beobachtet, in welche der Rückfluſs des Blutes wenigſtens gröſstentheils durch die Euſtachiſche Klappe verhindert wird. Eben ſo an allen etwas beträchtlichen Stämmen der Venen des Unterleibs.

§. 430.

Die gröſſere Weiche, Ausdehnbarkeit und die geringere Elaſticität der Venenhäute iſt der Grund davon, daſs dieſe, ohne zu zerreiſſen, einem oft ſehr groſsen Gewichte zu widerſtehen vermögen. Die innere Gefäſsehaut iſt in den Venen noch in häufige Klappen verlängert, nur ſind dieſe minder zahlreich als in den Lymphgefäſsen. Auch haben die oberflächlichen Venen Klappen, die tiefer liegenden, mehr individualiſirten Venen beſitzen nur wenige oder kleine. Eben ſo ſind bey minder edlen Thiergattungen die Klappen in den Venen ungleich häufiger. Im allgemeinen ſtehen ſie einander paarweiſe entgegen, und der Gefäſsecanal irgend einer Vene wird durch ſie in mehrere einzelne Höhlen getheilt, welche ſich nur periodiſch und in einer beſtimmten Richtung ineinander entleeren. Im allgemeinen ſind auch die Klappen, ſo wie an den

Mündungen der verschiedenen Höhlen des Herzens, so an denjenigen Stellen zugegen, wo irgend ein Ast mit dem Stamme zusammenmündet, kurz da, wo zwey verschiedene und im Gegensatz gebildete Gefässehöhlen ineinander offen stehen. Denn jede neue Evolution in der Gefässebildung ist durch eine Klappe bezeichnet. Jede durch zwey Klappen nach oben und nach unten geschlossene Abtheilung einer Vene ist als eine besondere Gefässehöhle für sich zu betrachten. Wie in arteriellen Organen die Abgrenzung der Höhlen durch Schliessmuskeln geschieht, so in venösen durch Klappen. Den Uebergang der Einen Art in die andere bilden die zugleich musculösen Klappenringe an einzelnen Stellen des Darmcanales. In der arteriellen Gefässebildung ist durchaus die Allgemeinheit vorherrschend. Es ist Eine Stammhöhle, die sich in den Aesten ausbreitet. Das Eigenthümliche der Vene ist aber das Vorherrschen der Besonderheit der Differenz, und nur widerstrebend, gleichsam überwältiget von der Allgemeinheit, vereinigen sich diese zum Stamme. Die Besonderheit kehrt aber in den Venen stets wieder durch die Abgrenzung der Gefässehöhlen mittelst häufigen Klappen.

Die contractive Thätigkeit, welche in den Arterien die Pulsation bestimmt, ist in den Venen in der Metamorphose der Gefässebildung selbst fixirt: — daher pulsiren im Allgemeinen die Venen nicht. Der Blutlauf durch die Venen ist kein elektrischer, sondern ein magnetischer Prozess, eine stets fortgesetzte Einsaugung. Die contractive und expansive Bewegung, welche in den Arterien, in einzelne Zeit-

momente vertheilt, als Systole und Diastole hervortritt, ist bey ihnen noch synchronisch vereint. Aber die Klappen sind die Pulse der Venen, jede Klappe ist einer bleibenden Contraction der Vene vergleichbar; jede ist ein gleichsam in der Thätigkeit erstarrter und in anscheinender Ruhe fortdauernder Pulsschlag. Daher sind die Klappen das mächtigste Förderungsmittel des Blutlaufes in den Venen, so wie die Pulse in den Arterien. Auf der Seite dieser ist in der Gefäßsebewegung ein relatives Maximum von Activität, und auf der Seite jener ein relatives Maximum von Passivität. Aber der Blutlauf in den Venen ist nur anscheinend passiv. Zwar sind die Venen nur thätig, und die Fortleitung des Blutes in diesen geschieht — nur im Gegensatze der arteriellen Gefäßsethätigkeit. Aber auch diese ist nur bestimmt durch den Gegensatz der venösen Gefäßsebewegung. Da die arterielle Gefäßsebewegung der excentrischen Effulguration des Lichtes, und die venöse Gefäßsethätigkeit dem Prozesse der Schwere entspricht, welcher die Einheit in der Totalität bekräftigt, und alles zu dem Centrum zurückfordert, so ist auch in den Venen, so wie die Schwere in den Dingen, Bewegung in der Ruhe. Nur aufdieselbe Weise sind die Venen träge und unthätig, wie die Materie (in der Reflexionsansicht) für träge erachtet wird. Die Gefäßsebewegung ist daher in ihnen anscheinend von der Maschineneinrichtung in diesen Gefäßen selbst, von der Gegenwart der Klappen, von dem Drucke benachbarter Arterien, deren Pulsation den ihnen anliegenden Venen mitgetheilt wird, von dem Spiele der Muskeln, in de-

ren Interſtitien die Venen verlaufen, abhängig. — Durchaus von keiner Bedeutung für die Fortbewegung des Blutes in den Venen iſt die Propulſivkraft des Herzens, und jene der Arterien. Beyde erlöſchen ſchon in den kleinſten Arterien, ſind null im Capillargefäſsſyſtem, und üben durch dieſes hindurch keinen Einfluſs auf die venöſe Gefäſsebewegung aus.

Die regreſſive Bewegung des Blutes in den Venen iſt nur das Symbol, das empiriſche Phönomen der urſprünglich in der venöſen Gefäſsebildung geſetzten Contraction der Aeſte im Stamme: der venöſe Blutlauf alſo nur die Abbildung, nur ein beſtimmter Ausdruck der venöſen Gefäſsebildung: das venöſe Gefäſsegeſchlecht nur die geometriſche Conſtruction des venöſen Blutlaufes. Es verſchwindet hier jeder Anſchein von Maſchineneinrichtung, von hydroſtatiſchen Regeln: nur indem die venöſe Gefäſsebildung ſelber, als in ſtetiger Metamorphoſe begriffen, von den urſprünglich expandirten Aeſten in den contrahirten Stamm fortſchreitet, wird das Blut ſelber in gleicher Richtung fortbewegt. Daſs nun wirklich das Blut in den Venen der venöſen Gefäſsebewegung ſelber folge, und alſo in regreſſiver Bewegung von den venöſen Endigungen in die Zweige, von dieſen in die Aeſte und von den Aeſten in die Stämme fortſchreite, beweiſst:

1) Die Dispoſition der Klappen. Dieſe verhindern die progreſſive centrifugale Bewegung des Blutes in den Venen. Man kann durch fortgeſetzten Druck das Blut in den Venen ganz gegen das Herz

hinschieben, ohne dass hierbey die Valveln ein Hinderniss setzen. Aber die Valveln widerstreben standhaft der Verschiebung des Blutes in der entgegengesetzten Richtung, die Klappen nämlich öffnen sich gegen das Herz zu, und bilden blinde Säcke gegen das peripherische Ende der Vene hin. Die Klappen nun schneiden einzelne Segmente im Verlaufe der Venen so ab, dass der Zurückfluss des Blutes gegen ihr peripherisches Ende hin gänzlich verhindert wird. Daher sind die Klappen am häufigsten in den Venen der Muskeln, auf welche das venöse Blut eine wirklich narcotische Kraft äussert. Die Circulation in dem Gefässesystem der Muskeln ist höchst beschleunigt auf der venösen Seite; langsam und in vielfacher Verästung zieht die Arterie durch den Muskel dahin, und dieser oxydirt sich aus dem Sauerstoff des arteriellen Blutes: aber so wie das Oxygen von dem Blute entnommen ist, und die Nacht in der Venosität einbricht, entflieht die höchst verbrennliche Blutwelle schnell aus dem Muskel, dessen tödtendes Prinzip sie führt. Eben so ist auch die Mündung der Kranzvene des Herzens mit einer Klappe versehen, denn auch der Tod des Herzens ist im venösen Blute: und nur die innere Haut des Herzens schützt dessen Muskelsubstanz in dem venösen Ventrikel gegen das tödtende Prinzip des venösen Blutes. Dagegen folgt in jenen Venen, welche keine Klappen haben, das Blut wirklich häufig oscillirenden Bewegungen, z. B. in den Abdominalvenen.

Der venöse Blutlauf, welcher seiner Natur nach träge ist, ist es noch mehr in den Abdominalvenen,

vermöge des dynamischen Uebergewichtes der venösen Richtungspolarität in den Unterleibseingeweiden. Ohne Klappen sind die Venen der vorzüglich venösen Organe, mit häufigen Klappen versehen, und von daher thätiger in der Gefäſsebewegung, sind sie in den Organen, in welchen eine vorzugsweise arterielle Stimmung obwaltet.

Die Valveln verschlieſsen eben so den Injectionsmaterien, und der eingeblasenen Luft, als den Blutwellen, den Rückgang von den Stämmen gegen die Aeste mehr oder weniger vollkommen. Die Injectionsmasse sammelt sich, wenn man von den Stämmen gegen die Aeste einspritzt, in den blinden Säcken der Klappen an, und dehnt diese kropfartig aus.

2) Wenn man auf irgend eine Art den Blutlauf in einer Vene an irgend einer Stelle hemmt, z. B. durch Compression, Unterbindung etc., so schwillt die Vene immer auf jener Seite des Bandes an, welche dem peripherischen Ende zugekehrt ist, und entleert sich auf der entgegengesetzten Seite gegen das Herz hin. Daher kömmt bey Aderlässen immer der Strom des Blutes von dem peripherischen Ende her. Unterbindung der Gliedmassen bey profusen Hämorrhagien aus den Lungen, aus der Scheide hält einen Theil des Blutes in den Venen der Extremitäten zurück, und sichert vor gänzlicher Verblutung.

3) Die chirurgia infusoria bestättigt dasselbe. Wenn man irgend eine Flüssigkeit bey lebenden Thieren in eine geöffnete Vene injicirt, welche

eine Gerinnung des Blutes veranlaſst, ſo findet man nach dem Tode das Blut geronnen von der Incisionsſtelle an gegen das Herz hin, nicht aber von der Incisionsſtelle an gegen die peripheriſche Endigung der Vene.

4) Zuletzt ſieht man mit bewaffnetem Auge bey kaltblütigen Thieren, beſonders in der Harnblaſe der Fröſche, das Blut in den Venen von den peripheriſchen Endigungen ſich gegen das Herz hin bewegen.

Aber von den beyderley Gefäſseſyſtemen für das rothe und für das ſchwarze Blut, hat jenes wieder ſeine venöſe und dieſes ſeine arterielle Seite. Denn von der vordern Herzenskammer aus entſtehen die Lungenarterien, welche die Arterien im venöſen Syſteme ſind. Das Lungenherz hat, ſo wie das Aortenherz, nur Eine arterielle Mündung, die Lungenarterien theilen ſich in Aeſte und Zweige, gleich der Aorte, und ihre letzten Verzweigungen enden im Capillargefäſseſyſtem. Die Geſetze der Gefäſsebewegung ſind dieſelben wie im Aortenſyſteme. Die Lungenſchlagadern pulſiren und treiben das Blut in das Capillargefäſseſyſtem der Lungen über. Alle Abkömmlinge der Lungenſchlagadern pulſiren gleichzeitig; es iſt eine in ſich zuſammenhängende Blutſäule, welche ſie erfüllt, und dieſe iſt nicht wellenförmig getheilt. Die Bildung ihrer membranöſen Wandungen iſt arteriell. — Jedoch iſt die compacte Beſchaffenheit der letzten geringer als in den Wandungen der Aorte und ihrer Aeſte. Daher fallen ihre Durchſchnitte zuſammen; die Ent-

wickelung des Muskelgewebes steht nicht im Verhältniss der Grösse der Durchmesser der Gefässe. So wie der vordere Ventrikel weniger reich an Nerven ist als der hintere; so auch die Lungenschlagadern im Verhältnisse zu den übrigen Arterien. Sie haben einen weniger geschlängelten, sinuösen Verlauf; ihre Pulsation ist undeutlicher. Die Lungenschlagadern stellen mittelbar eine Fortsetzung der Hohladern dar; und die innere Gefässehaut geht durch das Lungenherz hindurch in sie über.

Aus dem Capillargefässesystem der Lungen nehmen die Lungenvenen ihren Ursprung; sie münden durch fortgesetzte Anastomose zusammen, und bilden grössere Stämme, ganz nach Art der venösen Gefässebildung. Sie stimmen auch in der Bildung ihrer membranösen Wandungen mit den übrigen Venen überein. Sie pulsiren nicht, die Gefässebewegung geschieht langsam, ohne sichtbare Veränderung in der Grösse des Durchmessers der Gefässehöhle, — wie der Saft in den Gefässen der Pflanzen aufsteigt. Aber sie sind arterielle Venen. Sie führen ein neu oxydirtes, nicht mehr phlogistisches Blut, setzen sich durch den hintern Ventrikel in das Aortensystem fort. Sie sind daher auch der varicösen Erweiterung niemals unterworfen.

Der Lungenblutlauf geht ungleich rascher vor sich als der Aorten- und Hohladernblutlauf. Denn da eine gleich grosse Quantität von Blut gleichzeitig durch das Gefässesystem der Lungen, und durch das allgemeine Gefässesystem fliesst; so wird die geringere Länge der Blutgefässe der Lungen durch

die gröſſere Geſchwindigkeit des Blutlaufes compenſirt, und ſo das Gleichgewicht hergeſtellt. Die Schnelligkeit des Blutlaufes durch die Lungen erklärt die hohe arterielle Stimmung dieſes Organes, — die Nothwendigkeit der Aderläſſe bey den meiſten idiopathiſchen Lungenentzündüngen, u. ſ. f. Aber auch dieſe Verſchiedenheit in der Geſchwindigkeit der Gefäſsebewegung iſt nicht durch hydrauliſche Geſetze, ſondern durch das dynamiſche Verhalten der Lungen zur Totalität der übrigen Organe beſtimmt.

Man erſieht hieraus, wie die Lungen dem Herzen verwandt, und ſelbſt als eine Efflorescenz des Herzens, als ein dynamiſches Herz zu betrachten ſind. Daher beginnt ihre Funktion, und mit ihr die rege Entgegenſetzung der beyden Kreisläufe, des groſsen und des kleinen, erſt wenn der Fötus an's Licht geboren wird: und jener Gegenſatz, der vorhin nur zwiſchen den beyden Vorhöfen obwaltet, zieht ſich nun mehr in das Innere zurück, und ſtellt ſich als Gegenſatz der beyden Ventrikeln ſelbſt dar. So wie daher die Arterien und Venen in jener Syntheſis der Gebildung, in welcher ſie ſich im Organismus ſinden, einen Volta'ſchen Electromotor bilden, ſo iſt das Herz vergleichbar der aus jenem Electromotor ſtetig mit entgegengeſetzten Electricitäten an den beyden Belegeflächen geladenen Leidnerflaſche. Die beyden Belege der antipolaren Flächen ſind ausgedrückt durch die beyden ſich entgegengeſetzten, und in ihrer Conſtruc-

ſtruction iſolirten Ventrikeln des Herzens. Dieſe werden mit ſich entgegengeſetzten Electricitäten aus der Hohlader und den Lungenblutadern geladen, und ſie entladen ſich derſelben durch die Aorte und durch die Lungenſchlagadern, welche ſich als zwey groſse Conductoren an den rechten und linken Herzensventrikel anlegen.

Der kleine Kreislauf, als die Reflexion des groſsen Kreislaufes in ſich ſelber, iſt von dem Prozeſſe der Reſpiration bis zu einem gewiſſen Grade unabhängig. Dieſe Unabhängigkeit zeigt ſich auch darin, daſs der kleine Kreislauf bey aufgehobener Reſpiration noch bis zu einem gewiſſen Grade fortdauert. Er iſt nämlich nicht bloſs die Ausdehnung der Luftzellen der Lungen, wodurch der Einfluſs des Blutes in das Capillargefäſseſyſtem derſelben bedingt wird, ſondern auch unabhängig von der Ausdehnung und Zuſammenziehung der Lungen findet einige Bewegung der Lungengefäſse ſtatt. Beweiſe ſind: die Fortdauer des groſsen und ſomit auch des kleinen Kreislaufes bey gehemmter Reſpiration ſelbſt; bey gänzlich unterdrückter Reſpiration nach der Strangulation; bey Ohnmachten, wo das Athemholen aufgehört hat; die Gegenwart eines in hohem Grade venöſen Blutes im linken Ventrikel und in den groſsen arteriellen Gefäſsen nach asphyctiſchen Todesarten. — Die groſse Blutanhäufung im rechten Ventrikel und den Hohladern nach ſolchen Todesarten kömmt von der geringern Reitzbarkeit des rechten Ventrikels und ſomit von dem früheren

Erlöſchen der Contractilität in dieſem her, wodurch alſo bey fortdauernder Action des linken Ventrikels und ſchon erloſchener Thätigkeit des rechten alles Blut in das venöſe Syſtem übergetrieben wird. Jene Blutanhäufung tritt auch nicht ſogleich mit unterdrückter Reſpiration, ſondern erſt einige Zeit, nachdem dieſe ſchon aufgehört hat, ein.

§. 431.

Deſſen ohngeachtet iſt die Reſpiration eines der mächtigſten Erweckungsmittel des kleinen und ſomit auch des groſsen Kreislaufes; nicht aber ſowohl mechaniſche Ausdehnung des Luftzellenparenchyms der Lunge, ſondern vermöge der präſtabilirten Harmonie, welche zwiſchen Herz und Lungen ſtatt findet.

§. 432.

Für ein Hinderniſs des Lungenkreislaufes, beſonders zur Zeit, wo dieſs ſpongiöſe Eingeweide Luftleer iſt (was bey Ertrunkenen und andern asphyxheten immer der Fall iſt), wird beſonders die Befeſtigung der Lungengefäſse mittelſt häufiger Celluloſität an der Lobularſubſtanz der Lungen gehalten; wodurch die eigene Contraction ihrer Wandungen über die enthaltene Blutſäule ſehr erſchweret werde, indem ſie bey dieſer Zuſammenziehung den ganzen Widerſtand zu überwinden haben, welchen ihnen jene Adhäſion entgegenſetzt. Allein daſſelbe Hinderniſs des Kreislaufes findet auch in dem Gefäſsesyſtem jedes andern parenchymatöſen Eingeweides ſtatt, z. B. in der Leber, und doch geht dort der Kreislauf nach den allgemeinen Ge-

ſetzen der arteriellen und venöſen Gefäſsebewegung von ſtatten. — Die Geſetze des Blutlaufs ſind in den Lungen dieſelben wie in andern Organen: und es iſt ganz falſch, daſs das Blut in ihre Gefäſse nur eindringe, weil — und inſofern dieſe durch die Erweiterung der Luftzellen, in deren Wandungen ſich die Gefäſse verbreiten, mechaniſch ausgedehnt werden.

XVII. Kapitel.

Blutlauf im Capillargefäſsesyſtem.

§. 433.

Der Gegenſatz der Arterien und Venen erliſcht im Capillargefäſseſyſtem. Capillargefäſs heiſst überhaupt ein Gefäſs von dem kleinſten Durchmeſſer. Jedoch iſt es nicht das Maaſs des Durchmeſſers, was ein ſolches Gefäſse zum Capillargefäſse macht, ſondern die unentſchiedene Polarität und das indifferente Verhalten deſſelben.

§. 434.

Daher ſteht auch die Leitungsfähigkeit der Gefäſse irgend eines Organes für rothes Blut oder andere Säfte nicht im direkten Verhältniſſe der Gröſse der Durchmeſſer jener Gefäſse: ſondern ſie iſt durch die Stelle beſtimmt, welche jenes Organ in der graduirten Scale der Irritabilität einnimmt. Daher ſind die rothes Blut führenden kleinſten Gefäſse gewiſſer Organe, z. B. in den Muskeln, eben

sowohl Capillargefäſse, als jene in andern Eingeweiden, welche weiſſe oder andere Säfte führen. So wie aber der Grad der Irritabilität eines Organes wechſelt, ſo wird auch die Leitungsfähigkeit ſeiner Gefäſse verändert: daher erklärt ſich die Erſcheinung der Röthe in anderſt colorirten Theilen bey der Entzündung. Zu verſchiedenen Zeiten aber, ſo wie nämlich die irritable Stimmung eine verſchiedene iſt, ſind die Capillargefäſse, z. B. gewiſſer Hautſtellen, Leiter für rothe Säfte, da ſie es ſonſt gewöhnlich nicht ſind. Da im Capillargefäſsesyſtem alle Gegenſätze ausgeglichen und zur Indifferenz gebracht ſind; ſo ſind auch die Irritabilitätsäuſſerungen noch latent, und gehen nur in undurchdringlicher Stille vor ſich. Selbſt das bewaffnete Auge entdeckt keine contractive und expanſive Bewegung in ihren Wandungen: dieſe beſitzen blos latente Contractilität und latente Ausdehnbarkeit. Die mechaniſtiſche Phyſiologie ſchreibt daher das Aus- und Einſaugen der Capillargefäſse der Attraction ihrer Wandungen (als Capillarröhrchen) zu, ſo daſs die in ihnen aufſteigende Flüſſigkeit jener Attraction der Wandungen folge, und ſomit in ihrer Bewegung die Diagonale der ſich entgegengeſetzten Anziehungen beſchriebe. Aber ſelbſt jene Attraction der Wandungen der Capillarröhren iſt nicht auf mechaniſche, ſondern lediglich auf dynamiſche Weiſe zu begreifen; und konnte man gleich die Exhalation als die letzte Wirkung der Ausſprizung des Blutes aus dem Herzen durch die vis a tergo des letzten erklären, ſo muſste doch ſelbſt die verſtändige Empirie es erkennen, daſs in den Sauge-

gefäſsen primitives Entſtehen von organiſcher Bewegung, und ſomit der Uranfang aller organiſchen Bewegung ſelbſt geſetzt ſey. Die Gefäſsebewegung iſt überhaupt accelerirt im direkten Verhältniſſe ihrer Progreſſion von der Peripherie gegen das Centrum; unmerklich im Syſtem der Capillargefäſse, dagegen durch die in eine Summe zuſammengewachſenen Bewegungen der Capillargefäſse, intenſivſtark in den Präcordialvenen, ſo daſs das Herz nicht der Punkt des Entſtehens der organiſchen Kreisbewegung, ſondern nur der Punkt ihres Reflexes iſt, und von dieſem Organe aus die in den Venen an ihren abſorbirenden Mündungen primär entſtandene Gefäſsebewegung in die arterielle Gefäſsethätigkeit reflectirt wird.

§. 435.

Da alle Kreisbewegung in dem Capillargefäſsesyſtem beginnt, ſo beſitzen auch die Pflanzen und die unterſten Thiergattungen keine andere, als Haargefäſse. So wie aber bey ihnen noch keine Bewegungsrichtung entſchieden iſt, ſo ſind auch ihre Säfte in einer oscillirenden Bewegung. Bey ihnen ſind die beyden Gefäſsepole noch nicht auseinandergegangen; und bey den mehr veredelten Thieren ſind die beyden ſich entgegengeſetzten Richtungen der oscillirenden Bewegung nur, jede für ſich, in einer eigenen Gefäſsethätigkeit hervorgetreten. Auch im Capillargefäſseſyſtem des Menſchen beobachteten Haller und Spallanzani die oscillirende Bewegung der weiſſen Säfte.

§. 436.

Das Capillargefäſsesyſtem, als die erſte durch die Irritabilität in den Organismus gelegte Antitheſe, iſt nothwendig in ſich ſelbſt antithetiſch. Denn dem allgemeinen Capillargefäſseſyſtem entgegengeſetzt, bildet ſich das Capillargefäſseſyſtem der Lungen. In jenem wird das rothe Blut in ſchwarzes verwandelt, in dieſem wird dagegen das ſchwarze Blut geröthet. Das allgemeine Capillargefäſseſyſtem ſtellt den Punkt des Reflexes der Arteriellität in die Venoſität, und das beſondere Capillargefäſseſyſtem der Lungen ſtellt den Punkt des Reflexes der Venoſität in die Arteriellität dar.

§. 437.

In beyden wurzelt und verzweigt ſich das Syſtem. Der Kreislauf iſt nur eine pendulirende Bewegung zwiſchen beyden. In ihnen entſteht die primitive Bewegung des Kreislaufes, ſie wächſt im Verhältniſſe der Summe der Durchmeſſer der anaſtomoſirenden Haargefäſse, und iſt da, wo ſie das Herz trift, ſo mächtig herangewachſen, daſs ſie auf dieſe mit einem electriſchen Schlage trift, und von ihm als Pulſation in die Arterien reflectirt wird.

§. 438.

Das Syſtem der Haargefäſse iſt das überall verbreitete. Kein Punkt innerhalb der Sphäre des Organes ohne Haarröhrchen. Dieſe machen einen integrirenden Theil des Gewebes aller Organe aus: der Prozeſs der Nutrition, der Abſorption und Exhalation geht in ihnen vor: — da, wohin kein ar-

terielles und kein venöſes Gefäſs mehr dringt, ſind Capillargefäſse zugegen.

Das Syſtem der Capillargefäſse führt in einigen Organen bloſs Blut, z. B. in der Milz, in einigen Theilen der Schleimhäute (ſo wie auch in den Lungen), in den Muskeln. In dieſen Haargefäſsen iſt das Minimum von Bewegung ausgedrückt, dieſs erſcheint als Ruhe.

§. 439.

In den meiſten Organen führen die Haarröhrchen auſſer dem Blute noch andere Säfte: das weiſſe, gelbe Blut von Löwenhoeck und Boerhave.

Ein groſser Theil von ihnen enthält nur Blutdunſt, und nimmt nur zu beſtimmten Zeiten wahres Blut auf, z. B. in dem Zellengewebe, in den ſeröſen Häuten, in der Haut: bey Entzündung, bey dem Erröthen, bey Injectionen mit feinern diffuſibeln Maſſen wird eine Menge von Haargefäſsen angefüllt, welche ſonſt nie ſichtbar ſind.

In einigen Organen führen die Haargefäſse nie Blut, z. B. in den Knorpeln, den Sehnen, den Bändern, den Haaren. Feine und glückliche Injectionen, ſo wie chroniſche Entzündung, laſſen auch in ſie Blut eindringen und thun ſo die Gegenwart von Capillargefäſsen in ihnen dar. Bloſs vegetirende Organe (Knochen) haben ſehr wenige Haargefäſse im Verhältniſſe zu andern. Die Menge der Capillargefäſse eines Organes ſteht nicht im Verhältniſs ſeiner Maſſe, ſondern der Qualität ſeiner Function. Die Entzündung, die Verſtopfung, Verhärtung, die Schwämme, die Ausſchläge gehören gröſstentheils den Capillargefäſsen an.

§. 440.

Es dringt um so mehr Blut in die Capillargefäſse eines Organes ein, je mehr potenzirt gerade seine Action ist. Darauf gründet das Gesetz: wo Reizung ist, da ist Zufluſs der Säfte. Nichts ist irriger, als die entgegengesetzte Behauptung, — daſs nämlich gegen den am meisten geschwächten Theil die Richtung der Säfte und des Blutes überhaupt bestimmt werde. Es giebt keine passive Congestion, ausser jener bey dem Extravasate (bey der Zerreissung, bey künstlicher, oder zufälliger Verwundung der Gefäſse, — bey dem Aderlaſs). Jede andere Congestion ist activ.

§. 441.

Das Haargefäſsesystem bildet ein Netz, welches durch alle Theile des Körpers sich fortsetzt, und durchaus in allen seinen Theilen durch die frequenteste Anastomose communicirt. In dieſs Gewebe endigen sich die Arterien, aus ihm entstehen die Exhalationsgefäſse, die absorbirenden entstehen aus ihm, und die Venen. Die Arterien communiciren entschieden in demselben mit den Venen.

§. 442.

Es ist eitle Fabel, daſs die Haargefäſse, welche kein rothes Blut führen, kleinere Durchmesser haben, als die übrigen. Die Anatomie erweiſst diesen Unterschied keineswegs. Es sind die unterschiedenen Grade der Irritabilität, welche jedem einzelnen Röhrchen zukömmt, und welche nur die diesen entsprechenden Flüssigkeiten zuläſst. Bey lebenden

Thieren dringt nie Injectionsmasse in die Capillargefäße, selbst kurz nach dem Tode verschliessen sich diese noch der Injectionsmasse durch spastische Constriction. Rothes Blut führen die Haargefäße derjenigen Theile, welche sich aus dem Färbestoff des Blutes ernähren, Muskeln und Schleimhäute, oder in welchen das Blut zu bestimmten Functionen sich sehr langsam bewegt, z. B. Milz, cavernöse Körper, schwammige Körper der Harnröhre.

§. 443.

Dagegen sind die Haargefäße jener Theile, welche sich nicht aus dem rothen Theile des Blutes reconstruiren, z. B. die Knochen, keine Leiter für das Blut, Pleura, Bauchfell, Bänder, Knorpel.

Aber bey krankhaft verändertem Cohäsionsgrade werden auch die Capillargefäße dieser Theile Blutleiter. So ist auch die Bewegung des Blutes und anderer Säfte in ihnen von dem Impulse des Herzens beynahe ganz unabhängig, und das Herz hat ungleich weniger Einfluss auf den Kreislauf in den kleinsten, als in den grossen Gefäßen.

§. 444.

Dem allgemeinen Capillargefäßesystem entgegen bildet sich nun das Capillarsystem der Lungen; in jenem wird das rothe Blut in schwarzes, in diesem das schwarze Blut in rothes verwandelt.

So wie in den Lungenarterien der venöse Character nach aussen gekehrt, und der arterielle nach innen zurückgedrängt ist, so sind auch die exhalirenden Capillargefäße der Lungen venösen Ge-

§. 440.

Es dringt um ſo mehr Blut in die Capillargefäſse eines Organes ein, je mehr potenzirt gerade ſeine Action iſt. Darauf gründet das Geſetz: wo Reizung iſt, da iſt Zufluſs der Säfte. Nichts iſt irriger, als die entgegengeſetzte Behauptung, — daſs nämlich gegen den am meiſten geſchwächten Theil die Richtung der Säfte und des Blutes überhaupt beſtimmt werde. Es giebt keine paſſive Congeſtion, auſſer jener bey dem Extravaſate (bey der Zerreiſſung, bey künſtlicher, oder zufälliger Verwundung der Gefäſse, — bey dem Aderlaſs). Jede andere Congeſtion iſt activ.

§. 441.

Das Haargefäſseſyſtem bildet ein Netz, welches durch alle Theile des Körpers ſich fortſetzt, und durchaus in allen ſeinen Theilen durch die frequenteſte Anaſtomoſe communicirt. In dieſs Gewebe endigen ſich die Arterien, aus ihm entſtehen die Exhalationsgefäſse, die abſorbirenden entſtehen aus ihm, und die Venen. Die Arterien communiciren entſchieden in demſelben mit den Venen.

§. 442.

Es iſt eitle Fabel, daſs die Haargefäſse, welche kein rothes Blut führen, kleinere Durchmeſſer haben, als die übrigen. Die Anatomie erweiſst dieſen Unterſchied keineswegs. Es ſind die unterſchiedenen Grade der Irritabilität, welche jedem einzelnen Röhrchen zukömmt, und welche nur die dieſen entſprechenden Flüſſigkeiten zuläſst. Bey lebenden

Thieren dringt nie Injectionsmasse in die Capillargefäſse, ſelbſt kurz nach dem Tode verſchlieſsen ſich dieſe noch der Injectionsmaſſe durch ſpastiſche Conſtriction. Rothes Blut führen die Haargefäſse derjenigen Theile, welche ſich aus dem Färbeſtoff des Blutes ernähren, Muskeln und Schleimhäute, oder in welchen das Blut zu beſtimmten Functionen ſich ſehr langſam bewegt, z. B. Milz, cavernöſe Körper, ſchwammige Körper der Harnröhre.

§. 443.

Dagegen ſind die Haargefäſse jener Theile, welche ſich nicht aus dem rothen Theile des Blutes reconſtruiren, z. B. die Knochen, keine Leiter für das Blut, Pleura, Bauchfell, Bänder, Knorpel.

Aber bey krankhaft verändertem Cohäſionsgrade werden auch die Capillargefäſse dieſer Theile Blutleiter. So iſt auch die Bewegung des Blutes und anderer Säfte in ihnen von dem Impulſe des Herzens beynahe ganz unabhängig, und das Herz hat ungleich weniger Einfluſs auf den Kreislauf in den kleinſten, als in den groſsen Gefäſsen.

§. 444.

Dem allgemeinen Capillargefäſseſyſtem entgegen bildet ſich nun das Capillarſyſtem der Lungen; in jenem wird das rothe Blut in ſchwarzes, in dieſem das ſchwarze Blut in rothes verwandelt.

So wie in den Lungenarterien der venöſe Character nach auſſen gekehrt, und der arterielle nach innen zurückgedrängt iſt, ſo ſind auch die exhalirenden Capillargefäſse der Lungen venöſen Ge-

ſchlechtes, und die abſorbirenden ſind arteriellen Geſchlechtes. Denn in den Lungengefäſsen iſt die Gefäſsepolarität überhaupt umgekehrt, und die Oxygenelectricität iſt in dem Blut der Lungenblutadern, die Hydrogenelectricität im Blut der Lungenſchlagadern hervorgetreten.

§. 445.

Durch ihr Capillargefäſseſyſtem ſtehen nun die Lungen im Gegenſatze mit dem ganzen Organismus, und halten das dynamiſche Gleichgewicht allen andern Organen. Das Capillargefäſseſyſtem der Lungen ſtellt aber überhaupt nur den arteriellen Gegenſatz des allgemeinem Capillargefäſseſyſtemes und dieſes den venöſen Gegenſatz des erſten dar.

§. 446.

Allein die Lunge, als ein zur planetariſchen Einheit ihres Weſens gelangtes Organ, hat nothwendig eine doppelte Seite, eine unendliche, durch welche ſie allem, was als ein Endliches im Organismus auf beſtimmte Weiſe beſteht, entgegengerichtet iſt, und eine endliche, wodurch ſie als ſelbſtiſche Einheit in ſich beſteht. Sie hat darum auch zwey von ſich ſelbſt unabhängige Capillargefäſseſyſteme. Das aus der Verbreitung der Luftröhrenſchlagader und Luftröhrenblutader gebildete Haargefäſseſyſtem gehört dem allgemeinen Capillargefäſseſyſtem an, und communicirt nur wenig, nur mittelſt der Anaſtomoſe der feinſten Zweige mit dem Capillargefäſseſyſtem der Lungenſchlag- und Lungenblutader.

Anmerk. Die Entzündung hat immer nur Einen Sitz — im Capillargefäſeſyſtem der Organe. Von daher iſt auch

jedes Organ der Entzündung fähig, da ein jedes aus Capillargefäſsen gebildet iſt: ſelbſt der Knochen, die fibröſen, knorplichen Bildungen, die Haare. — Selbſt bey der Entzündung der Blutgefäſse ſind nicht dieſe ſelbſt, ſondern die Capillargefäſse ihrer membranöſen Wandungen der Sitz der Krankheit. — Immer nehmen die gröſſern Blutgefäſse entweder keinen oder nur einen ſecundären Antheil an der Krankheit. Es giebt Entzündungen ohne Fieber, mit nicht verändertem Pulſe. Da aber Arterien und Venen in das Capillargefäſseſyſtem enden, und wieder aus dieſem hervorgehen, ſind ſie natürlich die erſten, welche durch die Entzündung ſecundär afficirt werden. — Alle Erſcheinungen der Entzündung beziehen ſich zunächſt auf das Capillargefäſseſyſtem, und auf die demſelben eigenthümlichen Verrichtungen. Die Calorification, die Entbindung der thieriſchen Wärme geht beynahe allein im Capillargefäſseſyſtem vor ſich: daher iſt bey der Entzündung die Wärme erhöhet. Eben ſo hängt die Röthe des entzündeten Theils und der vermehrten irritablen Stimmung der Capillargefäſse von ihrer dadurch bedingten Leitungsfähigkeit für rothes Blut ab. — Die Entſtehung der Geſchwulſt iſt zwar nicht durch die mechaniſche Ausdehnung und Ueberfüllung des Capillargefäſseſyſtemes bedingt, ſondern ſie iſt eine Folge des erhöhten Expanſionstriebes, welcher auf eine wahre Vermehrung des Volumens, nicht der Maſſe hingeht: daher dehnt ſich das entzündete Organ immer nach der Oberfläche aus.

Da es nun im Capillargefäſseſyſtem weder Arterien noch Venen giebt, ſondern beyde Gefäſsepolaritäten dort erloſchen, und zur Indifferenz gebracht ſind; ſo iſt es leicht einzuſehen, daſs bey der Entzündung keine Umkehrung der beyden Gefäſsepolaritäten ſtatt finden, und die Erſcheinungen der Entzündung nicht aus dieſem veränderten Verhältniſs der arteriellen und der venöſen Gefäſsethätigkeit unter ſich reſultiren können.

Bey der Entzündung iſt die Indifferenz der beyden Gefäſsepolaritäten im Capillargefäſseſyſtem aufgeho-

ben; und in dieſem treten beyde im lebhaften Gegenſatze gegeneinander hervor: die Arterie in ihrer arteriellen Endigung, die Vene in ihrem Wurzelanfange. Die Capillargefäſse ſelbſt alſo, welche im geſunden Zuſtande keine Polarität zeigen, und ſich indifferent verhalten, nehmen hierbey Polarität an: und verhalten ſich wie groſse Blutgefäſse. — So wie aber im Gefäſseſyſtem überhaupt die arterielle Gefäſsethätigkeit die vorherrſchendere, und die venöſe von dieſer unterdrückt iſt; ſo nimmt auch bey der Entzündung das Capillargefäſseſyſtem vorzugsweiſe eine arterielle Stimmung an: es iſt mit rothem, in hohem Grade oxydirten Blut angefüllt: die Temperatur dieſes Blutes iſt erhöht, gleich jener des arteriellen Blutes; und es entſteht im Capillargefäſseſyſtem des entzündeten Theiles pulſirende Bewegung gleich dem Pulsſchlage der Arterien. Der klopfende Schmerz bey Entzündungen hat in dieſer arteriellen Stimmung des Capillargefäſseſyſtems ſeinen Grund.

Eben ſo iſt die Staſis des Blutes und anderer Säfte im entzündeten Theile eine Folge, der nicht nur abſolut, ſondern auch relativ, zur venöſen, erhöhten arteriellen Gefäſsethätigkeit; denn die Congeſtion iſt gröſser als die Fortleitung. Es giebt im eigentlichen Sinne des Worts keine astheniſche Entzündung; keine Entzündung, welche auf Schwäche, auf einem geſchwächten Zuſtande des entzündeten Organes beruhte. Unter allen Lehren der Brownianer iſt ihre Theorie der Entzündung, nach welcher der entzündete Theil immer der relativ ſchwächere iſt, — die irrigſte. Bey jeder Entzündung iſt vermehrte Thätigkeit im entzündeten Organe. Immer iſt die irritable Stimmung des entzündeten Organes, und mit ihr alle Irritabilitätsäuſſerungen, welche zunächſt durch dieſe bedingt ſind, erhöht. Das Blut wird nicht durch die vis a tergo der gröſsern Blutgefäſse in das Capillargefäſseſyſtem des entzündeten Organes getrieben, weil deſſen Gefäſse die relativ geſchwächteren ſind, und folglich dem Andrange des Blutes geringern Widerſtand darbiethen; ſondern wo ein Zuſtand von Reitzung iſt,

dahin ist vermehrter Zufluſs der Säfte. Indem die Entzündung von irritabler Art ist, das Wesen der Irritabilität und des ihr gleichgesetzten electrischen Prozesses aber das freyere Hervortreten der Antithese und der Gegensätze ist, so geht die Entzündung nothwendig darauf hin, die Indifferenz des Seyns und Bestehens in organischen Gebilden aufzuheben, diese in sich selbst zu differenziren, und vorher unbekannte Gegensätze in ihnen zu entwickeln, überhaupt in der Cohäsionslinie, in welcher jeder Punkt eine relative Indifferenz bezeichnet, die Pole hervortreten zu lassen. — In jedem Organe strebt die Reproductionskraft stetig, dieſs Organ als eine Indifferenz in seiner Identität und Selbstgleichheit zu behaupten; und da die Cohäsion jedes Organes der Ausdruck seiner Indifferenz und der innern Einheit seines Seyns und Bestehens ist, so strebt die Reproductionskraft, die Cohäsion zu erhalten. Die Irritabilität dagegen, vermöge ihrer antithetischen Natur, strebt, die Cohäsion aufzuheben, das Organ in sich selbst zu differenziren, Polarität in dasselbe zu legen, und ihm Ungleichartigkeit der Theile zu verleihen. Die Reproduction ist thetisch, das Organ setzend, ihm Seyn und Poren verleihend, die Irritabilität ist antithetisch, ihm Polarität und Ungleichartigkeit der Theile verleihend. Das Organ behauptet sich durch stetige Selbstreconstruction nur dadurch in seiner Besonderheit, daſs die Irritabilität stets neue Gegensätze in dasselbe legt, und daſs die Reproductionskraft, vermöge ihrer plastischen und magnetischen Natur diese wieder bindet: d. h. daſs beyde, die Reproductionskraft und die Irritabilität, in die höhere Dimension der Sensibilität aufgenommen, und dort zur synthetischen Einheit ihrer selbst verklärt werden. — Das Wesen der Entzündung ist nun dieses, daſs Gegensätze in dem Organe entstehen, welche die stets thätige Reproductionskraft in diesem nicht wieder auszugleichen vermag. Nicht jede Potenzirung der Irritabilität ist sogleich Entzündung. Wenn Gegensätze angeregt, aber auch wieder durch die Reproductionskraft gebunden werden: so kömmt es nicht zur

Entzündung, z. B. bey der Congestion in das sonst nicht mit rothem Blute angefüllte Capillargefäſssystem der Haut durch Reibung, etc. nicht jede vorübergehende Röthe des Auges ist Entzündung. — Entzündung ist aber unmittelbar damit gegeben, wenn die irritable Stimmung eines Organes bis zu dem Grade steigt, daſs die durch sie angeregten Gegensätze nicht mehr gebunden werden können. Dieſs ist auch der Unterschied der Entzündung und der Congestion. — Die Congestion ist eine Folge der erhöhten irritablen Stimmung eines Organes, einer Parthie des Gefäſsesystemes, bey welcher aber die Gegensätze noch ausgeglichen werden können, und bey welcher es nicht zur Aufhebung der Indifferenz kömmt, welche ein einzelnes Organ durch sein besonderes Seyn bezeichnet.

Es ist das Gesetz der Irritabilität, daſs alles im Organismus nur im Gegensatze bestehe, und diese hat das Bestreben, die gröſste Unabhängigkeit unter sich und von dem Ganzen den einzelnen Theilen zu verleihen.

Die Entzündung ist somit eine wahre Phlogosis, Verbrennung des entzündeten Organes. Sinkt unter dem Verlaufe der Entzündung die Reproduction vermöge ihres Gegensatzes gegen die Irritabilität unter allen Grad herab; wird die Cohäsion, mit ihr die Starrheit, ganz aufgehoben; kömmt es zur Verflüssigung des Starren, Colliquation, so tritt Eiterung ein. Wird aber unter dem Verlaufe der Entzündung die Irritabilität erschöpft, und erlischt diese im entzündeten Organe; so bleibt Verhärtung zurück. Die Verhärtung ist ein Zurücksinken in die absolute Cohäsion; der verhärtete Theil ist nicht mehr reitzbar. Alle Polarität, Ungleichartigkeit der Theile ist in ihm aufgehoben, die Gefäſse sind verstopft; und wie bey der Vereiterung das Harte, so unterliegt bey der Verhärtung das Weiche. Der verhärtete Theil muſs sich wieder im gelindern Grade entzünden, damit die Härte schmelze. Wie die Eiterung durch tonische Mittel, welche die Reproduction fodern, so wird die Verhärtung durch reitzende Mittel, welche die Irritabilität hervorrufen, geheilt. Bey dem

Brand erlischt die Sensibilität zuerst, und nur in und mit ihr die übrigen Dimensionen. Was im Parenchym des Organes die Verhärtung und die Vereiterung, das ist an der Oberfläche desselben die Verwachsung und der hydrops acutus: — jene ein Zurücksinken in die absolute Cohäsion, daher ein Streben nach Fortsetznng des Gleichen im Gleichen, ein Erlöschen des electrischen Gegensatzes der Oberflächen, welche zusammenwachsen: diese neue Verflüssigung, Bildung, wenn nicht von wahrem Eiter, doch von eiterförmiger Lymphe, d. h. Eiterbildung ohne Substanzverlust.

§. 447.

Die Theorie vom Kreislauf des Blutes, d. h. von seiner Verführung aus dem Herzen in alle Theile des Körpers mittelst der Arterien, von seinem Uebergange aus den Arterien in die Venen, und von seinem Rückflusse zum Herzen durch die Venen, wurde zuerst von Wilhelm Harvey in der Mitte des 16. Jahrhunderts bekannt gemacht; die Maschineneinrichtung im Gefäßsesystem war aber schon Servet und Cäsalpinus bekannt; aber das eigentlich naturhistorische jener Function erkannte zuerst mit voller Deutlichkeit und Bestimmtheit der Engländer Harvey. Aber weniger glücklich war Harvey in der Construction des Kreislaufes aus Naturursachen, und in dessen physiologischer Erörterung. Die Harvey'sche Theorie kann nicht unbeschränkt in physiologischer Beziehung angenommen werden. Harvey erklärt das Herz als das erste und einzige Agens im Kreislaufe, und sieht die Arterien und Venen für passive, durch die vis a tergo mechanisch erweiterte Canäle an. Harvey nimmt in allen Gefäßen einerley Geschwindigkeit der Be-

wegung des Blutes an, da doch der Kreislauf in den arteriellen Gefäſsen nothwendig progreſſiv retardirt, und in den venöſen progreſſiv accelerirt iſt. Zuletzt iſt die wichtige Lehre von dem Capillargefäſseſyſtem, welches weder arteriell noch venös iſt, von der Unabhängigkeit des Blutlaufes in demſelben, von den Geſetzen der Gefäſsebewegung in Arterien und Venen — ſowol von Harvey als von ſeinen Nachfolgern ganz überſehen, und erſt durch Bichat in das gehörige Licht geſtellt worden.

XVIII. Kapitel.

Verhältniſs der Arterien zu den Venen.

§. 448.

Das Verhältniſs der Arterien zu den Venen iſt in jedem Organe ein anderes, und daher reſultiren die Gegenſätze der Theile unter ſich, welche insgeſamt entweder mehr auf die arterielle oder auf die venöſe Seite fallen. Arterielle Organe ſind die Lungen, das Herz, das Zwergfell, die Muskeln überhaupt; — venöſe Organe ſind die Leber, die Milz, die Nieren, die Inteſtinen; unter den Membranen ſind die Schleimhäute mehr arterieller, die ſeröſen Häute mehr venöſer Natur.

§. 449.

Die wichtigſten, durch die Gefäſsepolarität beſtimmten Gegenſätze des Thierleibes ſind jene der obern und der untern Theile, — der rechten und

der

der linken Hälfte — der vordern und der hintern Seite. Der Gegensatz von Rechts und Links, von oben und unten etc. ist nicht zufällig, noch weniger eine bloss willkührliche Bestimmung.

§. 450.

Die obern Theile, jene, welche oberhalb des Zwergmuskels befindlich sind, zugleich mit den Brustgliedern, verhalten sich zu den Theilen unterhalb des Zwergmuskels samt den Beckengliedern, wie arterielles zum venösen. Der Gegensatz beyder ist lediglich eine Wiederholung des allgemein verbreiteten Gegensatzes des positiven, bejahenden, und negativen, verneinenden. Die arterielle Stimmung ist höher in der Brusthöhle als in der Bauchhöhle; das Uebergewicht der Arterien über die Venen ist dort grösser. Die Nähe des Herzens, die Art des im Achter verschlungenen Kreislaufes bey dem Fötus, die Entstehung der Carotiden und Axillararterien in der fortgesetzten Richtung der Aorte vor ihrer Verbogung, die höhere Röthe und Wärme der Haut an den obern Theilen (besonders im Angesicht), die grössere und länger andauernde Reitzbarkeit der Muskeln der obern Extremitäten nach dem Tode, beziehen sich hierauf. Die Brustmuskeln verhalten sich positiv, die Bauchmuskeln negativ. Derselbe Gegensatz findet zwischen den beyden Flächen des Zwergfelles, zwischen seiner obern der Brusthöhle zugekehrten Oberfläche, und seiner untern, oder Bauchhöhlen- Oberfläche statt; was auch durch den Gegensatz der obern und der

Bayerische Staatsbibliothek München

untern diaphragmatiſchen Arterien bezeichnet iſt, da jene vom Bruſtſtücke der Aorte, dieſe von ihrem Bauchſtücke mittelbar oder unmittelbar entſpringen. In der Bauchhöhle nimmt die arterielle Stimmung im Verlaufe der Aorte progreſſiv immer mehr ab, und gegen die Bifuscationsſtelle hin iſt das dynamiſche Uebergewicht ſchon ganz auf der Seite der Hohlvene. Daher entſpringt die Saamenſchlagader hoch oben am Bauchſtück der Aorte, nicht aus deren unterſtem Theile. Eben ſo iſt die Cöliaca unter den für die Unterleibseingeweide beſtimmten Abkömmlingen der Aorte die am meiſten arterielle: die am meiſten venöſe iſt die untere Meſaraiſche. Der Gegenſatz der obern und der untern meſaraiſchen Gefäſse iſt jener des arteriellen und des venöſen.

Im Pfortaderſyſtem, und insbeſondere in den Hämorrhoidalvenen iſt das Uebergewicht der Venoſität über die Arteriellität vollkommen entſchieden, und daher ſind dieſe vorzugsweiſe der Varicoſität unterworfen, da die Hämorrhoidalkrankheit ſelbſt das Beſtreben dieſer Venen iſt, ſecernirende Gefäſse, gleich der Pfortader, zu werden. Die atrabiliären Krankheiten, die Infarctus, welchen die Eingeweide des Unterleibs vorzugsweiſe unterworfen ſind, gründen in der gänzlich depotenzirten arteriellen Stimmung, und in dem fixirten Uebergewicht der Venoſität im Abdominalgefäſseſyſtem. Alle Entzündungen der Unterleibseingeweide haben in der Regel einen mehr venöſen Character: alle Bruſtentzündungen ſind in der Regel arteriell. Nur bey ſehr irritabeln, arteriellen Subjekten, nur

unter dem Verlaufe der Synocha nehmen jene einen arteriellen, nur bey sehr venösen, reproductiv gestimmten Subjekten nehmen diese einen venösen Character, oft nur vorübergehend, an. Die Hämorrhagien der untern Theile haben öfters einen passiven, venösen, jene der obern Theile öfters einen activen, arteriellen, entzündlichen Character. Activ ist in der Regel das Nasenbluten, der Lungenblutfluss: — passiv die Metrorrhagie, der Nierenblutfluss, der Blutfluss aus dem Mastdarme. Häufiger ist die ihrer Natur nach venöse (von dem depotenzirten Magnetismus, der absoluten Cohäsion, vom Uebergewichte des verflüssigenden, Wasserbildenden Principes über das starrmachende tonische Princip — ausgegangene) Wassersucht in der Unterleibshöhle, als in der Brusthöhle; — häufiger die ödematöse Anschwellung der untern Extremitäten, als jene der obern. Oefter ist die Brusthöhlenwassersucht, besonders nach dem Scharlachexanthem, entzündlich, als die Unterleibswassersucht.

§. 451.

Ausser dem Gegensatze der höhern arteriellen oder venösen Stimmung sind die untern Theile ganz den obern gleichgebildet: nur geht die Bildung hier überwiegend von dem Geschlechte, dort von dem Individuum, oder von der Krone der Individualität, dem Gehirne aus. Ein Darm (der Oesophagus) steigt von oben abwärts, erweitert sich zum Magen, und endet in häufigen Circumvolutionen: — ein anderer bildet sich vom After anhebend aufwärts,

erweitert ſich Magen - ähnlich im Blinddarme, bildet ſeinen Darm - ähnlichen Wurmfortſatz und vereint ſich nur zufällig mit dem abſteigenden, oder Dünndarme. Der Dünndarm aber verhält ſich zu dem Dickdarme wie arterielles zu venöſem. Dem arteriellen Reſpirationsſyſtem der obern Theile entgegen bildet ſich das venöſe Harnſyſtem der untern, welches das Lungenſyſtem des Geſchlechtsmenſchen iſt. Den Halswirbelbeinen entſprechen in ihrer Bildung die entgegenſtehenden Lendenwirbelbeine, der Bildung des Kopfes die Bildung des Beckens, und die Fortſetzung der Beckenwirbelbeine in den Schwanz; daher, wenn der Kopf, in ihm das Gehirn und die Sinnesorgane ſich höher ausbilden, mehr individualiſiren ſollen, der Schwanz zuerſt der Länge nach beſchränkt, alsdann abgeworfen werden muſs.

§. 452.

Die obern Extremitäten zeigen ein Uebergewicht von arterieller Polarität, die untern von venöſer. Das Verhältniſs der Arterien zu den Venen iſt an jenen weit gröſſer, als an dieſen: eben ſo das Verhältniſs der Gefäſse überhaupt zu dem Volumen des Gliedes. Dieſs wird auch beſonders am Vorderarme und Unterſchenkel durch das Verhältniſs der Radial- und Cubitalarterien und der beyden Zwiſchenknochenarterien zu der vordern und hintern Schienbein- und zu der Schienbeinröhrenſchlagader, welche insgeſamt ſehr klein und unbedeutend ſind, beſonders in Beziehung auf die Maſſe der Extremitäten beſtättigt. Dagegen präponderiren die

Venen am Unterſchenkel nicht nur ihrer abſoluten, ſondern auch ihrer relativen Gröſse nach.

§. 453.

Dieſer Gegenſatz der obern und der untern Theile iſt nicht bloſs im Ganzen geltend, ſondern er wiederholt ſich auch an den einzelnen Theilen wieder immer auf dieſelbe Weiſe. So am Haupte verhält ſich die gröſste Hervorragung der Stirngegend poſitiv zu der Hervorragung des Kinnes, — ſo die Oberbauchsgegend poſitiv zu der Unterbauchsgegend; — die Nabelgegend, da von ihr die ganze dychotomiſche, nur der Richtungspolarität nach verſchiedene, Bildung des Fötus ausgeht, hat ihre Polarität in ſich ſelbſt, nach oben ſtrahlt die arterielle, nach unten die venöſe herein. An den Extremitäten verhalten ſich die Polaritäten nicht auf einerley Weiſe: und ſehr tiefſinnig ſind auch in dieſer Beziehung die längſt gewählten Wortbezeichnungen. Am Arme iſt das Verhältniſs des Vorderarmes zum Oberarme, jenes der vordern Seite zur hintern am Schenkel, das Verhältniſs des Unterſchenkels zum Oberſchenkel, jenes der untern Theile zu den obern: das Uebergewicht der arteriellen Polarität iſt am Vorderarme noch gröſſer als am Oberarme: das Gegentheilige aber findet im Verhältniſs des Unterſchenkels zum Oberſchenkel ſtatt.

Die meiſten der hier angegebenen Gegenſätze ſind auch ſchon durch die Verſuche von Campetti beſtättigt. — Alles angegebene aber iſt nur von dem Manne zu verſtehen, und das umgekehrte gilt

überall von dem Weibe: dort ist die untere Hälfte, die hintere Seite etc. positiv. Nur bey dem sehr männlichen Manne und bey dem sehr weiblichen Weibe treten die Pole bestimmt auf diese Weise, und in dieser Ordnung hervor. Bey dem weiblichen Manne, und bey dem männlichen Weibe ist der Gegensatz weniger bestimmt.

§. 454.

Die rechte Körperhälfte ist die arterielle, die linke ist die venöse: denn der thierische Leib besteht aus zwey aneinander stoſsenden Cylindern, welche im Gegensatze gegeneinander gebildet sind. Die Medianlinie drückt die Indifferenz beyder aus: in ihr flieſsen daher die entgegengesetzten Bildungen beyder Körperhälften in Eins zusammen: alle Differenzen und besondere Bildungen gehen in ihr unter: — kein Gefäſs, kein Nerve durchdringt die Medianlinie. Die unpaarigen Muskeln ausgenommen, ist kein anderer unter der Medianlinie befindlich. Die Haut liegt genau in der Mitte an den meisten Stellen unmittelbar auf den Knochen oder sehnigen Fasern. — Der Dualismus der beyden Körperhälften ist in den untern Thierklassen weniger deutlich; er tritt erst gleichzeitig mit dem Gegensatz der Nerven und Muskelfasern bestimmter hervor. Der Anfang aller Miſsbildung ist immer die Aufhebung der Continuität in der Medianlinie. So entsteht die Hasenscharte, der Wolfsrachen, die klaffende Spalte in den Integumenten und zwischen den Muskeln des Unterleibs, durch welche z. B. die Harnblase umgestülpt ist, die Spina bifida, die

Theilung des Scrotums in der Raphe bey dem Hermaphrodismus — der Hypoſpadias. Die Arterien der rechten Körperhälfte ſind nun in der Regel von gröſſerem Caliber; und an der linken Seite iſt die relative Gröſse der Venen bedeutender. Die unbenannte Arterie entſpringt zuerſt aus der Aorte, früher als die Carotis oder die Unterſchlüſſelbeinarterie der linken Seite. Jene liegt mehr, als eine von dieſen, in der fortgeſetzten Richtung der Aorte. Eben ſo zeigt ſich dieſs an den Arterien der Extremitäten. Die rechte Schlüſſelbeinarterie iſt ſtärker als die linke, eben ſo die Brachialarterie und ihre Aeſte. Der Pulsſchlag an der rechten Hand iſt ſtärker als an der linken. Die rechte Lunge iſt gröſſer, eben ſo die rechte Niere. — Die Muskelſtärke iſt auf der rechten Seite gröſſer; dieſs iſt nicht das Werk der Gewohnheit.

Dagegen iſt der linke Querblutbehälter in der harten Hirnhaut häufig weiter als der rechte; eben ſo die linke Droſſelader.

§. 455.

Alle Krankheiten, Entzündungen, Rheumatismen, Hautausſchläge, wenn ſie ſich mehr auf der rechten Seite äuſſern, haben mehr einen arteriellen, und im entgegengeſetzten Falle einen mehr venöſen Character; unter den paarigen Organen iſt immer das Linke das ſchwächere, weniger irritable.

Die Catarakt iſt häufiger, und entſteht in der Regel früher am linken Auge; — eben ſo das Glaucom, und einige Arten von Amauroſe; die linke Lunge iſt am öfterſten der Vereiterung unterwor-

ſen, eben ſo die linke Niere. Häufiger iſt die Bruſtwaſſerſucht der linken Höhle. — Häufiger ſind die Hernien der linken Seite; häufiger Fuſsgeſchwüre, varicöſe Erweiterungen der Venen an der linken untern Extremität.

§. 456.

Die vordere Hälfte des Körpers iſt in jeder Beziehung die edlere, arterielle; die hintere iſt die venöſe.

In dieſer Beziehung bildet die Afteröffnung einen Gegenſatz gegen die Mundöffnung: — in dieſer Beziehung die Hinterbacken mit ihrer Muskel- und Fettmaſſe gegen die Brüſte.

Derſelbe Gegenſatz findet ſich auch zwiſchen dem vordern und dem hintern Gehirnlappen, zwiſchen Vorderhaupt und Hinterhaupt, zwiſchen Carotis und Vertebralarterie, deren erſte die arterielle, jene die venöſe Arterie des Gehirnes iſt. — Eben ſo verhält ſich die hintere Seite der Choroidea zur vordern. — Die hintern Theile der Lungen ſind mehr venös. In ſchlauchartig gebildeten Eingeweiden, als Maſtdarm, Urinblaſe, Scheide, Uterus, zeigt immer die hintere Wandung ein Uebergewicht von venöſer Gefäſsepolarität.

Gattung II.

Respiration.

XIX. Kapitel.

§. 457.

Das thierische Leben ist ein langsamer Consumtions- und Verbrennungsprozess. Das organische Wesen, da der Grund seines Seyns in der ewigen Materie, und in deren zweyfachem Lebenskeime liegt, ist eben dadurch abhängig vom Organismus des Ganzen, und es hängt zusammen mit den andern Dingen; mit der Erde von der Einen und mit der Luft von der andern Seite, durch seinen Ursprung mit dem Wasser, aus welchem es gebohren, und lebendig hervorgegangen ist. Die Alimentation, welche eine Aufnahme von combustibeln Stoffen ist, setzt den Thierleib in Raport mit der Erde: und alles, was irdisch ist in ihm, ist eine Folge der Alimentation: — das Athemholen aber ist der Prozess des Thierleibes mit der Atmosphäre. So wie alles Leben, in den ersten Lebensregungen der organischen Natur, und alles elementarische Feuer, aus der Luft stammt; so tritt diese auch stetig wieder zu allem Lebenden hinzu, und durchdringt dasselbe in seinem Innersten. Was überirdisch ist, und himmlisch in dem thierischen Leben, das kömmt aus der Luft, und so wie überall im sichtbaren Universum das Licht das Potenzirende der

Materie, und jede neue Entfaltung und Verwandlung derſelben die Folge einer neuen Durchdringung des Lichtes iſt; ſo iſt die Reſpiration das Potenzirende in der ganzen Thierreihe, jede Metamorphoſe iſt durch dieſe beſtimmt, und durch eine Verwandlung des Reſpirationsſyſtems angekündigt. Jedem Thiere wird daher ſeine Stelle in der Thierreihe durch den eigenthümlichen Grad der Entwickelung ſeines Reſpirationsſyſtemes beſtimmt.

§. 458.

Die Reſpiration iſt eine Verzehrung des Irdiſchen durch das Himmliſche: ſo wie alle Verbrennung nur eine Läuterung und Verklärung des beſondern Seyns an den Dingen iſt. Denn alle Verbrennung iſt nur möglich durch den Prozeſs des irdiſchen Dinges mit der Atmoſphäre. Der Inbegriff des Gemeinſamen, und der idealen Beziehungen aller irdiſchen Dinge iſt die Atmoſphäre, — der Geiſt, das Pneuma, welches ober der Erde ſchwebt, und das Medium, wodurch die irdiſchen Dinge unter ſich, und die Erde mit andern Himmelskörpern Gemeinſchaft pflegen. Den Planeten wird der Sonneneinfluſs durch ihre Atmoſphäre zugeleitet. Wie das Starre aus dem Waſſer durch die Selbſtbejahung der Schwere in ihm ſich bildet, ſo bildet ſich aus dem Waſſer durch den Einfluſs des Lichtes und der Wärme die Luft.

§. 459.

Die Reſpiration iſt von daher die Eine Hälfte des thieriſchen Lebens. Die Luft dringt nicht bloſs in die Lungen ein: ſie iſt als ſolche in jedem Punkt

des thierischen Leibes gegenwärtig. Alle Thiere athmen durch Tracheen, und die Arterien aller Thiere sind, wie es das alte Wort sagt, wirklich nur Luftgefäſse. Die Dephlogisticirung des phlogistischen Blutes geschieht nur für den kleinsten Theil in den Lungen. Der Sauerstoff tritt als Aura oxygenea im Blute hervor, und die wirkliche Verbrennung der combustibeln Stoffe des Blutes ist durch die ganze Gefäſselinie vertheilt, — sie geht besonders im Capillargefäſsesystem der Organe vor sich, wo jene zu Oxyden werden, und zur Ernährung der Organe und zu den verschiedenen Absonderungen dienen. Das am vollkommensten verbrannte aber sind die Knochen, in welchen die phosphorsaure Kalkerde als ein Produkt eines Säurungsprozesses erscheint, welcher offenbar von dem Athemholen abhängig ist, da, je älter der Mensch wird, je länger er athmete, um so mehr die Quantität der Knochenerde und der Oxyde überhaupt zunimmt.

§. 460.

Die erste Einwirkung der Atmosphäre auf den thierischen Leib ist jene durch den Druck, mit welchem die Luft ihm aufliegt. Jedes Thier ist in ein gröberes oder feineres Medium eingetaucht, und bewegt sich in diesem nur insoferne, als es die dasselbe umgebende elastische oder tropfbare Flüssigkeit verschiebt. Die Thiere sind daher verschieden nach dem Medium, in welchem sie leben, ob im Wasser, ob in die untersten, oder in die obersten Schichten der Atmosphäre eingetaucht. — Bey einerley Beschaffenheit des Mediums aber ist der

Atmoſphärendruck, welchen irgend ein Thier erleidet, um ſo gröſſer; je ausgedehnter ſeine körperliche Oberfläche iſt. Wird nun der Oberflächeninhalt eines Menſchen von mittlerer Gröſse auf 15 - 16 Quadratſchuhe beſtimmt, ſo ergiebt ſich, daſs ein ſolcher Menſch ein Gewicht von 36000 Pfund auf ſich trage.

§. 461.

Die Wirkung des Atmoſphärendruckes iſt aber nicht bloſs eine mechaniſche, ſondern eine dynamiſche. Denn der beſtimmte Zuſtand, in welchem ſich alle irdiſche Körper befinden, ſey es Starrheit, tropfbare oder elaſtiſche Flüſſigkeit, — iſt ein Reſultat des Druckes der Atmoſphäre; eben ſo ſind alle chemiſchen Verwandtſchaften, und die Grade derſelben zunächſt nur durch dieſen beſtimmt. Bey verändertem Grade des Atmoſpährendruckes verändert ſich auch der Zuſtand aller körperlichen Dinge. Wird der Druck vermindert, ſo zerflieſsen manche ſtarre Körper, flüſſige verdampfen: es entbinden ſich Gaſsarten, — das Waſſer kocht ohne 80 Grade erhöhter Temperatur: viele Stoffe verlaſſen ihre chemiſchen Verbindungen mit andern Stoffen; und wieder andere zeigen Verwandtſchaft mit ſolchen Körpern, gegen welche ſie bey gewöhnlichem Atmoſphärendrucke ſich indifferent verhalten.

§. 462.

Bey Reiſenden, welche ſich auf Bergen mehrere 1000 Toiſen über die Meeresoberfläche erheben, (Alexander Humboldt) wird der Puls beſchleunigt, die Reſpiration laborios, keichend; ſie em-

pfinden allgemeines Uebelseyn, mit äusserster Entkräftung, es treten Haemorrhagien, besonders an solchen Hautstellen, ein, welche eine dünnere Epidermis besitzen, als an dem Zahnfleisch, an den Fingerspitzen, an der Eichel des männlichen Gliedes. Jedoch sind diese Erscheinungen nicht einzig dem verminderten Druck der Atmosphäre; sondern mehreren anderen Umständen, als der geringeren Quantität von Gassoxygen in gleichen Theilen der mehr verdünnten Bergluft, der Anstrengung bey dem Bergsteigen u. dgl. zuzuschreiben. Der letztere Umstand ist von solcher Wichtigkeit, dass bey ärostatischen Ascensionen, wobey der Luftschiffer sich ruhig in seinem Schiffe befindet, jene Erscheinungen entweder gar nicht, oder in ungleich geringerem Grade bey gleicher Höhe über der Meeresoberfläche, als auf Bergreisen eintreten. Dasselbe gilt auch von dem Unterschiede der Körperconstitution der Gebirgsbewohner von jener der Einwohner der Thäler und Ebenen.

§. 463.

Der Atmosphärendruck ist aber nur die negative Einwirkung der Atmosphäre auf irdische Dinge. Denn dieser Druck ist überhaupt noch eine Folge des der Atmosphäre einwohnenden Irdischen der in ihr nicht ganz ausgetilgten Schwere. Je mehr luftig und je weniger irdisch, d. h. je mehr elastisch und ausgedehnt (durch Wärme) sie ist, desto geringer ist der Atmosphärendruck.

Auch in dem Thierleibe ist die ihm eigenthümliche irritable Stimmung, und das bestehende Ver-

hältnifs der flüſſigen zu den ſtarren Theilen lediglich ein Reſultat des beſtimmten Atmoſphärendrucks. Denn alle beſtimmte Cohäſionsverhältniſſe an irdiſchen Dingen ſind nur geltend bey einem beſtimmten Atmoſphärendrucke. Daher iſt jeder barometriſchen Veränderung der Atmoſphäre eine Cohäſionsveränderung des thieriſchen Organismus gleichzeitig; — ſo wie alle Krankheiten der Irritabilität zunächſt immer von Veränderungen der Atmoſphäre, in thermometriſcher, barometriſcher, hygrometriſcher und anderer Rückſicht, ausgehen, und ſomit von der Witterungs- und Jahresconſtitution etc. abhängig ſind.

§. 464.

Wenn der Atmoſphärendruck bloſs partiell an einer beſtimmten Hautſtelle aufgehoben wird, ſo entſtehen hieraus diejenigen Erſcheinungen, welche man an geſchröpften Hautſtellen beobachtet. Denn der thieriſche Körper vermag bey der geringen Convexität ſeiner Oberfläche dem groſsen Gewichte der atmoſphäriſchen Luft nur inſoferne zu widerſtehen, als der Druck deſſelben nach allen Seiten gleichmäſsig iſt: und ſomit durch gleichmäſsigen Druck auf ſich entgegengeſetzte Seitenflächen ein Gleichgewicht entſtehet. Wenn nun der Druck an einer beſtimmten Hautſtelle entweder ganz aufgehoben, oder beträchtlich vermindert, ſomit der Widerſtand gegen den Andrang des Blutes und anderer Säfte nach dieſer Seite hin aufgehoben iſt, entſteht nothwendig vermehrter Andrang und Congeſtion nach einer ſolchen Hautſtelle, welche zuweilen bis zur Berſtung der Integumente ſteigt. Die

Wirkung der Atmoſphäre im bewegten Zuſtande, als Wind, Zugluft etc. iſt eben ſo nicht bloſs mechaniſch, nach der Heftigkeit des Anſtoſses, oder der Wärmeentziehung, zu ermeſſen: ſondern die Winde ſind dynamiſche Influenzen auf den Organismus, und rufen in dieſem die ihnen entſprechende Oſt- Weſt- Süd- oder Nordpolarität hervor. So afficirt der Nordwind den Contractionspol, der Südwind den Expanſivpol der abſoluten Cohäſion: ſo der Oſtwind den Contractivpol, der Weſtwind den Expanſivpol der relativen Cohäſion. Der Nordoſtwind ruft überhaupt die Contraction hervor, erzeugt die entzündliche Diatheſe, und begünſtiget die Neigung der Säfte zur Gerinnung: — der Südweſtwind potenzirt die Expanſion, bringt Neigung zur Auflöſung der Säfte und Fäulniſs hervor. Wie in der Atmoſphäre der Erde das Gleichgewicht der Polarthätigkeiten geſtört und aufgehoben wird, worauf die Entſtehung der Winde beruht (denn der Nordwind iſt das Zeichen der Vorherrſchaft der Nordpolarität in der Atmoſphäre), alſo und auf dieſelbe Weiſe wird es auch im thieriſchen Organismus geſtört.

§. 465.

So wie kein Element das andere ausſchlieſst, ſondern alle wechſelweiſe ineinander aufgenommen werden, ſo wie von daher das Waſſer mit Luft geſchwängert iſt, und den Thieren, welche im Waſſer leben, die Luft zuführt; ſo löst die Luft das Waſſer auf, und führt dieſs Element des Lebens denjenigen Thieren, welche in der Luft le-

ben, zu. Das Waſſer wird aber auf zweyfache Weiſe von der Luft aufgenommen, einmal auf ſolche Weiſe, daſs es das Hygrometer afficirt, als freyer Waſſerdunſt, und dann wirklich aufgelöst, und latent. Jede Gaſsart aber hat vermöge ihrer beſondern Natur, und vermöge des Grades ihrer Expanſion durch Wärme eine eigenthümliche Capacität, und diſſolvirende Eigenſchaft für Waſſerdünſte. Unter allen Gaſsarten löst das Sauerſtoffgaſs die gröſste, das Kohlenſauergaſs aber die geringſte Quantität von Waſſerdünſten auf. Auch haben die erwärmten Gaſsarten mehr hygrometriſche Capacität als die erkälteten.

§. 466.

Die weſentlichen Beſtandtheile der atmoſphäriſchen Luft ſind Sauerſtoffgaſs und Stickgaſs, das erſte in einem Verhältniſs zu dem letztern wie 0,27: 0,72. Auſſerdem iſt gewöhnlich noch 0,01, kohlenſaures Gaſs aber wohl nur als Produkt der Verbrennung irdiſcher Körper, mittelſt des Sauerſtoffgaſses der atmoſphäriſchen Luft, dieſer ſelbſt beygemiſcht. Das eigentlich-Luftige in der Atmoſphäre iſt das Stickgaſs, darum auch in gröſster und in unveränderlicher Quantität in ihr zugegen. Das Stickgaſs iſt die innerlichſte Seite der atmoſphäriſchen Luft, wodurch dieſe in ſich beſteht; das Sauerſtoffgaſs iſt jene Seite der Atmoſphäre, welche den irdiſchen Körpern zugekehrt iſt, wodurch ſie, als Feuerſeele ſie verzehrend, das Irdiſche läuternd, und die Cohäſion aufhebend (in der Verkalkung der Metalle), auf ſie einwirkt. Jenes Verhältniſs der

der verschiedenen Gasarten ist in der atmosphärischen Luft aber nicht constant. Man trift zwar beynahe immer dieselbe quantitative Menge von Stickgass in derselben an: aber die Quantität des Sauerstoffgasses ist ziemlich veränderlich: und je mehr diese vermindert wird, desto mehr nimmt die Quantität des kohlensauern Gasses zu: eine Luft, welche 0,20 Theile Gassoxygen enthält, ist noch ziemlich respirabel: und selbst eine Luft mit 0,07 nicht geradezu mephitisch. Aber die Respiration wird hier laborios, keichend, und es trit sehr bald Asphyxie ein, weit früher, als aller Vorrath von Gassoxygen consummirt ist; so dass der asphyctische Zustand hier nicht lediglich der Entziehung des Gassoxygen, sondern auch dem positiv schädlichen, mephitischen Einflusse des kohlensauern Gasses zugeschrieben werden muss.

§. 467.

Ueberhaupt läst sich die relative Quantität des Gassoxygen, welche erfordert wird, damit ein Gassgemenge respirabel sey, nicht absolut bestimmen: sie ist für verschiedene Individuen und für dasselbe Individuum in verschiedenen Zeitmomenten eine verschiedene. So z. B. stirbt in einem gleich oxydirten Gassgemenge von gleichem Volumen ein Vogel früher, als eine Amphybie; die verschiedene Gattungen von Insekten sterben unter denselben Umständen zu ungleichen Zeiten. — Nach der Mahlzeit, besonders nach häufigem Genusse von Fleischspeisen, und geistigem Getränke consummirt

derſelbe Menſch eine ungleich gröſſere Quantität von Sauerſtoffgaſs in derſelben Zeit, als nach langem Hunger, oder nach einer Sättigung mit vegetabiliſcher Koſt und mit Waſſer. Wahrſcheinlich iſt auch die Quantität von Sauerſtoffgaſs, welche bey verſchiedenen Krankheiten innerhalb einer gegebenen Zeit durch die Reſpiration conſummirt wird, eine verſchiedene: z. B. ſie iſt gröſſer bey inflammatoriſchen Krankheiten: kleiner bey dem Scorbute etc. Nicht allein aus dieſem Grunde hat die Eudiometrie noch immer kein zuverläſſiges Reſultat über die Salubrität einer beſtimmten Luft geliefert: ſondern auch aus mehreren andern zugleich. Erſtens giebt es noch kein zuverläſſiges, und vollkommen correktes eudiometriſches Mittel für alle Gaſsgemenge: — zweytens beruht die Salubrität eines Gaſsgemenges nicht allein auf der Quantität des darin gegenwärtigen Gaſsoxygen, welche in der verdorbenſten Krankenzimmerluft beynahe dieſelbe iſt, wie auf offenen Plätzen, und auf den Alpen wenig verſchieden von der Sumpfluft: — ſondern beſonders auf der Reinheit derſelben von zufällig beygemiſchten ſchädlichen Stoffen, als contagiöſen, miasmatiſchen Effluvien etc.

§. 468.

Auch iſt nicht gerade die am meiſten oxydirte Luft die geſündeſte für alle Menſchen. Lungenſüchtigen bekömmt ein an Sauerſtoffluft weniger reiches Gaſsgemenge weit beſſer; daher ſie ſich nicht nur bey dem Aufenthalte in tieferen Thälern, in ſumpfigen Gegenden, Viehſtällen etc. weit beſſer, als

in der reineren Bergluft oder in gelüfteten Zimmern befinden; sondern auch unter den verschiedenen Gasarten, welche man bey der Lungensucht einathmen zu lassen versuchte, bekam keine den damit Behafteten so wohl, als ein Gasgemenge mit häufigem Wasserstoffgas etc.

§. 469.

Die Insekten sind unter den skeletlosen Thieren die am meisten irritabeln, so wie die Vögel unter den höhern Thieren. Daher ist auch ihre Respiration die ausgedehnteste: und so wie die Luft die hohlen Knochen der Vögel, ihr Gefieder und das schwammige Gewebe anderer Theile durchdringt, so ist der ganze Leib des Insektes mit Tracheen durchzogen. Nicht nur das ganze Insekt ist Lichtsinn, ist ein Personnificat des Lichtsinnes; sondern auch das ganze Insekt ist Respirationssystem. Damit stimmt die Ausgedehntheit und Kräftigkeit seiner willkührlichen Bewegung überein. Aber auch bey den übrigen Thieren, höhern und niedern, sind die Arterien wahre Tracheen, Luftcanäle: das arterielle Blut ist nur das Vehikel des Sauerstoffgases zu den Organen hin; diess gelangt als solches und unerloschen zu den Organen. Die Tracheen der Insekte besitzen drey Häute gleich den Arterien, und die mittlere, dort muskulöse, ist mit einem elastischen, Spiral-förmig gewundenen Faden versehen. — Die erste Anlage zur Bildung der Kiemen kömmt schon bey den Insekten in den Larven der Demoisellen vor; bey welchen die Stigmata als klei-

ne Röhrchen, in zehn Reihen geordnet, fünf gefiederte Blätter in dem Rectum bilden. Wirklich gebildete mit arteriellen und venösen Gefäfsen durchzogene Kiemen entstehen zuerst bey den Würmern mit rothem Blute, obgleich ihre Bildung auch hier noch problematisch bleibt, so wie diese auch ohne Herz sind. Bey den Schaalthieren sind die Kiemen sehr voluminös, aber meistens nach aussen zurückgedrängt, nicht in eine Cavität gesammelt; bey den Mollusken kommen Lungen, äussere, und nach innen zurückgedrängte Kiemen zugleich vor: ihr Respirationssystem ist gleich vollkommen entwickelt, wie ihre Organe des Kreislaufes. — Bey den Fischen wiederholt sich in Beziehung auf die Respiration nur, was früher schon gebildet war; sie athmen noch immer durch Kiemen.

Die Fische aber besitzen die vollkommenste Kiemenrespiration. Mehrere Muskeln dienen, die Kiemen auseinander zu ziehen, oder die Bogen der Kiemen zu eröffnen, diese zu schliefsen, die Bogen einander zu nähern, den knöchernen oder knorplichen Deckel derselben aufzuziehen, oder zu schliessen. Die erste wahre Lunge trit hervor: obgleich noch membranös und blasig, in der Classe der Amphibien. Dafs die Amphibien Respirationsthiere seyen, d. h. dieselbe dynamische Entwickelungsstufe in der Metamorphose des Thierreichs repräsentiren, welche in der Metamorphose des menschlichen Organismus die Lungen, ergiebt sich besonders daraus, dafs gleichzeitig mit ihrer Verwandlung, wo sie erst Amphibien werden, die Kiemenrespiration aufhört, und die Lungenrespiration hervortrit. Ihre blasi-

ge Lunge besitzt auch einen weit höhern Grad von Irritabilität als jene der Vögel und Säugethiere; ihre eignen Zusammenziehungen sind ungleich deutlicher und selbstständiger als in den höhern Thieren. Willkührlich verschlucken sie die Luft, so wie die höhern Thiere die verkäuten Nahrungsmittel; indem sie die Mundhöhle schliessen, die Kehle erweitern, und so einen leeren Raum hervorbringen, in welchem die äussere Luft eindringt: im zweyten Momente dieser Luftverschluckung ziehen sie die Kehle zusammen, indem sie die hintern Nasenöffnungen und zugleich den Eingang zum Pharynx verschliessen; die Amphibien halten die Luft längere Zeit und unerneut in ihren blasigen Lungen zurück, so wie die Magenverdauung der Nahrungsstoffe längere Zeit andauert. Zuletzt contrahirt sich der Lungenbeutel über das Residuum von jener Luftverdauung, und stösst dasselbe durch eine Art von Erbrechen eben so aus, wie die Harnblase sich über den in ihr enthaltenen Urin zusammenzieht, und diesen durch Contraction ihres muskulösen Gewebes ausstösst. Nur auf dieselbe Weise, wie bey dem Menschen und den Säugethieren das Zwergfell und die Bauchmuskeln zur Entleerung der Urinblase, des Fruchthälters, und des Mastdarmes mitwirken, tragen die Bauchmuskeln bey den Amphibien zur Austreibung der Luft bey. Inspiration und Exspiration werden in dieser Thierclasse vorzüglich durch die Irritabilität der Lungen selbst bewirkt, die Bewegungen dieses Eingeweides sind hier weit selbstständiger. Sie besitzen kein Zwergfell, bey einigen sind die Rippen unbeweglich, und aneinander ge-

wachſen; einige entbehren der Rippen gänzlich, und bey andern ſind ſie ſo kurz und ſo wenig beweglich, daſs ſie nichts zur Reſpiration beytragen können. — Nichts beſchränkt die Entwickelung der Lungen bey den Amphibien: ſie bilden auch meiſtens ovale Säcke, welche ſich längs des Rückens bis in die Beckenhöhle erſtrecken. Bey den höhern Thieren iſt die Inſpiration und Exſpiration nicht mehr eigentliche ſelbſtſtändige Bewegung der Lunge. Höhere Syſteme, jenes der Muskelbewegung, greifen auf bedeutende Weiſe in den Reſpirationsprozeſs ein, und beherrſchen das Ein- und Ausathmen.

Bey den Vögeln iſt das Lungenſyſtem zu dem gröſsten Umfange ausgedehnt. Die Bruſthöhle iſt nicht nur auf Koſten der Bauchhöhle vergröſſert, ſondern die Lungen ſetzen ſich auch noch in dieſer fort. Ihre Lungen ſind ganz luftzellig, und das eigentliche Zellengewebe iſt aus der Bildung derſelben beynahe ganz verdrängt. Die Luftzellen ſind daher ſehr groſs. Die Theilung der Bronchien geht nicht ſo weit, als bey den Säugethieren. Mehrere ihrer gröſſern Aeſte öffnen ſich an der Oberfläche der Lunge, welche von daher ſiebförmig durchlöchert iſt; dort dringt die Luft in mehrere gröſſere Zellen; und die Luftzellen erſtrecken ſich von den obern Theilen der Bruſthöhle bis zu den Beckenknochen herab. Aehnliche Zellen bilden ſich um den Magen, um die Leber, um den Darmcanal und das Herz, um den untern Theil der Luftröhre, um den untern Larynx, um die gröſſern Gefäſse: — die Luftzellen verbreiten ſich in den Zwiſchenräu-

men der Muskeln, und dringen in die Röhren der hohlen Knochen ein. Da diese Luftzellen alle in einander offen stehen, so gelangt mittelst ihrer die Luft in alle Theile des Körpers. Endlich ist das vollkommenste Gleichgewicht zwischen Verdauung und Respiration, zwischen Bauch- und Brusthöhle in der Classe der Säugethiere.

§. 470.

Die Respiration ist eine Synthesis zweyer antagonistischer Functionen, der Inspiration und Exspiration. Beyder rhythmisches Verhältniss ist dem allgemeinen Gesetze des Antagonismus der Extension und Flexion untergeordnet. Bey dem Menschen, bey den andern Säugethieren und Vögeln folgt auf jede Exspiration in einem kurzen Zwischenraume eine neue Inspiration. Bey andern Thieren hingegen, bey welchen die Lungengefässe nicht ein eigenthümliches Gefässesystem für sich darstellen, sondern der allgemeinen Gefässebildung des Aorten- und Hohladernsystemes als Aeste und Zweige untergeordnet sind, kann die Respiration zuweilen ohne asphyctischem Zustande, selbst auf längere Zeit, unterbrochen werden. Gewöhnlich wird angenommen, dass die Kräfte, welche die Inspiration bewirken, ganz ausserhalb der Lungen liegen. Da die äussere Oberfläche dieser Organe der innern Oberfläche der Brusthöhle überall genau anliegt, und kein freyer Zwischenraum zwischen beyden übrig bleibt, so werden die Lungen in ihrem blasigen Parenchyma bey der Erhebung der Wandungen des Thorax durch die von aussen durch die Aspera arteria

in ſie eindringende Luft, wie man gewöhnlich glaubt, nach dem Geſetze des aufgehobenen Gleichgewichtes elaſtiſcher Flüſſigkeiten, ausgedehnt. Mayer hat ſogar den Reſpirationsapparat einem Blasbalge verglichen, in deſſen Höhle ſich die Lungen, wie eine leere Blaſe, befänden, welche mit dem Ventil des Blasbalges eine gemeinſchaftliche Oeffnung habe. Die Lunge kann auch in den höhern Thierclaſſen bey der Inſpiration eben ſo wenig als bey der Exſpiration als unthätig angenommen werden: die ſynchroniſchen Bewegungen des Thorax und der Lungen ſind nur aus einer präſtabilirten Harmonie, durch die Verkettung der ſich entſprechenden Actionen beyder Organe zur höhern Einheit einer gemeinſamen Function — erklärbar.

§. 471.

Der Gegenſatz der Inſpiration und der Exſpiration iſt zuerſt eine Wiederholung des Gegenſatzes der arteriellen und der venöſen Gefäſsebewegung. Die Inſpiration giebt der arteriellen Gefäſsethätigkeit das Uebergewicht: durch sie werden alle Polaritäten im thieriſchen Organismus umgeändert, wie deutlich aus den Verſuchen von Campetti erhellet. Ihre Wirkung iſt gleich jener des negativen Metalles. Von daher iſt auch die Inſpiration gleich einer allgemeinen Streckung des Thorax in allen Gelenkverbindungen der ihn bildenden Knochen: die Exſpiration aber iſt gleich einer allgemeinen Beugung derſelben. Streckung und Beugung folgen ſich daher in den Bewegungen des Thorax nach demſelben Rhythmus, wie Syſtole

und Diaſtole in den Gefäſsen: und Streckung und Beugung ſind beyde nur die zertrennten Hälften einer Kreisbewegung.

§. 472.

Die Bruſthöhle iſt nicht, ſo wie die Schädelhöhle, nach allen Seiten hin durch Knochenwandungen geſchloſſen; ſondern die Wände der Bruſthöhle ſtellen eine Aneinanderreihung von Knochen, Knorpeln, Bändern, und Muskellagen dar. Der feſte Punkt, das Hypomochlion und das Centrum der Bewegung, iſt der Stamm der Wirbelbeinsäule, von welcher die Rippen blattförmig ausgehen; und daher einer Auf- und Zublätterung fähig ſind. In den Rippen nimmt die Beweglichkeit von hinten nach vornen zu, und vorne, wo ſie im ausdehnbaren Knorpel enden, und mit den beweglichen Bruſtbeinen articuliren, ſind ſie am freyeſten nach allen Richtungen beweglich. Eben ſo nimmt die Beweglichkeit der Rippen von oben nach unten progreſſiv zu, und die untern Intercoſtalräume ſind gröſſerer Erweiterung fähig, als die obern, beſonders da die oberſte Rippe durchaus befeſtiget iſt, und bey der Bewegung des Thorax nach oben eben ſo als feſter Punkt dient. wie die Darmbeinränder und der Schambeinb gen bey der Bewegung nach unten. Die Rippen ſind alſo beweglich von hinten nach vorne, von oben nach unten, und wieder von unten nach oben, alſo zwiſchen drey feſten Punkten, der Spine, den Darmbeinen und der erſten Rippe, den Schlüſſelbeinen, dem Schulterblatt, und dem Oberarme.

§. 473.

Die Bewegung des Thorax bey der Reſpiration muſs nun unterſchieden werden, in die Geſamtbewegung deſſelben, und in die Bewegung der einzelnen Beſtandſtücke ſeiner Wände. Jeder dieſer Bewegung dienen eigenthümliche Muskeln.

§. 474.

Bey der Inſpiration geſchieht die Geſamtbewegung des Thorax von unten nach oben, bey der Exſpiration von oben nach unten. Auſſerdem werden bey der Inſpiration auch der Durchmeſſer der Bruſthöhle von hinten nach vorne und die Querdurchmeſſer derſelben vergröſſert, bey der Exſpiration aber werden beyde verkürzt. Bey dem männlichen Geſchlechte iſt die Vergröſſerung des verticalen Durchmeſſers überwiegend über jene der horizontalen und transverſalen: bey dem weiblichen iſt während des Einathmens die Vergröſſerung der beyden letzten über jene der erſten überwiegend. Daher iſt auch überhaupt der longitudinale Durchmeſſer am männlichen Thorax gröſſer, im weiblichen der transverſale. Der Bruſtkaſten des Weibes iſt nicht nur ſeiner abſoluten Gröſse nach, ſondern auch verhältniſsmäſsig zu Kopf und Unterleib betrachtet, kleiner als jener des Mannes.

§. 475.

In den mehr länglichen Formen, und in der gröſſern Schärfe der Umriſſe, welche dem männlichen Geſchlechte eigenthümlich ſind, und in der gröſſern Rundung und Verſchmelzung der Formen

am weiblichen Körper, wo alles ſich nach der Breite auszudehnen beſtrebt iſt, gründet auch dieſer Unterſchied in der Bildung des Thorax.

§. 476.

Am Bruſtkaſten wiederholt ſich aber jeder Gegenſatz des Thierleibes überhaupt in beſonderer conkreter Darſtellung. Der obere, oder Schlüſſelbeintheil bildet einen Gegenſatz gegen den untern oder Unterleibstheil, — die äuſſere gegen die innere Fläche, die vordere gegen die hintere Seite. Nur aus dieſen verſchiedenen Verhältniſſen der einzelnen Regionen am Thorax iſt die Eigenthümlichkeit der Bewegungen deſſelben zu erkennen. Der obere Theil beweiſst ſich mehr thätig bey der Inſpiration, der untere bey der Exſpiration: die Bewegung des erſten iſt mehr Ausdehnung, Erweiterung, Aufwölbung; jene des zweyten mehr Zuſammenziehung, Verengerung, Zuſammenpreſſung. Schon nach der Verſchiedenheit der Inſertionsſtellen theilen ſich daher die Muskeln des Athemholens in zwey Reihen, Inſpiratoren und Exſpiratoren: und vermöge jenes dreyfachen Gegenſatzes am Thorax bilden ſich auch ſeine Muskeln und ihre Gegner in drey Ordnungen. Da die Vergröſſerung und Verkleinerung des verticalen Durchmeſſers der Bruſthöhle auſſer derjenigen, welche durch das Abſteigen und durch das Aufſteigen des Zwergfelles geſchieht, durch die Geſamtbewegung derſelben nach oben und unten bedingt iſt, ſo werden beyde bewirkt durch die Muskeln, welche ſich blos an dem

Einen, nämlich entweder an dem obern oder dem untern Ende des Thorax inſeriren:

Inſpiratoren	Exſpiratoren
Sternocleidomaſtoideus	Rectus abdominis
Subclavius	Pyramidalis
Scaleni	Quadratus lumborum.

Dieſe repräſentiren den Gegenſatz von oben und unten am Thorax. Vermöge der ungleichen Beweglichkeit der Rippen ſteigen, wenn durch den Bruſt-Schlüſſelbein-Warzenmuskel und andere der Bruſtkaſten aufwärts gezogen wird, durch die Wirkung der Intercoſtalmuskeln alle Rippen in die Höhe. Die Vergröſſerung und Verkleinerung des horizontalen und transverſalen Durchmeſſers der Bruſthöhle geſchieht durch Muskeln, welche ſich an den Wänden der Bruſthöhle der Fläche nach inſeriren, und zwar wieder nach dem Geſetze des Antagonismus; die Erweiterung durch die Muskeln, welche ſich an die äuſſere Fläche, und die Verengerung durch ſolche, welche ſich an der innern Fläche anlegen.

Inſpiratoren	Exſpiratoren
Pectoralis major	Obliquus externus
Pectoralis minor	Obliquus internus
Serratus magnus	Transverſus
Serratus poſticus ſuperior	Serratus poſticus inferior
Latiſſimus dorſi	Sternocoſtalis
ſie nehmen die äuſſere Fläche der Wände der Bruſthöhle ein, und ſuchen ihren Inſertions-	ſie nehmen die innere Fläche der Wände der Bruſthöhle ein, und ſuchen ihren Inſertions-

punkt nach oben, und zwar entſtehen ſie progreſſiv immer mehr nach hinten und unten.	punkt nach unten.

Dieſe repräſentiren den Gegenſatz von Auſſen und Innen. Aber da die Knochenwände des Thorax in einzelne Knochenfragmente der Rippen zerfallen, und da jede von dieſen eine ihr eigenthümliche individuelle Bildung in ſich aufgenommen hat (da jede auch auf eine beſondere, unterſchiedene Art gewunden iſt); ſo hat auch jede Rippe ihre beſondern Muskeln, durch welche ſie hinauf- oder herabgezogen wird. Der Antagonismus iſt hier durch die Inſertion der Gegner an den entgegengeſetzten Rändern der Rippen ausgedrückt. Aber Befeſtigungspunkt für dieſe Beweger jeder einzelnen Rippe kann nur die Spine ſeyn.

Inſpiratoren	*Exſpiratoren*
Levatores coſtarum longi et breves	Longiſſimus dorſi
Cervicalis deſcendens	Sacrolumbaris.

Die Muskeln der beyden letzten Reihen dienen, um die Bewegungen aller einzelner Rippen der Geſamtbewegung des Thorax gleichzuſetzen. Sie repräſentiren den Gegenſatz von vorne und hinten. Indem nun die Muskelbildung am Thorax zwar vorſchlägt, die Gefäſsebildung aber, bey ſeiner höhlenartigen Geſtaltung, nicht aufgehoben iſt; ſo ſind auch die verſchiedenen Bewegungen deſſelben nicht bloſs durch Muskelbewegung beſtimmt: — die Gefäſsebewegung iſt am Thorax nicht ganz verdrängt, und dieſe iſt, ſo wie überall, durch die Thätigkeit

einer Fleiſchhaut bedingt. Die Intercoſtalmuskeln ſtellen in ihrer Verbreitung durch die Zwiſchenräume der Rippen eine in ſich zertrennte Fleiſchhaut dar. Denſelben Gegenſatz, welcher zwiſchen den verſchiedenen Faſerlagen in andern Fleiſchhäuten obwaltet, wiederholen die äuſſern und die innern Intercoſtalmuskeln unter ſich. Beyde ſind ſich in der Richtung ihrer Faſerlagen entgegengeſetzt. Die innern laufen von oben nach unten, die äuſſern von unten nach oben; beyde von hinten nach vorne. Offenbar ſind beyde Schichtungen Inſpirationsmuskeln, da ſie durch ihre Wirkung die Rippen, vermöge der ungleichen, nach unten zunehmenden Beweglichkeit derſelben, in die Höhe heben.

§. 477.

Die Indifferenz aller Inſpirations- und Exſpirationsmuskeln iſt im Zwergfell dargeſtellt. Das Diaphragma iſt alſo Reſpirationsmuskel, und alle Inſpirations- und Exſpirationsmuskeln ſind nur Zerlegungen des Zwergfelles nach entgegengeſetzten Richtungen hin. Das Zwergfell hat daher keinen Antagoniſten. Denn durch die Bewegung des Zwergfelles werden erſt die entgegengeſetzten Thätigkeiten der antagoniſirenden Inſpirations- und Exſpirationsmuskeln hervorgerufen, und die urſprünglich im Gleichgewicht ſtehende Action beyder nach einer oder der andern Seite hin überwiegend geſetzt, ſo wie das Zwergfell auf die eine oder die andere Seite trit. Daher erſcheinen auch alle andern Muskeln bey der gewöhnlichen ſtillen und ungetrübten Reſpiration in ſcheinbarer Ruhe: und

ſo wie alle Thätigkeit von dem Zwergſelle ausgehet, ſo erſcheint auch dieſs allein als das Thätige. Aber jene Ruhe iſt nur eine ſcheinbare, und was in ihnen als Ruhe erſcheint, iſt ein Minimum von Thätigkeit, welches eben darum der Gewahrnehmung entgeht.

§. 478.

Da im Zwergfell die Poſitivität und Negativität, die ſonſt überall im Muskelſyſteme getrennt ſind, und deren Auseinandergehen eben das Geſetz des Antagonismus im Muskelſyſtem ausſpricht, urſprünglich vereinigt ſind, und da ſeine electriſche Polarität ſtetig durch die Aufwärtsbewegung und Abwärtsbewegung verändert wird, ſo iſt es nothwendig in einer pendulirenden Bewegung. Da alle Bedingungen zur Bewegung des Zwergfelles in ihm ſelber und in ſeinem alternirenden Verhältniſs zu den In- und Exſpirationsmuskeln gegeben ſind; — ſo iſt ſeine Bewegung eine perennirende und unwillkührliche. Das Diaphragma reiht ſich alſo in dem Syſteme der Muskelbildung ſogleich an das Herz an. Doch iſt in ihm ſchon der Uebergang von der unwillkührlichen Bewegung zur willkührlichen geſetzt: daher der Wille, obgleich er die Thätigkeit des Zwergfelles nicht aufzuheben vermag, doch die Perioden und die rhythmiſchen Verhältniſſe derſelben beſtimmen kann. Die Willkühr der Bewegung trit aber im Muskelſyſteme um ſo mehr hervor, je mehr die Muskeln ſelbſt aus den innern Höhlen des Organismus entweichen, bis zulezt in dem Muskelſyſteme der Extremitäten das höchſte Spiel der freyen Willkühr entfaltet wird.

§. 479.

Die beyden Oberflächen des Zwergfelles, ſeine Bruſthöhlen- und ſeine Bauchhöhlenoberfläche ſtellen denſelben Gegenſatz dar, welcher ſich in ſeinen beyderley Bewegungsrichtungen, in dem Herabſteigen, und in dem Hinaufſteigen offenbart. Die obere iſt die arterielle, die untere die venöſe Seite des Zwergfelles. Auch der Gegenſatz der Arteria diaphragmatica ſuperior, welche vom Bruſtſtück der Aorte, und der inferior, welche von ihrem Bauchſtücke entſteht, bezieht ſich hierauf.

§. 480.

Obgleich nun das Athemholen in der Regel eine unwillkührliche Function iſt, ſo vermögen doch manche Menſchen daſſelbe bis zur vollkommenſten Apnöe und Asphyxie willkührlich zu unterdrücken, ſo wie auch durch die Verdrehung der Rückenwirbelſäule und der Rippen die ſonderbarſten Miſsſtaltungen an dem Thorax hervorzubringen.

§. 481.

Das Diaphragma oscillirt, ſo wie das Herz, in einem ſtetigen Wechſel von Syſtole und Diaſtole, und wird zugleich durch den Willen beſtimmt, ſo wie das Syſtem der willkührlichen Muskeln. Das Diaphragma iſt ein zum Eingeweide depotenzirter Muskel: und durch ſeine Bewegungen iſt, von jenen des Herzens zu denen des Gehirnes hinauf Eine Continuität in der Reihe dieſer Bewegungen, deren Perioden und rhythmiſche Verhältniſſe ſich entſprechen,

chen, ohne daſs in irgend einer derſelben die cauſalen Bedingungen der andern ausgedrückt wären. Bey dem Einathmen geſchieht nun die Erweiterung der Bruſthöhle durch das Hinabſteigen des Zwergmuskels, wobey dieſer eine concave Oberfläche den Eingeweiden der Bruſthöhle zukehrt, — durch die Verlängerung des Rückgrathes vermöge der vollkommnen Ausſtreckung der Wirbelbeine in ihren Gelenkverbindungen unter ſich, — durch die Erweiterung der Intercoſtalräume beſonders nach vorne, — durch die gröſſere Aufwölbung beſonders der vordern Oberfläche des Thorax, u. ſ. w.

Je gewaltſamer eine Inſpiration iſt (bey dem Seufzen, bey dem Keichhuſten, bey aſthmatiſchen Anfällen), deſto mehrere Thätigkeit erſcheint in den Inſpirationsmuskeln: und umgekehrt.

§. 482.

Die Bewegungen des Thorax entſprechen ſynchroniſch den Bewegungen der Lungen. Denn dieſe erfüllen die ganze Bruſthöhle, ſo daſs ihre äuſſere Oberfläche überall der innern Oberfläche der Wandungen der Bruſthöhle genau anliegt. Zwiſchen beyden befinden ſich jedoch die in ſich ſelbſt geſchloſſenen und wiederkehrenden Säcke des Bruſtfelles, welches als ſeröſe Haut den Gegenſatz bezeichnet, in welchen die Lungen gegen die Wandungen der Bruſthöhle gebildet ſind. So lange dieſer Gegenſatz beſteht, findet keine Verwachſung des Lungenbruſtfelles mit dem Rippenbruſtfelle ſtatt. Wenn er bey adhäſiven Entzündungen erliſcht, ver-

wandelt ſich durch regreſſive Metamorphoſe die ſeröſe Haut wieder in Zellengewebe. Es iſt daher auch während des Lebens bey dem Menſchen und den Säugethieren zwiſchen dem Lungenfell, und dem Rippenfell ſo wenig als in dem blinden Sacke, welchen andere ſeröſe Häute bilden, Luft, wohl aber eine ſeröſe Dunſtflüſſigkeit enthalten, welche ſich nur nach dem Tode oder bey der Bruſthöhlenwaſſerſucht verdichtet und in tropfbar-flüſſiger Geſtalt niederſchlägt. Wenn man daher die Bruſthöhle eines lebenden Säugethieres unter Waſſer öffnet, ohne die Lungen zu verletzen, ſo entweichen keine Luftblaſen. Eben ſo entſtehen in der Folge keine an der Oberfläche des Lungenfelles, welches von Hamberger in dieſer Abſicht für porös und der Luft durchgängig angenommen wurde. — Bey den Vögeln ſetzen ſich die Lungen auch auſſer ſich fort; alles iſt Lunge, Luftgefäſs: und ſomit durchdringen die Luftgefäſse auch das Lungenfell. — Nach vorne und hinten ſtoſsen die beyden Bruſtfelle zuſammen, und ſcheiden, als Mittelfell, den Thorax in zwey Cavitäten, die rechte und linke. Jedoch neigt ſich das Mittelfell mehr auf die linke Seite; dadurch wird die rechte Bruſthöhle geräumiger: die rechte Lunge iſt, da die rechte Seite des Körpers die vorzugsweiſe arterielle iſt, von daher voluminöſer; indem der Raum für die linke auch noch durch das Herz beſchränkt wird. Die rechte iſt in drey, die linke nur in zwey Lappen getheilt. Die Pleura aber iſt als die allgemeine Bedeckung des Reſpirationsſyſtems zu betrachten, und ſie ſchlieſst daher auch alle Organe, welche dieſem nicht ver-

bunden ſind, als den Oeſophagus, den Milchbruſtgang, Thymus u. ſ. f. von der Höhlengemeinſchaft mit den Lungen aus.

§. 483.

Was für den ganzen organiſchen Leib die Bildung des Hauptes, das iſt für das Reſpirationsſyſtem jene des Kehlkopfes. Von dieſem beginnt die Evolution des Organes, und er iſt die individuelleſte Geſtaltung. Seine vorzüglichſte Bedeutung iſt aber die als Stimmorgan. Früher ſchon fangen die Luftwege vorzugsweiſe mit der Bildung der Naſenhöhle, und der vordern Naſenöffnungen an. Denn bey dem ruhigen und ſtillen Einathmen zieht ſich die Luft mehr durch die Naſenhöhle als durch die Mundhöhle hindurch. Bey beſchwerlichem Athemholen werden die vordern Naſenöffnungen durch die gewaltſame Diduction der Naſenflügel mit groſser Anſtrengung erweitert. — Bey den Fiſchen, bey welchen die Naſenhöhlen dieſe Beziehung auf das Reſpirationsſyſtem verlieren, fehlen auch die hintern Naſenöffnungen. — Daher iſt der Geruch vorzugsweiſe dem Reſpirationsſyſteme einverleibt, ſo wie der Geſchmack dem Verdauungsſyſteme angehört. Jener prüft die Reinheit der Luft, wie dieſer die Beſchaffenheit der Speiſe. Die Schneider'ſche Haut ſteht in dynamiſcher Gemeinſchaft mit der Lungenſchleimhaut; ſie iſt ſelbſt ein exponirtes Glied des Schleimhautſyſtemes der Luftwege: daher ſpringt die catarrhaliſche Entzündung von der Schneider'ſchen Haut auf die Lungenſchleimhaut über, ohne

die zwischen beyden liegende Schleimhaut der Rachenhöhle, welche den Nahrungswegen angehört, zu afficiren. In der Rachenhöhle aber kommen die Luftwege und die Nahrungswege auf dieselbe Weise zusammen, wie in der Cloake der Vögel und anderer Thiere die Harnwege mit den Nahrungswegen zusammentreffen.

§. 484.

Daſs die Bildung der Luftröhre und jene der Bronchien zunächst von dem Larynx ausgehe, und durch diesen bestimmt werde, erhellet deutlich aus der Art und Weise, wie dem Larynx jene Theile nachgebildet sind. So wie das muskulöse Herz sich in den fleischhäutigen Arterien fortsetzt, und in diesen immer nur sich selbst wieder hervorbringt, so der knorpliche, muskulöse, und Schleim-häutige Larynx in der Luftröhre. Die unvollkommenen, kreisförmigen, nach hinten offenen Knorpelringe der letzten sind nur dem Schildknorpel nachgebildet: es fehlen gleichsam in jedem Ringe die beyden Gieſskannen-förmigen Knorpel nach hinten, und jeder Knorpel hat wieder eine Stimmritze. Die Fleischhaut der Luftröhre trägt den Gegensatz der länglichen, gestreckten, venösen, und der transversellen, kreisförmigen, arteriellen Muskelfasern in sich. Die Schleimhaut ist Nervenreich, nur bey weitem minder als jene des Larynx.

§. 485.

So wie die Harnblase sich in den beyden Uretheren fortsetzt, so theilt sich die Luftröhre in zwey Aeste, und in diesen wiederholt sich die Bifurcation

bis zur Bildung der kleinſten Zweige. Wie die Luftröhre dem Larynx nachgebildet iſt, ſo die Bronchien der Luftröhre. Noch immer ſind Knorpelringe, aber immer mehr durchbrochen, immer in gröſſeren Zwiſchenräumen, immer mit dünnern Knorpelſcheibchen, immer in weniger paralleler Richtung, zuletzt nur noch kleine, ganz irreguläre, längliche, winkliche, ohne Ordnung gelagerte Knorpelſtückchen zugegen. Die Verzweigungen der Bronchien enden blos membranös, blaſig, blindſackig. Mit der knorpelichen Bildung erliſcht auch die muskulöſe, und die Luftzellchen, in welche die Bronchien enden, ſind zuletzt nur aus der höchſt expandirten, verdünnten Schleimhaut gebildet.

§. 486.

Offenbar wird nun die ganze Bildung und Geſtaltung der Lungen von den Luftgefäſsen beherrſcht. So wie in abſondernden Eingeweiden die Ausführungsgänge nur im Gegenſatze der arteriellen und venöſen Gefäſse gebildet ſind, und eine dieſen untergeordnete Bedeutung erhalten, ſo iſt dagegen in den Lungen die Bildung der Blutgefäſse jener der Luftgefäſse untergeordnet, und durch dieſe beſtimmt. Daher folgen überall die Blutgefäſse der Lungen den Luftgefäſsen in ihrer Vertheilung und Ausbreitung.

§. 487.

In dem Gefäſseſyſtem der Lungen ſelbſt wieder iſt die arterielle Richtungspolarität über die venöſe vorſchlagend.

Da überall die Arterien die minder geräumigen Gefäſsehöhlen im Gegenſatz der Venen bilden, ſo findet das Gegentheil in der Gefäſsebildung der Lungen ſtatt. Die Lungenarterien prävaliren über die Lungenvenen. Das Eigenthümliche in der Bildung der Lungen iſt eben die arterielle Natur dieſes Organes, — die gänzliche Verdrängung der abſoluten Cohäſion, des Magnetismus, womit auch die aufgelockerte, ſchwammige Bildung ihres Parenchymes übereinſtimmt. Die Expanſion iſt ganz vorherrſchend in derſelben, und Leberſubſtanz verhält ſich zur Lungenſubſtanz überhaupt wie abſolute Cohäſion zur relativen, wie Magnetismus zur Elektricität, wie die Vene zur Arterie. Die zellige oder bläſige Elementarbildung iſt die vorherrſchende in den Lungen: — ſie kömmt nur dieſem Organe zu, und da, wo ſie weiter reicht, im Vogel, erweitert ſich auch mit ihr gleichzeitig das Reſpirationsſyſtem. Die Bildung der Lungen ſelbſt iſt luftig, — ſie iſt das der Luft entſprechende Organ: wie das Auge dem Lichte gleichgebildet iſt: und ſie beſteht daher ſelbſt aus Luftzellchen oder Bläschen, welche mit den Zellen ihres eigenen Zellſtoffes keine Gemeinſchaft haben. In dieſe Bläschen enden die letzten Verzweigungen der Bronchien, d. h. dieſe enden durch Totalexpanſion ihrer ſelbſt, und ſomit geht ihre Gefäſsebildung in die bläſige über. In den membranöſen Wandungen dieſer Zellchen breitet ſich das Capillargefäſsenetz der Lungenſchlag- und Blutadern aus. Das Blut wird nicht ergoſſen in jene Bläschen und in die aus ihnen gebildeten Läppchen: es geſchieht keine Vermiſchung des Blutes

mit der Luft; ſondern das erſte geräth nur in die Wirkungsſphäre des letzten. Das Blut extravaſirt eben ſo wenig im Parenchym der Lungen als in andern Organen: — ſondern es erfüllet nur die Capillargefäſse ihres Parenchyms. Die vorzugsweiſe arterielle Natur der Lungen erhellet auch beſonders aus der Beſchaffenheit ihres Capillargefäſseſyſtemes. Denn dieſes iſt vorzugsweiſe arteriell. Das Capillargefäſseſyſtem der Lungen iſt im Gegenſatz gegen das allgemeine Capillargefäſseſyſtem gebildet. Denn im letzten geſchieht überall die Verwandlung des rothen Blutes in ſchwarzes, im erſten aber jene des ſchwarzen Blutes in rothes. Das Capillargefäſseſyſtem der Lungen iſt ſomit im Gegenſatze befangen gegen das Capillargefäſseſyſtem des ganzen Körpers, und die Lunge polariſirt gegen die Geſamtheit aller übrigen Organe. Aber im Gewebe der Lungen iſt vierfache Gefäſsepolarität hervorgetreten. Es iſt nicht allein die Arteria und Vena pulmonalis, welche ſich in den Lungenläppchen vertheilt, ſondern auch die Bronchialarterie und die Bronchialvene. Dieſe unmittelbaren Spröſslinge der Aorte und obern Hohlader folgen durchaus dem Verlaufe der Luftgefäſse, und begleiten, wie man bey wohlgerathenen Injectionen deutlich erkennt, die Bronchienverzweigungen, deren Schleimhaut ſich ihre Aeſte ergeben, ohne jemals auf irgend eine Art, oder in irgend einem Abſtammungsgrade mit den Zweigen der Lungenſchlag- und Blutader bedeutende Anaſtomoſen zu unterhalten. Gewöhnlich betrachtet man die Bronchialgefäſse als die Ernährungsgefäſse der Lungen. Andere Phyſiologen ſchreiben ihnen glei-

che Verrichtungen mit den Pulmonalgefäſsen zu. Aber ſchon die einzige Betrachtung, daſs die Bronchialgefäſse jede bedeutende Anaſtomoſe mit den Pulmonalgefäſsen vermeiden, zeigt eine Verſchiedenheit der Beſtimmung in ihnen an. Die Lungen bilden, vermöge jener Antipolarität zwiſchen den beyden Capillargefäſsen, einen Gegenſatz gegen den ganzen übrigen Organismus. Aber ſie ſtellen auch wieder eine Einzelnheit dar, welche in derſelben Reihe von Relativitäten befangen iſt, wie jedes andere Eingeweide. Sie ſind folglich auch im Gegenſatze gegen ſich ſelbſt. Sie müſſen daher auſſer dem beſondern Capillargefäſseſyſtem, worin das ſchwarze Blut in rothes umgewandelt wird, ein anders in ſich tragen, in welchem auf gleiche Weiſe, wie in den Haargefäſsen anderer Eingeweide, rothes Blut in ſchwarzes übergeht. Vermöge jener innern Entzweyung des Naturprincips, nach welcher die Lungen den Gegenſatz gegen eine ganze Reihe von Relativitäten bilden, in welcher ſie ſelbſt wieder befangen ſind, nach welcher ſie alſo in ſich den Pol und zugleich den Gegenpol tragen, — müſſen ſie auch in ihrem Gefäſseſyſtem entzweyet ſeyn. Es müſſen daher wirklich in den Lungen zweyerley Capillargefäſseſyſteme ſich finden, deren Eines den Lungengefäſsen, das andere den Bronchialgefäſsen angehört; auch verzweigen ſich dieſe in ihnen, beſonders in dem Schleimhautgewebe der Bronchialäſte, weniger im Lobulargewebe der eigentlichen Lungenſubſtanz, nach Art der Gefäſse in andern Theilen, und ſtellen die Eine Seite des Gefäſseſyſtems der Lungen dar, nach welcher hin dieſs Eingeweide

ſich als eine Beſonderheit im Organismus entwickelt. Nach der andern Seite hin aber geht das Capillargefäſseſyſtem der Lungengefäſse hervor, wodurch die Lungen gegen die Totalität anderer Eingeweide zum Gegenſatze gelangen.

§. 488.

Die häufigen Nerven und Säugegefäſse, welche zur Lunge hingehen, verbreiten ſich meiſtens bloſs in der Schleimhaut der Luftröhrenäſte, und nur ſehr geringen Theils in dem Parenchym der Lungen ſelbſt.

§. 489.

Es findet zwar eine präſtabilirte Harmonie zwiſchen den Bewegungen der Lungen, und jenen des Thorax ſtatt. Jedoch ſind die erſten nicht lediglich durch die letzten beſtimmt, ſo daſs die Lungen ſich bloſs paſſiv dabey verhielten, und nach dem Geſeze des aufgehobenen Gleichgewichtes durch die in ſie einſtürzende Luft ausgedehnt würden. Die Lungen ſind thätig im Momente des Einathmens und im Momente des Ausathmens, ſie beſitzen ein eigenes Vermögen einzuathmen. Bey durchdringenden Bruſtwunden, wenn die äuſſere Luft in die Bruſthöhle eingedrungen iſt, dauern die Bewegungen der Lungen noch fort; ſie ziehen ſich zuſammen und dehnen ſich aus, unabhängig von den Bewegungen des Thorax, — was man deutlich an den durch die Wunde hervorgedrungenen Lungenlappen beobachten kann. Die Lungen beſitzen einen hohen Grad von Irritabilität; ſie dehnen ſich ſelbſt aus, um die atmosphäriſche Luft aufzunehmen; — ſie ſind des

Krampfes, der Convulſion, der ſpastiſchen Zuſammenziehung fähig. Wird die ſelbſtthätige Bewegung der Lungen nicht anerkannt, ſo bleibt die erſte Inſpiration des Neugebohrnen, für welche man vergebens auf anderem Wege eine Erklärung zu erkünſteln verſucht, es bleibt das nach jedem Einathmen wiederkehrende Bedürfniſs auszuathmen, und umgekehrt, unbegreiflich. Alle mechaniſtiſche Erklärungen, welche man für die Nothwendigkeit des Wechſels zwiſchen Inſpiration und Exſpiration giebt, ſind unzureichend. Eben ſo wenig giebt das unangenehme Gefühl, was die lange Zurückhaltung des Odems bewirkt, einen hinreichenden Grund der Nöthigung zum Ausathmen.

Das Weſen der Reſpiration, und der ſtetige Wechſel zwiſchen Einathmen und Ausathmen iſt nur aus der Art und Weiſe zu erkennen, wie die Reſpiration in der Mitte des thieriſchen und des organiſchen Lebens ſteht, beyde untereinander verknüpft, und als Mittelglied zwiſchen Herz und Gehirn eintrit. Daher iſt das Geſetz der Reſpiration weder Naturnothwendigkeit, welche dem organiſchen Leben vorſteht, noch Freyheit, Willkühr der Bewegung, welche das thieriſche Leben beherrſcht, ſondern die höhere Einheit von beyden. Das Athemholen iſt eigentlich weder willkührlich noch unwillkührlich, ſondern es iſt beydes zugleich unter beſonderer Form. — Die erſte Inſpiration des Neugebohrnen iſt nur das Zeichen der Ermächtigung des thieriſchen Lebens über das Organiſche, einzig neceſſitirt durch das Geſetz der fortſchreitenden Metamorphoſe. — Das Asthma, als Nevroſe,

ist nur aus der Stelle, welche die Lungen, als vermittelndes Organ, zwischen Herz und Gehirn einnehmen, zu begreifen.

§. 490.

Durch das Athemholen verändern sich Blut und atmosphärische Luft wechselweise. Beyde gelangen nicht in unmittelbare Berührung: denn die Capillargefässe aus den Lungenschlagadern haben keine Gemeinschaft mit den Luftzellen. Es findet keine Vermischung des Blutes und der atmosphärischen Luft statt: und wird die Luftröhre mit ihren Verzweigungen als Ausführungsgang, oder vielmehr als Zuführungscanal der Lungen betrachtet, so offenbaret sich hierin die höhere Dignität der Lungen vor absondernden Organen, da in diesen die Ausführungsgänge durch das Capillargefäsesystem in die Arterien offen stehen: in den Lungen aber beyde gesondert ihre Individualität behaupten. Die Respiration ist das Schema der reinsten dynamischen Einwirkung, da die Sauerstoffluft ohne unmittelbaren Contakt sich im Blute hervorbringt, und eben so im Verhältnisse als das Blut entkohlt und entwasserstofft wird, die Wassererzeugung in der atmosphärischen Luft, und die Bildung des kohlensauern Gasses vor sich geht. Luft und Blut gelangen in den Lungen nur in ihre wechselseitige Wirkungssphäre. Von der Aufnahme eines arteriellen Sauerstoffes in das Blut kann daher nicht die Rede seyn: und wenn dieser eine feuchte sehr angespannte Blase vermöge deren Porosität durchdringt, und das in ihr enthaltene venöse

Blut roth färbt, ſo ſind die Wandungen der Luftzellchen aus belebten Membranen gebildet, und ihre Poren geſchloſſen.

§. 491.

Die Veränderungen, welche Luft und Blut durch das Athemholen erleiden, ſind gegenſeitig. Jene, welche in der atmoſphäriſchen Luft ſtatt findet, beſteht in einer Verminderung ihres Volumens überhaupt, und in einer Veränderung des quantitativen Verhältniſſes ihrer Beſtandtheile unter ſich.

§. 492.

Das Volumen der Luft, welche mit jedem Athemzuge eingeathmet wird, iſt ſehr verſchieden, und wird daher von den Jatromathematikern, welche daſſelbe genau durch Zahlenverhältniſſe zu beſtimmen ſuchten, auf ſehr verſchiedene Weiſe angegeben. Das luftzelliche Gewebe der Lungen wird aber auch bey completem Ausathmen nicht luftleer, ſo wie ſich die Höhlen des Herzens auch im Momente der Syſtole nicht alles enthaltenen Blutes entleeren. Nach der Berechnung von Goodwin, welche die correkteſte iſt, bleiben gegen 109 Cubikzolle Luft nach dem ſtärkſten Ausathmen in den Lungen zurück: bey dem tiefſten Einathmen werden nur 12 Cubikzoll Luft neu in die Lungen aufgenommen, dieſe werden um 1/6 ihres Volumens durch die gröſſere Wärme des Ortes ausgedehnt, und die Luftzellchen der Lungen enthalten alſo nach vollbrachter Inſpiration gegen 124 Cubikzolle Luft. Uebrigens iſt dieſs Verhältniſs ſehr nach dem

Alter des Menſchen, nach der Gröſse der Lungen, nach der Energie, mit welcher der Prozeſs der Reſpiration überhaupt ausgeübt wird, und nach dem Verhältniſſe des Momentes der Inſpiration zu jenem der Exſpiration überhaupt verſchieden.

§. 493.

Wenn nun die eingeathmete Luft wieder ausgeathmet wird, iſt das Volumen derſelben nicht mehr das nämliche, ſondern etwas geringer. Auch iſt das Verhältniſs der Gaſsarten in der atmoſphäriſchen Luft verändert; wenn vorher die Quantität des Gaſsazot ſich zu jener des Gaſsoxygen wie 72 zu 27 verhielt, ſo iſt die Quantität des letzten von 27 auf 14 gemindert. Dagegen enthält die ausgeathmete Luft beynahe einen gleichen Antheil von kohlenſauerm Gaſs; und ſehr oft etwas Gaſshydrogen. Auch die Quantität des Stickgaſses iſt, obgleich nur wenig, in der atmoſphäriſchen Luft vermindert. Das der Luft zufällig beygemiſchte kohlenſaure Gaſs iſt ein Produkt des Lebens- und Verbrennungsprozeſſes. Es wirkt aber wirklich narcotiſch und hierdurch paralyſirend auf die Lungen der Thiere. Denn Thiere werden asphyxirt in einer Luft, worin noch eine Kerze brennt, und welche noch ziemlich viel Gaſsoxygen enthält; ſobald die Quantität des kohlenſauern Gaſses darin, bis zu einem gewiſſen Grade ſteigt. In der exſpirirten Luft iſt eine groſse Quantität von Waſſerdunſt enthalten. Die Reſpiration endet in Waſſererzeugung: der Waſſerſtoff des venöſen Blutes wird comburirt durch das Sauerſtoffgaſs der atmoſphäriſchen Luft, und die Waſſerbil-

dung ist nur das äussere Zeichen von der Auslöschung des Wasserstoffes durch den Sauerstoff, und von der Tilgung der phlogistischen Beschaffenheit des Blutes. — Ausserdem wird ein Theil des im venösen Blute so reichlich enthaltenen Serum verdünstet, und der Wasserdunst in der exspirirten Luft entsteht auf dieselbe Weise, wie die Ausdünstungsflüssigkeit, welche an der Hautoberfläche abgesondert wird.

§. 494.

Nicht aller wässerige Dunst, welchen die ausgeathmete Luft enthält, ist somit durch wirkliche Wassererzeugung aus dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft und aus dem Hydrogen des Blutes gebildet. Eben so da eine ungleich grössere Quantität von Wasser in dem Gasoxygen auflöslich ist, als in kolensaurer Luft; so schlägt sich bey der Zerlegung der atmosphärischen Luft durch den Respirationsprozess der Thiere ein Theil des vorher in dem Sauerstoffgass der atmosphärischen Luft aufgelösten Wassers in Dampfform nieder.

§. 495.

Die Respiration ist wahrhaft der umgekehrte Prozess der Verdauung. Auch ist die Respiration eine wahre Digestion der Luft, wie schon Hippokrates sagt, und die Luft ist das Pabulum vitae.

Das Wesen der Digestion ist die Vermehrung der Combustibilität des Blutes durch Einführung der beyden phlogistischen Stoffe, des Kohlenstoffes und des Wasserstoffes, — das Wesen der Respiration ist die wirkliche Combustion des Blutes durch Entkoh-

lung und Deshydrogenisirung: und durch diess Hervortreten des Oxygens im Blute. Zweyfach ist daher die Veränderung, welche das Blut durch den Respirationsprozess erleidet: Entkohlung und Deshydrogenisirung von der Einen, und Oxydirung von der andern Seite, und zwar im Gegensatze der Entsauerstoffung und der Bildung des Kohlensauern, und des Wassers in der atmosphärischen Luft. Die Oxydation und die Dephlogistisirung des Blutes aus der Luft ist nicht als eine wirkliche Aufnahme des Sauerstoffes in das Blut, etwa mittelst chemischer Verwandtschaft, zu erklären, wobey sich die Lunge ganz unthätig, und gleichsam wie im Schmelztiegel zum Behufe irgend einer chemischen Operation verhielte, welche krass-empirische Ansicht sich auch schon in der blossen Verstandesreflexion dadurch widerlegt, dass in dem spongiösen Gewebe der Lobularsubstanz der Lungen die Luft nicht einmal zur unmittelbaren Berührung mit dem Blute gelanget.

§. 496.

Was vom Blut selber zur gänzlichen Combustion gelanget ist, das wird als verbrannter Kohlenstoff, unter der Form des kohlensauern Gasses, und als verbrannter Wasserstoff, als verdünstetes Wasser, ausgeschieden. Der Kohlenstoff entweichet daher als kohlensauers Gass, in der ausgeathmeten Luft. Auf gleiche Weise kommt es bey dem Respirationsprozess zu der wirklichen Wassererzeugung, und zur Verdünstung von Gasshydrogen, obgleich in geringer Quantität.

§. 497.

So wie das venöſe Blut durch die Reſpiration ſeines gekohlten Waſſerſtoffes entbunden wird, verliert daſſelbe ſeine dunkle, beynahe violette Farbe, und nimmt eine lebhafte, hochrothe Farbe an. Dieſelbe Veränderung erleidet das aus der Ader gelaſsne venöſe Blut, wenn es der Einwirkung der atmoſphäriſchen Luft, oder in noch höherm Grade, wenn es der Einwirkung des reinen Sauerſtoffgaſses ausgeſetzt wird. Die Röthung des ſchwarzen Blutes erfolgt nur da, wo daſſelbe in unmittelbarer Berührung mit der Luft iſt, ſie erfolgt nicht in mephitiſchen Gaſsarten, und um ſo weniger, je geringer die eudiometheiſche Güte eines Gaſsgemenges iſt. Bey dem Fötus, welcher nicht reſpirirt, iſt auch kein rothes Blut in den Arterien enthalten: bey dieſem, ſo wie bey den kaltblütigen Thieren, findet kein auffallender Unterſchied in der Farbe, in der Conſiſtenz, in der ſpecifiken Schwere, und in der Temperatur zwiſchen arteriellem und venöſem Blute ſtatt. Eine kurze Unterbrechung des Athemholens bey Menſchen, Säugethieren und Vögeln iſt hinreichend, um den Gegenſatz zwiſchen arteriellen und venöſen Blutes ſchnell aufzuheben; alsdann werden auch die hintern Höhlen des Herzens, und die Arterien mit ſchwarzem Blute erfüllt.

§. 498.

Das Blut, welches in den vordern Höhlen des Herzens angetroffen wird, unterſcheidet ſich von dem aus den Lungen zurückkehrenden Blute in

den hintern Höhlen des Herzens, vorzüglich durch seine Farbe. Die dunkle Röthe, die violette oder selbst schwarze Farbe ist eine Folge des in ihm enthaltenen unvollkommen gebildeten Kohlensauern. Der reine Kohlenstoff, da wo er am differentesten hervortrit, im Diamante, hat keine schwarze Farbe: die schwarze Kohle ist selbst schon ein in leichte Grade oxydirter Kohlenstoff: das venöse Blut ist reich an freyem, unvollkommnem Kohlensauerm. Durch die Respiration wird die Oxydation des Kohlenstoffs im venösen Blute bis zu dem Grade gebracht, daſs dasselbe als kohlensaures Gaſs entbunden wird: nämlich nur bey einem bestimmten Oxydationsgrade wird das Kohlensaure der Vergasung und Verflüchtigung fähig. — Die schwarze Farbe wird im Blute in höherm Grade wahrgenommen, wenn dasselbe der Einwirkung von kohlensaurer Luft ausgesetzt wird. Die dunklere Farbe, welche man an den Lungen älterer Menschen wahrnimmt, und die blauliche Farbe des in groſser Quantität von manchem Menschen des Morgens nach dem Schlafe ausgeworfenen Schleimes ist eine Folge des in den Lungen abgesetzten, nicht vollkommenen verbrannten, Kohlensauern; so wie das schwarze Pigment im Malpighischen Netze bey der Neger-Race, eben so das schwarze Pigment der Gefäſsehäute des Auges auf dieselbe Weise sich bildet. Es ist also zuerst Mangel an Kohlenstoffoxyd, wodurch sich das arterielle Blut vom venösen unterscheidet, nicht Mangel an Kohlenstoff; denn vermöge seiner gröſsern plastischen Kraft hat das arte-

rielle Blut mehr Neigung zur Verkohlung als das venöſe, und bildet daher, z. B. wenn es ausgetrocknet und verbrannt wird, eine gröſſere Kohle als das venöſe. Da nun im Venenblute weder Sauerſtoff noch Kohlenſtoff frey vorkommen, ſondern beyde durcheinander ausgelöſcht, ſo waltet im Venenblute das Hydrogen frey und ungebunden. Das Venenblut kehrt die Hydrogenelectricität nach auſſen, die Oxygenelectricität nach innen: und die beyden Pole ſind umgekehrt im arteriellen Blute. Daher befindet ſich das Venenblut in einem Zuſtande von Auflöſung, zeigt immer gröſſere Neigung zur vollkommnen Auflöſung; das arterielle Blut aber zur Gerinnung. Das Venenblut iſt daher mehr verwäſſert, reicher an Seroſität, und das Serum derſelben iſt wieder mehr indifferent, wäſſerig, und geſalzen. Denn das Salz iſt nur die Wiederkehre der Indifferenz des Waſſers in der quadratiſchen Potenz: die Säure iſt in ihm durch das Alcali, wie im Waſſer der Sauerſtoff durch den Waſſerſtoff, abgeſtumpft. Die Salze bilden ſich im Blute auf dieſelbe Weiſe, wie im Waſſer, z. B. des Oceans. Das Serum des Blutes trägt daher die Indifferenz aller dynamiſchen Potenzen in ſich. — Dagegen iſt das Serum des Blutes weniger reich an Eyweiſsſtoff: dieſer befindet ſich darin im weniger oxydirten Zuſtande. Daher das Serum des venöſen Blutes ſo gierig das Sauerſtoffgaſs verſchluckt. Eben ſo iſt der Faſerſtoff und Färbeſtoff im venöſen Blute in weit geringerer Quantität zugegen, denn beyde ſind Träger der Oxygenelectricität im Blute, und treten nur bey höherem Oxydationsgrade deſſelben

hervor; besonders ist das Eisen in dem venösen Blute theils in geringerer Quantität, theils nicht in dem Grade oxydirt, und, in dem übergewichtigen Verhältnisse mit der Phosphorsäure verbunden, zugegen, dass es sich als rothes phosphorsaures Eisenoxyd darzustellen vermöchte. Daher hat das Venenblut überhaupt weniger Neigung zur Gerinnung: es zeigt sich mehr zur Auflösung und Verflüssigung geneigt; es bildet bey der Gerinnung einen kleinern mehr gallertartigen weniger faserstoffigen Kuchen. Das arterielle Blut ist vorzüglich durch seinen Gehalt an freyem Sauerstoff ausgezeichnet: es trägt den Sauerstoffpol frey nach aussen gekehrt und im höchsten Potenzgrade in sich. Der Sauerstoff ist in demselben zum Theil noch als Halbgass, aura oxygenea, zugegen; daher rührt seine schäumige Beschaffenheit, seine geringe specifike Schwere, seine hochrothe Farbe, welche überall und also auch im Blute, von der Herrschaft der Oxygenpolarität zeugt. Auch in chemischen Versuchen offenbart das arterielle Blut seinen grossen Gehalt an freyem Sauerstoff; z. B. im Eudiometer: es lässt denselben auch bey jeder Gelegenheit leicht wieder fahren; und alle oxydable Körper säuern sich leicht aus dem arteriellen Blute. Zuckerstoff mit arteriellem Blut gekocht verwandelt sich in Zuckersäure; das arterielle Blut, mit Wasserstoffgass geschüttelt, setzt an dieses seinen freyen Sauerstoff ab. Das arterielle Blut gilt daher im Lebensprozesse selbst nur als Träger der negativen Electricität, Oxygenpolarität zu den Organen hin. Es setzt in der Progression des

arteriellen Kreislaufes seinen Sauerstoff an die Wandungen der Arterien ab; und da jede Oxydation einer Verstärkung der Attraktivkraft im oxydirten Körper gleich ist; so wird durch jene Oxydation der innern Gefäßehaut das ursprüngliche Expansionsstreben der Arterien beschränkt, und diese zur Zusammenziehung bestimmt. Auch die Unfähigkeit des venösen Blutes, die Contraction hervorzurufen, und die innere Gefäßehaut zu oxydiren, ist ein Grund davon, daß die Venen nicht pulsiren. Die Arterie jedes Organes vergegenwärtiget zugleich Herz und Lunge in ihm: je näher nun ein Organ bey Herz und Lunge ist, je kürzer der Verlauf seiner Schlagader, desto mehr verhält sich diese als Lunge und Herz zu ihm, und desto höher ist seine arterielle und irritable Stimmung überhaupt.

§. 499.

Bey der Respiration wird zwar, so wie überall da, wo Gegensätze entstehen, und Zersetzungen vor sich gehen, die Wärme frey, die vorher jene Gegensätze ausgeglichen hatte und mit den Entgegengesetzten Eines, d. h. durch sie gebunden war; vorzüglich findet bey der Respiration eine bedeutende Wärmeentbindung aus dem Grunde statt, weil ein gleiches Volumen von Sauerstoffgaß unter allen Luftarten die größte Quantität von gebundener Wärme in sich hat, die geringste aber das kohlensaure Gaß. Da nun bey der Respiration die verhältnißmäßige Quantität des Sauerstoffgaßes in der atmosphärischen Luft so sehr gemindert, jene des kohlensauern Gaßes so sehr vermehrt wird, so erleidet die atmosphärische Luft eine große Capaci-

tätsverminderung, und viele vorher latente Wärme wird frey. Jedoch kann ſich dieſe nicht als freye Wärme offenbaren; denn zum Theil wird ſie durch den Waſſerdunſt, welchen die exſpirirte Luft enthält, ausgeleitet; da jener Waſſerdunſt nicht nur, um ſich im elaſtiſch-flüſſigen Zuſtande zu erhalten, viele vorher freye Wärme bindet, ſondern derſelbe auch, ſo wie Waſſerdämpfe überhaupt, ein ſehr wirkſames Vehikel zur Ausleitung der Wärme, und daher jede Verdünſtung mit Erkaltung verbunden iſt. Der Wärmeausleitungsprozeſs des thieriſchen Organismus geht daher nicht allein durch die Hautausdünſtung, ſondern auch durch die Lungenausdünſtung, und die Schleimhautausdünſtung überhaupt von ſtatten. Anderntheils vermehrt ſich die Wärmecapacität des Blutes bey der Umbildung des venöſen Blutes in arterielles — in demſelben Verhältniſſe, und aus demſelben Grunde, als die Wärmecapacität der atmoſphäriſchen Luft gleichzeitig vermindert wird. Denn jede Veränderung in beyden iſt gegenſeitig. Vermöge ſeines Gehaltes an Sauerſtoffluft, vermöge der Verflüchtigung des Kohlenſauern beſitzt das arterielle Blut eine ungleich gröſſere Wärmecapacität als das venöſe. Daher geht die Entbindung der thieriſchen Wärme beſonders im Capillargefäſsſyſtem der Organe vor ſich, wo das arterielle Blut in venöſes umgebildet, und ſomit deſſen Wärmecapacität vermindert, daher die vorher latente Wärme frey wird. Vermöge jener Vermehrung der Capacität und der Wärmeausleitung durch die Lungenausdünſtung wird nicht nur der Wärmeentbindung in den Lungen das Gegenge-

wicht gehalten, ſo daſs hierdurch ein Gleichgewicht der Wärme entſteht, und die Temperatur der Lungen, die Temperatur der übrigen Organe, und die Blutwärme überhaupt nicht überſteigt: ſondern das aus den Lungen zurückkehrende, in den hintern Höhlen des Herzens befindliche Blut beſitzt ſogar einige Grade weniger Wärme als das in den vordern Höhlen enthaltene venöſe Blut: und erſt in der Progreſſion des arteriellen Kreislaufes offenbart ſich allmählig die höhere Temperatur des arteriellen Blutes. Die Reſpiration iſt von daher nicht die nächſte Urſache der thieriſchen Wärmeerzeugung: jedoch iſt die Calorification allerdings von dem Athemholen abhängig; denn durch dieſe wird das Prinzip der innern ſpontanen Wärmeerzeugung aufgenommen; und von daher iſt der Grad der Blutwärme in jeder Thierklaſſe entſprechend der extenſiven und intenſiven Entwickelung des Reſpirationsſyſtemes in derſelben. So ſtimmt die Kaltblütigkeit der Fiſche und Amphibien mit der unvollkommnen Reſpiration dieſer Thiere durch Kiemen und membranöſe Lungen überein, ſo die höhere Temperatur der Blutwärme bey den Vögeln mit der groſsen Ausdehnung ihres Reſpirationsſyſtemes. Die Reſpiration iſt nach dem vorhergehenden eine Verminderung der phlogiſtiſchen Beſchaffenheit im Organismus. Von den beyden phlogiſtiſchen Stoffen wird der Kohlenſtoff halb verbrannt als kohlenſaures Gaſs, der Waſſerſtoff, obgleich in geringer Quantität und nicht immer, als Waſſerſtoffgaſs, wohl im gekohlten Zuſtande, vorzüglich aber zu Waſſer verbrannt, ausgeſchieden. Die Waſſerer-

zeugung aus Wasserstoff und Sauerstoffgass geht häufig, auch ausserhalb des thierischen Organismus, ohne Lichtentwickelung, z. B. durch sehr grosse, langsam verstärkte Compression beyder Gasarten vor sich. Der obgleich ebenfalls nicht sehr bedeutenden Verminderung der atmosphärischen Luft im Gehalte an Stickgass entspricht die durch fortgesetzte Oxydation bedingte Verstickstoffung des Blutes, und die Bildung des Faserstoffes, welches so sehr von der Respiration abhängig ist.

§. 500.

Ausserdem werden der exspirirten Luft in den Lungen noch mehrere andere vom Blute ausgeschiedene, nicht weiter mehr assimilirbare Bestandtheile oder Auswurfstoffe beygemischt: daher erkennt man oft im Odem eines Menschen noch den Geruch lange vorher genossener Speisen, eben so rührt von daher der üble Geruch mancher Menschen aus dem Halse: die meisten durch die Schleimhaut der Lungen entweichenden Auswurfstoffe aber werden schon in der Luftröhre durch die Wirkung des Sauerstoffgasses zersetzt, und in neue Produkte umgewandelt.

§. 501.

Die Veränderungen, welche Blut und Luft wechselweise in den Lungen erleiden, sind nicht eine Folge der chemischen Zersetzung des einen durch die andere: das Gesetz derselben ist nicht das Gesetz chemischer Refinitäten: sondern die Lunge wirkt hierbey als thätiges Organ. Mit einer, ihr durch Entelechie einwohnenden Kraft trennt sie die

atmoſphäriſche Luft in die beyden Gaſsarten, die mephitiſche und die dephlogiſticirte: und eben ſo iſt es die Lebensthätigkeit des Organes, wodurch die Veränderung des Blutes bewirkt wird. Daher ſteht die Oxydation des phlogiſtiſchen Blutes in den Lungen nicht bloſs im Verhältniſſe der Ausdehnung, zu welcher die Luftgefäſse in den Lungen gelangen, und nicht im Verhältniſs des Reichthums der atmoſphäriſchen Luft an Sauerſtoffgaſs: in derſelben Zeit conſummirt daſſelbe Thier, wenn es im reinen Sauerſtoffgaſs athmet, oder in einem Gaſsgemenge, worin eine ſehr groſse Quantität von Sauerſtoffgaſs enthalten iſt, keine gröſſere Quantität deſſelben, als wenn gewöhnliche atmoſphäriſche Luft eingeathmet wird. Dagegen iſt die Conſumtion des Sauerſtoffgaſses durch die Reſpiration um ſo gröſſer, je gröſſer die Energie der Lebensthätigkeit in den Lungen und in dem irritabeln Syſteme überhaupt iſt. Daher zerſetzt ein junger lebhafter Vogel die mit ihm unter der Glasglocke geſperrte Luft geſchwinder, als ein alter ſchon abgematteter Vogel. Eben ſo hat jede Vermehrung der Gefäſsebewegung, jede Muskelanſtrengung gröſſere Conſumtion von Sauerſtoffgaſs zur Folge.

§. 502.

Durch die Kiemenreſpiration zerlegen die Fiſche nicht das Waſſer, in welchem ſie leben, ſondern ſie athmen die Luft, welche in dem Waſſer enthalten, und mit dieſem verbunden iſt. Denn einmal die Reſpiration iſt ſelbſt nichts anders als der Prozeſs des Thierleibes mit der Luft: auch für

die Thiere, welche im Waſſer leben, iſt die Luft eine nothwendige Bedingung der Fortdauer des Lebens. Es entwickelt ſich aus dem Waſſer, worin Fiſche reſpiriren, kein Waſſerſtoffgaſs, was nothwendig der Fall ſeyn müſste, wenn ſie das Waſſer zerlegten, und die Eine Form des Waſſers, nämlich den Sauerſtoff, in ſich zurücke hielten. Die Fiſche kommen häufig an die Oberfläche des Waſſers, um die demſelben aufliegende Luft zu athmen. Daher ſind auch die Kiemen am gröſsten bey denjenigen Thieren, welche an der Oberfläche des Waſſers leben; ſie ſind am kleinſten in denjenigen Gattungen, welche die Tiefen des Meeres bewohnen. Beyde verhalten ſich zu einander, wie Landthiere zu den Luftthieren. Die Fiſche ſterben in Waſſerbehältern, in welchen das Waſſer nicht in Berührung mit der atmoſphäriſchen Luft iſt: ſie ſterben etwas langſamer in Waſſerbehältern, über welchen eine geringe Quantität von atmoſphäriſcher Luft, oder von Sauerſtoffgaſs geſperrt iſt: die oben ſtehende Luft vermindert ſich im Volumen, und das Sauerſtoffgaſs wird in kohlenſaures Gaſs verwandelt. Das Waſſer iſt alsdann mit einer geringern Quantität von Luft geſchwängert als gewöhnlich. Die Fiſche ſterben ſehr geſchwinde im Waſſer unter einer Glocke, in welcher mephitiſche Gaſsarten, beſonders nitröſes Gaſs, geſperrt iſt: und ſie ſterben unter denſelben Erſcheinungen, wie Thiere in mephitiſchen Gaſsarten. Eben ſo ſterben die Fiſche in einem Waſſerbehälter, wenn man ſie mittelſt eines nahe an der Oberfläche des Waſſers ausgeſpannten Flores verhindert, dieſe zu erreichen.

§. 503.

So wie die verschiedenen Arten des Pulses in dem verschiedenen Verhältnisse der Systole und der Diastole unter sich gegründet sind, so entspringen aus dem verschiedenen Verhältnisse der Inspiration zur Exspiration verschiedene Modificationen des Athemholens. Und diese sind Ausdrucksarten des Verhältnisses der contractiven zur expansiven Thätigkeit überhaupt. So ist das Gähnen die Folge der nachlassenden Thätigkeit der Extensoren der Brusthöhle, der Inspirationsmuskeln, und des hierdurch fixirten Uebergewichtes der Exspiratoren. Das Verhältniss beyder unter sich ist das Verhältniss der Streckmuskeln und der Beugemuskeln. So wie nun das Uebergewicht von Thätigkeit im natürlichen Zustande auf die Seite der Beugemuskeln fällt, bey dem Dehnen und Strecken der Glieder aber das Bestreben eintrit, jenes noch mehr herangewachsene Uebergewicht der Beugemuskeln durch eine fortdauernd vermehrte Anstrengung der Streckmuskeln aufzuheben, so ist das Gähnen nur das Bestreben durch successiv verstärkte Anstrengung der Thätigkeit der Inspirationsmuskeln, die im Contractionszustande beharrende, und der Ausdehnung widerstrebende Brusthöhle zu erweitern. Auch in den Lungen ist hierbey die contractive Bewegung vorwaltend, und diese wird nur mühesam überwunden. Daher wird das Einathmen lange fortgesetzt, bis die Ausdehnung der Brusthöhle vollkommen ist, worauf natürlich auch eine lange Exspiration folgt. Die Oeffnung der Mundhöhle, welche hierbey statt

findet, ist weniger die Folge des Bestrebens, eine grössere Quantität von Luft einzuathmen, als vielmehr der angestrengten Thätigkeit der Streckmuskeln auch der untern Kinnlade in ihrer Gelenkverbindung mit dem Oberkiefer. Das Gähnen so wie das Strecken der Glieder trit ein im Zustande der Schläfrigkeit kurz vor oder nach dem Schlafe, weil im Schlafe das Uebergewicht der Beugemuskeln über die Streckmuskeln zunimmt, der Schläfrige aber dieses aufzuheben bestrebt ist. — Das Niesen ist gegründet in einer heftigen, wahrhaft convulsivischen Bewegung des Zwergfelles, und der Exspirationsmuskeln: daher besteht es in einem heftigen, stossweise erschütternden Ausathmen, wobey besonders durch den Anstoss der erschütterten Luft an die Krümmungen der Nasenmuscheln ein Geräusche entsteht. Gewöhnlich entsteht das Niesen durch Reitzung der Schneider'schen Haut, vermöge der dynamischen Gemeinschaft zwischen Nasenhöhlenschleimhaut und Lungenschleimhaut. — Das Schluchzen hat seinen Grund in der convulsivischen Bewegung des Zwergfelles, und wird hervorgebracht durch alles, was den Gegensatz der beyden Oberflächen dieses Muskels, der seinen Antagonismus in sich selbst hat, mehr anzuregen im Stande ist: daher es öfters Affectionen der Abdominaleingeweide, besonders die gangraenescirende Entzündung derselben begleitet.

§. 504.

So wie das Gähnen, das Niesen und das Schluchzen vollkommen unwillkührliche Bewegungen sind, und besondere Modificationen der Gefässe-

bewegung des Thorax darſtellen; ſo bezeichnen dagegen das Lachen, das Seufzen und Weinen den Uebergang der Gefäſsebewegung des Thorax in die der Freyheit untergebne oder willkührliche Muskelbewegung: da am Thorax überhaupt die Naturnothwendigkeit des organiſchen Lebens mit der Freyheit des thieriſchen Lebens in Eins gebildet zuſammen trift. Den Uebergang von der unwillkührlichen, oder Gefäſsebewegung zur freyen, willkührlich beſtimmten Bewegung bildet die durch den Affekt und die Leidenſchaft beherrſchte Muskelbewegung: ſo in den Angeſichtsmuskeln, welche ſich die Affekte und Leidenſchaften allmählig unterwerfen, und durch die Geſtaltung der Geſichtszüge bleibende Spuren zurücklaſſen; daher die Phyſiognomik nur die Plaſtik der Affekte iſt, und das Organiſchwerden derſelben bezeichnet. Eben ſo ſind bey dem Lachen, Weinen u. ſ. f. die Bewegungen des Thorax in den Momenten des Ein- und Ausathmens durch Affekte beſtimmt: ſo iſt der Seufzer das lang fortgeſetzte, tiefe Einathmen, ohne Unterbrechung durch Ausathmen, von daher das Zeichen der Sehnſucht, und des nach Vereinigung mit dem All ringenden Gemüthes. Bey dem Weinen iſt das lange fortgeſetzte Einathmen durch häufiges ſtoſsweiſes Ausathmen unterbrochen, und dieſes daher das Zeichen des ſtiller Traurigkeit unterliegenden Gemüthes. In dem Lachen offenbart ſich durch den raſchen Wechſel des Ein- und Ausathmens, der expanſiven und contractiven Thätigkeit die muthwillige Aufgelöstheit des Gemüthszuſtandes, von welchem der nach Tiefe ringende Ernſt gewichen

ist. Da diese Affectionen der Muskelbewegung des Thorax durch Affekt und Leidenschaft bestimmt werden, so sind sie immer mit gleichzeitigen mimischen Bewegungen der Gesichtsmuskeln verbunden; und da in der Stimme und Sprache die höchste Freyheit willkührlicher Bewegung kund gegeben ist, so bezeichnen sie zugleich den Uebergang der Muskelbewegungen des Thorax beym Ein- und Ausathmen zur Bildung der Stimme.

Gattung III.

Ortsbewegung.

XX. Kapitel.

§. 505.

So wie die sichtbare Erscheinung der Irritabilität im Organismus Bewegung ist; so wird eine der Sensibilität untergebene und durch diese beherrschte Bewegung eine willkührliche genannt. Die Bewegung ist überhaupt Ausdruck der Freyheit und der idealischen Gestaltung des der Naturnothwendigkeit entzogenen Lebens. Die höchste Freyheit aber ist in der willkührlichen Bewegung; welche daher nothwendig Ortsbewegung, d. i. Befreyung von einem bestimmten Standorte, vom empirischen Raume ist.

§. 506.

Zur Gesamtheit derjenigen Bildungen, welche das Bewegungsorgan constituiren, gehören die Bewegungsnerven, das Muskelsystem, das Knochensystem, und die zwischen beyden mitten inne-liegen-

den oder Uebergangsbildungen, als Sehnen, fibröse Häute, Faserknorpel, wirkliche Knorpel.

§. 507.

Das Element der Muskelbildung ist das Muskelgewebe, und die diesem eigenthümliche Faser mit ihrer zellichten Scheide. Ausser den wirklichen Muskeln kömmt diess Gewebe nur noch in den Fleischhäuten vor. In den Muskeln aber ist es röther, derber etc.: jedoch ist die rothe Farbe keineswegs den Muskeln eigenthümlich; denn man kann durch fortgesetzte Maceration oder öfteres Abwaschen die Muskeln bleichen, und das rothe Pigment auslaugen. Die Muskelfasern mehrerer Thierclassen sind nicht geröthet, jene der Fische und Amphibien sind blass. Bey demselben Thiere sind die verschiedenen Muskeln ungleich colorirt. Es ist nur die zufällige Verbindung des Färbestoffs des Bluts mit dessen Faserstoff, was den Muskeln ihre rothe Farbe ertheilt. Der Typus der Bildung der Muskelfaser wiederholt sich auch in der Formation der Faserbündel und des ganzen Muskels selbst. So wie jede Muskelfaser in eine besondere zellige Scheide eingeschlossen ist; so ist jeder Fasernbündel mit einer eigenen Zellhaut, und auf gleiche Weise der Muskel selbst in der Gesamtheit mehrerer Fasernbündel, überkleidet. Für den Muskel ist diese Zellhaut, was für den Knochen das Periost. Auch bey jenen Thieren, bey welchen kein Zellgewebe in den Interstitien der Muskelfasern anzutreffen ist, sind die Fasern doch von einander getrennt, und jede zieht sich einzeln für sich zusam-

men. So wie nun jede Faser eine individuell gebildete und besonders für sich lebende ist, so lebt auch jeder Muskel als Individuum für sich und getrennt von dem Ganzen: denn es bestehet die Vollkommenheit der Bildung im Muskel- und Knochensysteme eben in der individuellesten und freyesten Entwickelung eines jeden. Dieses freye Leben jedes Muskels ist am deutlichsten daraus zu ersehen, dass kein Muskel dem andern in seiner Funktion vollkommen gleich ist, sondern wenn er unter gegebenen Umständen gewisse Thätigkeitsäusserungen desselben unterstützt, und somit demselben associrt ist, — in anderer Beziehung sich auch wieder als dessen Antagonist verhält. Nicht bloss jeder Muskel hat auf diese Weise seine aponeurotische Scheide um sich; sondern auch mehrere Muskeln zusammengenommen, z. B. jene, welche an den Extremitäten verlaufen. Solche äussere, oberflächliche, aponeurotische Ausbreitungen dienen den unterliegenden Muskeln zu Insertionsflächen; so wie bey den untern Thieren die Muskeln sich in die Haut inseriren: — sie verhindern das Ausweichen der Muskeln und ihrer Sehnen aus ihrer natürlichen Lage, und verstärken beträchtlich den Intensitätsgrad der Wirkung der in ihnen, als Scheiden, eingeschlossenen Muskeln. Wenn diese aponeurotische Scheidenhäute zerreissen, verwundet, oder durch Eiterung verzehrt werden, oder auch (da sie nur in einer bestimmten Richtung die Deflexion der Muskeln verhindern), wenn man einen Muskel in einer falschen Stellung irgend eines Gliedes zusammenzieht; so entstehen zuweilen Brüche einzelner Muskeln,

und der geringere Grad eines ſolchen Muskelbruches findet beynahe jedesmal in demjenigen Zuſtande ſtatt, welchen man gewöhnlich Verſtauchung oder Uebertrettung nennt.

Die Muskelfaſer iſt dem Faſerſtoffe des Blutes gleichgebildet. Wenn das Muskelfleiſch durch Auskochung oder Maceration alles Färbeſtoffes beraubt wird, ſo bleibt daſſelbe weiſſe, fadige Gewebe zurück, wie vom Blutkuchen, wenn aller Färbeſtoff von demſelben ausgelaugt iſt. Beyde ſind in demſelben Grade verſtickſtofft. Mit beyden verbindet ſich gerne der rothcolorirende Beſtandtheil des Bluts. Die Muskelfaſer bildet ſich überall nur im Gegenſatze der Nervenfaſer. Thiere, welche keine deutlich unterſcheidbare Nerven mehr beſitzen, ſind auch der ſichtbaren Muskelfaſern beraubt. — Jedes Muskelfäſerchen, ſo klein, und an der Grenze der mechaniſchen Theilung es beſindlich ſey, enthält noch einen Nervenzweig, ein arterielles, und ein venöſes Gefäſs. Vermöge dieſer urſprünglichen Gefäſseduplicität trägt jede Muskelfaſer einen freyen, ungebundnen Gegenſatz in ſich: — ſie iſt mit ſich entgegengeſetzten Electricitäten geladen, und ſomit, vermöge des hohen Grades der hier vorwaltenden electriſchen Spannung, expanſiver und contractiver Bewegung fähig. Die Contractibilität iſt alſo nicht ein Reſultat des höhern Gegenſatzes zwiſchen Nerven und Gefäſs in der Muskelfaſer: ſondern ſchon des Gegenſatzes zwiſchen arterieller und venöſer Gefäſsethätigkeit. Der Einfluſs des Nerven auf die Zuſammenziehung beſteht darin, daſs er die Zuſammen-

menziehung, Irritabilitätsäusserung, der Sensibilität unterordnet, indem diese durch ihn das Gleichgewicht der beyden Gefässethätigkeiten in der Muskelfaser aufhebt. Die Zusammenziehung wird daher eine unwillkührliche, wenn das Gleichgewicht der beyden Gefässethätigkeiten auf andere Weise, als durch den Nerveneinfluss, in einem Muskel aufgehoben wird, was bey Convulsionen, bey der Epilepsie etc. der Fall ist. — Gewiss ist es, dass die Muskelfaser weder bloss gefässeartig, noch einzig nervicht sey, wenn man auch nur das Volumen eines Muskels im Verhältniss der Grösse der Nerven oder Gefässe betrachtet, welche in dessen Bildung eingehen.

§. 508.

Da wo in dem Muskel der Gegensatz der beyden Gefässethätigkeiten, und der höhere Gegensatz zwischen Gefässethätigkeit und Nerventhätigkeit erlischt, geht das Muskelgewebe in das fibröse Hautgewebe über, und diese Metamorphose ist durch die Bildung der Sehnen, in welche die Muskelformation endet, bezeichnet. Aber die Fibern der Sehnen sind nicht unmittelbare Fortsetzungen der Muskelfasern, sondern die letztern sind bloss der Oberfläche der rundlichen Sehnen angeheftet und die Art und Weise dieses Adnexus trägt sehr vieles zur individuellen Stärke der Bewegungskraft eines Muskels bey. Die Sehnen und sehnigten Ausbreitungen sind bey der Muskelzusammenziehung, als der Gefässe und Nerven beraubt, auch keiner Verkürzung fähig.

§. 509.

Die Erſcheinungen an einem unter dem galvaniſchen Experimente, oder durch die Einwirkung von irgend einer andern Potenz, contrahirten Muskel ſind die folgenden. Die einzelnen Muskelfaſern verkürzen ſich, ſie ſchwellen an, dehnen ſich wieder aus, um ſich aufs Neue zuſammenzuziehen. Auf dieſen Wechſel von expanſiver und contractiver Thätigkeit, welcher eine Art von wurmförmiger Bewegung darſtellt, folgt endlich die wirkliche Zuſammenziehung, wobey der Muskel an der Dimenſion der Länge beträchtlich verliert, an Breite zwar etwas, jedoch nicht im Verhältniſs jenes Verluſtes, gewinnt, und folglich eine wahre Verminderung ſeines Volumens erleidet, dabey hart wird, indeſs eine beträchtliche Quantität von Wärme ſich entbindet. Die Verſuche von Gilisson beweiſen auffallend jene Verminderung des Volumens des Muskels im Contractionszuſtande. Der Niveau des Waſſers in einem Gefäſse, in welchem man den vorher ausgeſtreckten Arm beugt, fällt um vieles: jedoch iſt dieſs nicht bloſs eine Folge von der Verminderung des Volumens der Brachialmuskeln, ſondern auch von der Compreſſion des ihre Zwiſchenräume ausfüllenden Zellengewebes: — ſo wie auch zum Theil von dem gehinderten Blutlaufe; da während der Contraction eine kleinere Menge Blutes durch den Muskel flieſst als während der Ruhe.

Die Contractilität eines Muskels ſteht im direkten Verhältniſs der Anzahl und Gröſse ſeiner Nerven und Gefäſse, relativ zu ſeinem Volumen. Aus

diesem Grunde sind die Bewegungen des Zungenkörpers so leicht, so vielfach und ausgedehnt: — eben so verhält es sich mit der grossen Contractilität der Muskeln des Kehlkopfes etc. Eben so ist der Integritätszustand der Arterien, Venen und Nerven eines Muskels eine wesentliche Bedingung seiner Contractilität. Die Unterbindung oder Durchschneidung der Nerven eines Muskels lähmt denselben plötzlich. Auch die Unterbindung seiner Arterien bringt, jedoch etwas langsamer, Paralysis hervor. Auch die Unterbindung der Muskelvenen, und somit der fortgesetzte Aufenthalt des venösen, narcotisirenden Blutes in diesen, hat dieselben Folgen. So werden die unteren Extremitäten eben so wohl durch die Unterbindung der Aorte oberhalb ihrer Bifurcativusstelle, als durch die Ligatur der untern Hohlader an derselben Tiefe gelähmt.

Die Muskelzusammenziehung ist eine wahre Verbrennung des mit combustibeln Stoffen geladenen Muskels mittelst des Sauerstoffes des arteriellen Blutes. Die Verbrennung des Blutes durch die in dasselbe aufgenommene Aura oxygenea geht überall durch die ganze Progression des arteriellen Kreislaufes, jedoch nirgendswo so lebhaft als in dem Muskel vor sich: daher auch gerade in diesem der Eisenkalk des Bluts sich bis zu dem Grade oxydirt, um dem Muskel seine rothe Farbe zu ertheilen. Der wichtige Einfluss des Sauerstoffs auf die Muskelzusammenziehung erhellet auch besonders aus der Uebereinstimmung des intensiven Grades der Muskelstärke und der gleichzeitigen extensiven Ent-

wickelung des Respirationsprozesses. Die Muskeln eines Thieres sind um so mehr geröthet, die Contractilität derselben ist um so grösser, seine willkührlichen Bewegungen um so freyer und lebhafter, je ausgedehnter seine Respiration ist. Menschen, welche viele Muskelkräfte und den Athletenhabitus besitzen, haben breite Schultern, eine geräumige Brust, und eine starke, tiefe Stimme. Bey heftigem Laufen wird immer die Respiration vermehrt, und zuletzt keichend. Bey den Vögeln ist das Muskelfleisch derb, hart, hochroth, — bey den Fischen, deren Respiration so sehr unvollkommen ist, sind die Muskelfasern weiss, locker.

§. 510.

Die Zusammenziehung eines Muskels bringt eine Ortsveränderung Eines derjenigen Theile hervor, an welche seine Endigungen befestiget sind. Sind beyde gleich beweglich, so nähern sich beyde einander in beynahe gleichem Verhältniss. Ist dagegen der Eine von beyden unbeweglich, so erleidet bloss der andere eine Ortsveränderung. Es ist aber kein Theil absolut unbeweglich, sondern er wird es nur für einen bestimmten Muskel durch die überwiegende Thätigkeit seiner Antagonisten. So z. B. geben die Beckenknochen für die Ausstrecker des Kniegelenkes nur insoferne den unbeweglichen, oder Ruhepunkt, von welchem die Bewegung ausgeht, als sie selbst durch die Wirkung der Bauchmuskeln in ihrer Lage befestiget sind.

§. 511.

Die feſten Theile, welche am gewöhnlichſten dieſe Ortsveränderung durch die Zuſammenziehung der Muskeln erleiden, ſind die einzelnen Theile des Skeletes, oder die Knochen. Das Element der Knochenbildung iſt das dieſen Organen eigenthümliche Gewebe, das Knochengewebe. Sind gleich die Erſcheinungen der Vitalität, des Wechſels von Stoff, der Ernährung und Sympathie in dem Knochenſyſteme ſehr dunkel, ſo exiſtiren ſie doch darum nicht minder gewiſs.

So wie die Muskeln mit zellichten Häuten, oder aponeurotiſchen Ausbreitungen, ſo ſind die Knochen mit dem Perioſt umgeben. Die Beinhaut beſchränkt und beſtimmt die Knochenbildung, und daher wird die Vegetationsgeſtalt des Knochens irregulär, es entſtehen verſchiedenartige Auswüchſe, ein neuer Knochen, wenn die Beinhaut partiell oder im ganzen Umfang der Oberfläche von einem Knochen losgetrennt wird. Das Medullargewebe der Knochen iſt zwar nicht als eine unmittelbare Fortſetzung des Perioſts zu betrachten, ſie unterhält aber mit dieſem die genaueſte und innigſte Verbindung mittelſt der Nerven und Gefäſse.

§. 512.

In den Thierleib ſetzt ſich die Erde fort, und die Knochenbildung bezeichnet die Art und Weiſe, wie ſich jene in ihm vergegenwärtiget. Die harten Theile ſind das metalliſche, gediegene in ihm, und das ganze Bewegungsorgan iſt nur eine wiederholte

Conſtruction des Gegenſatzes zwiſchen dem harten und weichen. Das Knochenſyſtem iſt das höchſt-innerlich lebende; auf das vollkommenſte wohnt ihm die erſte der drey Einheiten ein; und ſo wie in der Schwere die verborgenſten Tiefen der Materie ſich aufſchlieſsen, und das Innerſte ſich kund giebt, ſo wird durch das Knochenſyſtem, zuletzt im Gehör, welches nur durch die härteſten Knochen möglich wird, die innerlichſte Bewegung in den Dingen, ihr Klang und deſſen Melodie wahrgenommen.

Da das Leben in den Knochen höchſt innerlich geworden iſt, ſo ſind ſie äuſſerlich ruhend. Die Art und Weiſe aber, wie ſie durch die Muskeln bewegt, und dieſem Ruhezuſtande entriſſen werden, zeigt deutlich an, das ganze Bewegungsorgan beſtehe nur durch den Ankampf der Electricität gegen den Magnetismus.

§. 513.

Das eigentlich Erdige im Knochen iſt die phosphorſaure Kalkerde, die von der Herrſchaft des Lebens ſchon bezwungene Erde. — Früher iſt der Knochen bloſs Knorpel, und urſprünglich nur Gallerte mit dem Perioſt umgeben: die platten Knochen ſind noch eine wahre Membran, ſo iſt der ganze Schedel nur eine hart gewordene Haut des Gehirnes. Aber ſchon jetzt iſt die Continuität der Bildung im Skelete an jenen Stellen, wo ſpäter die Gelenkhöhlen entſtehen, aufgehoben. Die Bildung der phosphorſauern Kalkerde trit nun in einigen früher und in andern ſpäter ein: — am früheſten

in den härtesten Knochen, auch hier wieder in den Gehörknöchelchen, welche die frühest - hart gewordenen sind. Die Verknöcherung ist aber nur ein Zurücksinken in die absolute Cohäsion; darum sind auch die Knochen nicht besondere Theile des Leibes im Gegensatz anderer Theile: — sondern alle Organe des thierischen Lebens sind der Verknöcherung unterworfen. Die Knochen sind nur die zuerst sich verknöchernden Organe. In der Progression des Lebens verknöchern sich immer auf's neue mehrere Knorpel, — zuletzt bey dem Greisen, der schon wieder ganz von der Erde übermächtiget ist, verknöchern sich selbst mehrere fibröse Häute, alles wird hart, selbst die Crystalllinse (cataracta senilis). Gleichzeitig nimmt das Verhältniss der Gallerte im Knochen immer mehr ab, dieser ist zuletzt ganz kalk - erdig, leicht, zerreiblich, gleich den Knochen der Vögel. Die Verknöcherung geht bey verschiedenen Thieren um so langsamer vor sich, je weniger das Leben in diesen gediegen, metallisch ist. Bey den Knorpelfischen bleibt das Skelet die ganze Lebenszeit bloss knorpelig; daher ist das Wachsthum dieser Thiere auch unbegrenzt; denn nur die Knochen setzen durch ihre Härte und den Mangel an Ausdehnbarkeit dem Wachsthum bestimmte Grenzen. Je mehr thierisch, irritabel, irgend ein Thier ist, desto härter, desto mehr aus phosphorsaurer Kalkerde gebildet sind dessen Knochen. So ist das Uebergewicht der phosphorsauern Kalkerde in den Knochen der Vögel weit grösser, als in jenen der Säugethiere.

Anmerk. Die Racchitis ist, so wie alle Reproductionskrankheiten überhaupt, eine Folge der depotenzirten absoluten Cohäsion, des Uebergewichtes, welches das Weiche über das Harte erlanget hat, weſswegen hier die Erdebildung, besonders im Knochensysteme, nicht gehörig vor sich geht, da die phosphorsaure Kalkerde theils in geringerer Quantität erzeugt, theils durch verschiedene Excretionsflüssigkeiten, besonders durch den Urin, ausgeführt wird, statt in den Knochen abgesetzt und in starre Bildung verwandelt zu werden. Immer ist hiebey Entzündung in den Knochen, besonders in den Wirbelbeinen; weſswegen die Gelenkende der Knochen anschwellen, und leicht Knochenbrand etc. entsteht. Entgegengesetzte Krankheiten sind das Podagra, die Arthritis, bey welchen die phosphorsaure Kalkerde und andere Salze in zu groſser Quantität erzeugt, und von der Herrschaft des Lebens nicht bezwungen werden können.

§. 514.

Die Verknöcherung ist nicht bloſs die Folge der Aggregation der Knochenerde im Knorpel. Da alles Ursprüngliche aus dem Contractionspole, gleichsam aus dem Centrum seiner Position, hervorgeht, sich expansiv gestaltet, und wieder in Contraction, und Hemmung seiner expansiven Metamorphose, endet; so beginnt auch die Osteogenie mit der Entstehung der Knochenkerne. Diese stellen den Contractionspol für die Knochenbildung dar, und enthalten die vorbildliche Möglichkeit der ganzen Metamorphose. Solche Knochenkerne entstehen in langen Knochen, da die Gestaltung derselben nicht zufällig, sondern eine höchst bestimmte ist, — gewöhnlich drey an der Zahl, zwey für die Epiphysen und Einer für die Diaphyse. Die zweyte Periode in der Osteogenie beginnt mit der Expansion

der Knochenkerne. Aus diesen laufen in excentrischer Metamorphose, strahlenförmig in den platten Knochen, in paralleler Richtung in den langen, die Knochenfasern aus. In den runden Knochen setzen sich diese in concentrischen Schichten als um den gemeinsamen Kern an. Die letzte Gestaltung enthält auch das Bildungsgesetz für die Harnsteine und andere Concretionen, welche wahre Verknöcherungen in solchen Flüssigkeiten sind. In der dritten Periode der Osteogenie entsteht der Gegensatz zwischen dem compacten und dem zelligen Gewebe des Knochens. So wie die Contraction nach aussen hin überall am thätigsten ist, so bildet sich das am meisten contrahirte, das härteste und compacteste Knochengewebe nach aussen. Nach innen aber ist die Expansion vorherrschend, und es bildet sich im Gegensatze des compacten das zellige Gewebe im Innern des Knochens. Die Knochenfasern und Lamellen bleiben dort von einander getrennt, und es entstehen, durch das Vorherrschen der Expansion, zuerst zellige Höhlen: so bildet sich die Diploe zwischen den beyden Platten der Schedelknochen; so das spongiöse Gewebe gegen die Gelenkende der langen Knochen hin. In der Mitte von diesen aber sinkt die Contraction immer mehr, da sich gleichzeitig die Expansion mehr ermächtiget, und so entsteht die innere mit dem Medullargewebe ausgekleidete Höhle in den röhrigen Knochen.

Manche Knochenkrankheiten haben nur in dem Einen oder dem andern dieser beyden Gewebe, einige in dem verschiedenen Verhältnisse beyder zu einander ihren Grund.

Die drey Perioden der Osteogenie, welche die Entstehung der Knochenkerne, die strahlende Expansion derselben in den Knochenfasern, zuletzt die Contraction des Knochens im compacten, seine Expansion im zelligen Gewebe und in der Knochenröhre bezeichnen, sind, jede einzeln für sich, in den höhern Thierclassen fixirt. Bey den Fischen und Amphibien kömmt es gleichsam nur zur Bildung der Knochenkerne, die strahliche Bildung der Knochenfasern fehlt ihnen; die phosphorsaure Kalkerde ist gleichförmig in ihren Knochen verbreitet, und überall mit Gallerte vermischt. Die Knochenbildung bey den Vögeln bezeichnet die zweyte Periode. Denn eigentlich fehlt ihren Knochen der Gegensatz des compacten und des zelligen Gewebes. Die Höhlen ihrer Knochen sind ohne Medullargewebe; keine eigentliche Knochenhöhlen, Markhöhlen, sondern sie sind Sinus, gleich denjenigen, welche sich in den Schedelknochen der Säugethiere, als Stirnhöhlen u. s. f. befinden, — eine fremdartige, von aussen eingedrungene, und die eigentliche Knochenbildung verdrängende Bildung. — Die wahre Knochenproduction ist auf die höhern, rothblütigen, oder Irritabilitätsthiere eingeschränkt. Die innern harten Theile der weissblütigen Thiere sind weder in ihrer Gewebung, noch in ihrer Gestaltung wahren Knochen zu vergleichen: sie sind auch niemals articulirt. Das sogenannte äussere Skelet, die Schaale, weissblütiger Thiere aber ist mehr eine Epidermoidalbildung. Man findet zwar darin phosphorsaure Kalkerde mit Gallerte verbunden. Aber das Eigenthümliche der Knochenbildung, die fibröse

und lamellöſe Geſtaltung, fehlt darin. Auch in Hinſicht der Art der Entſtehung, des Wachsthumes, in übereinanderliegenden Schichten, der periodiſchen Erneuung verhalten ſich die äuſſern, harten Theile der weiſsblütigen Thiere, ſo wie auch manche, der Subſtanz nach, wirklich knöcherne Grenzgebilde an der äuſſern Oberfläche der Fiſche, als Epidermoidalbildungen, und gehören mit den Nägeln, Klauen und Hörnern in eine Reihe, da in demſelben Verhältniſſe, als die individuelle Bildung der eigentlichen Cutis verloren geht, die Epidermis um ſo mehr hervortrit, und das Thier als Schaale zu umgeben beſtrebt iſt. Jedoch ſtellen ſie gewiſſermaſſen Uebergangsbildungen dar, indem ſich in ihnen die Epidermis deutlich zum Knochen zu erheben ſtrebt. Dieſer Uebergang iſt beſonders auch durch die Art und Weiſe bezeichnet, wie die Geweihe der Hirſche und der hirſchähnlichen Thiere mit dem Stirnbein zuſammenhängen, und deutlich Fortſetzungen dieſes Knochens ſind, ſo wie ſie von der andern Seite der Epidermis angehören.

So wie die wahre Knochenproduction nur den höhern oder Irritabilitätsthieren, welche die Thiere κατ' ἐξοχὴν ſind, zukömmt, ſo iſt auch die Verknöcherung den Organen des reproductiven oder vegetativen Lebens fremde. Selbſt im krankhaften Zuſtande verknöchern ſich dieſe nicht. So findet man niemals Schleimhäute, Drüſen wirklich verknöchert, obgleich ſehr verhärtet. Nur Knorpel, fibröshäutige und muskulöſe Bildungen ſind der Oſſification unterworfen. — Kein Organ des höhern, thieriſchen Lebens iſt ohne direkte Beziehung auf das Knochenſyſtem. Das Gehirn be-

ſtimmt die Bildung und die Vegetationsgeſtalt seiner knöchernen Umgebung, der Augapfel hat den entſchiedenſten Einfluſs auf die Bildung der Orbita. Das Gehörorgan hat ſich alle Knochen in ſeiner Umgebung unterworfen. Alle Muskeln, mit wenigen Ausnahmen, hängen mittelſt ihrer Sehnen mit der Knochenhaut zuſammen. Das Skelet gehört daher ganz den Organen des thieriſchen Lebens an, — und jene des organiſchen Lebens ſind ohne direkte Beziehung auf daſſelbe.

§. 515.

So wenig der einzelne Knochen eine Aggregation von Knochenerde; ſo wenig iſt das Skelet eine Aggregation von einzelnen Knochen. Ein Knochenſyſtem wird das letzte nur dadurch, daſs daſſelbe nach einem innern Princip ſich bildet und im Gegenſatze geſtaltet. — So wie der erſte Gegenſatz, der ſich am Thierleibe in der früheſten Bildungsperiode des Embryo hervorthut, der Gegenſatz zwiſchen Kopf und Rumpf iſt, und ſo wie dieſer Gegenſatz in dem eigentlich-Thieriſchen im Nervenſyſteme immer fortlebt, welches in das kugeliche Gehirn und das fadige Rückenmark auseinander geht; — ſo iſt auch der erſte Gegenſatz im Knochenſyſteme jener zwiſchen den Schedelknochen und den Knochen des Rumpfes. Der Schedel iſt das kugelich aufgetriebene Ende der Rückgratſäule. Die Schedelknochen ſind die härteſten unter allen: und die innere Platte iſt wieder mehr hart, ſpröde, erdig, (gläſern) als die äuſſere. In den Schedelknochen iſt die Subſtanz der Wirbelbeine

membranenartig ausgebreitet, und wie in allen Membranen ist ein Gegensatz der beyden Oberflächen, Platten, und eine indifferente, zellichte Zwischenbildung zwischen beyden, die Diploe. Gegen die Basis hin schlägt die Bildung der Wirbelbeine wieder vor: — die Warzenfortsätze entsprechen den Querfortsätzen, das Tuberculum des Hinterhauptes den Stachelfortsätzen; — der Basilarfortsatz des Hinterhauptsbeines ist ganz aus derselben schwammigen Knochensubstanz und nach derselben Form, wie die Wirbelbeine gestaltet; das Keilbein ist ganz ein verändertes Wirbelbein. Die grössere Härte, Compacticität und Festigkeit ist es besonders, wodurch sich die Schedelknochen von den Wirbelbeinen unterscheiden. So wie das Rückenmark ursprünglich knotig, in den Verknotungen der Rückennerven der untern Thiere vorgebildet ist, so bleiben die Wirbelbeine noch vereinzelt. Nur nach unten am Schwanzende des Rückenmarkes wachsen die Wirbelbeine wieder zusammen im Heiligenbeine. Je weiter sich aber nach unten das Rückenmark fadiggespalten in den Schwanzwirbelbeinen fortsetzt, desto mehr trit seine kugeliche Bildung im Gehirne — am obern Ende zurück; daher, so wie die Gehirnbildung energischer hervortrit, das Gehirn auch das Rückenmark mit sich in die Höhe zieht, so dass der unterste Theil des Canales der Wirbelbeine sogar leer zurückbleibt. — Die Wirbelsäule zerfällt wieder in sich selbst in mehrere Regionen, welche im Gegensatze gegen einander gebildet sind. Die Region der Halswirbelbeine stellt den Uebergang der Rückgratsäule zur Schedelbildung, die Region

der Lendenwirbelbeine den Uebergang zur Bildung des Schwanzes dar. Zwischen beyden befinden sich die Rückenwirbelbeine, an welchen die Rippen befestiget sind.

§. 516.

In den beyden Körperhälften, der obern und der untern, steht im Skelete der Bildung des Schedels jene des Beckens nur insoferne entgegen, als das Heiligenbein nach hinten in die Bildung der Beckenknochen mit hineingezogen wird, — und insofern zweytens das Geschlechtsystem einen Gegensatz gegen das Gehirnsystem bildet. Eigentlich sind aber die Darmbeine den Schulterblättern nachgebildet, und der horizontale Ast des Schaambeines den Schlüsselbeinen. Nur gehören das Schulterblatt und das Schlüsselbein schon mehr den obern Extremitäten selbst an, und wenigstens das erste folgt den Bewegungen des Oberarmbeines. So wie die Schulterblätter des Oberarmes von der Spina abstehen, so sind dagegen jene des Oberschenkels nach hinten mit ihr verwachsen, und die Beckenknochen fügen sich unter einander zu einer Höhle zusammen.

§. 517.

In dem Skelete bildet eigentlich die Wirbelbeinsäule den Stamm; alle Bewegungen der einzelnen Theile haben in ihr das gemeinsame Centrum; daher auch alle nur in etwas beträchtliche Erschütterungen bis zu ihr sich fortpflanzen. Da nun die Rückgratsäule allein die gesamte Last aller Bewegungen trägt, so vereinigt sie mit der gröfsten Fe-

ſtigkeit des Baues die gröſste Leichtigkeit und Vielſeitigkeit aller Bewegungen. Die erſte iſt ein Reſultat von der Breite der Gelenkflächen der Wirbelbeine — von der Länge, Richtung und Stärke ihrer Knochenfortsätze, — von der, groſsen Anzahl und Stärke der Muskeln und Bänder, welche ſich von einem Wirbelbeine zum andern erſtrecken. Die zweite entſpringt aus der groſsen Anzahl von Wirbelbeinen, aus welchen dieſe Säule zuſammengeſetzt iſt. Jedes einzelne für ſich iſt zwar keiner ſehr ausgedehnten Bewegung in ſeinen Gelenkverbindungen mit dem anderen fähig: aber die Beweglichkeit der ganzen Säule iſt gleich der Summe aller möglichen Bewegungen der einzelnen Wirbelbeine. Auch trägt zur Vermehrung derſelben die Ausdehnbarkeit der fibrös-cartilaginöſen Zwiſchenſcheibchen und der Gelenkbänder der Wirbelbeine vieles bey.

§. 518.

Bey der Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung der Wirbelbeinsäule fällt der Schwerpunkt weder in die Gelenkverbindung der ſchiefen Fortsätze der Wirbelbeine, noch in die Symphyſe ihrer Körper, noch in beyde zugleich, ſondern er fällt zwiſchen die Körper und das groſse Loch der Wirbelbeine. Bey der Flexion der Wirbelbeinsäule nach vorne nähern ſich die Vordertheile der Körper der Wirbelbeine einander, und das fibrös-cartilaginöſe Zwiſchenblättchen wird hier zuſammengedrückt; die ſchiefen Fortsätze gleiten übereinander, als wollten ſie ſich verlaſſen, und die Hintertheile der Körper entfernen: die ganze Wirbelbeinsäule beſchreibt

hier einen Bogen, dessen Convexität nach hinten, dessen Concavität nach vorne gekehrt ist. Bei der Ausstreckung der Wirbelbeinsäule geschieht hievon gerade das Gegentheil. Diese und die Krümmung derselben nach hinten wird durch die Stachelfortsätze der Wirbelbeine eingeschränkt, welche zugleich dazu dienen, die Vortheile der Hebeleinrichtung, unter welcher die Ausstrecker des Rumpfes sich befestigen, zu vermehren. Durch öftere übermäßsig starke Ausstreckung des Rumpfes in zarter Kindheit wird die Entwickelung und Ausbildung jener Stachelfortsätze verhindert, zugleich die Ausdehnbarkeit der Bänder der Wirbelbeine vermehrt, und somit eine gänzliche Flexion der Columne nach hinten möglich gemacht.

§. 519.

In den beweglichen Gelenkverbindungen sind immer die Gelenkköpfe der Knochen einer doppelten Bewegung fähig, der Beugung, und der Ausstreckung. Bey einigen geht die fortgesetzte Ausstreckung in eine neue Beugung nach der entgegengesetzten Richtung über. Die Gelenkköpfe der Knochen sind in ihren Reibungsflächen immer überknorpelt: und diese Gelenkknorpeln befördern auf doppelte Weise die Leichtigkeit der Bewegungen im Gelenke: erstens durch ihre Glätte und Politur, zweitens durch ihre grosse Elastizität, welche besonders durch die Richtung ihrer sehr kurzen Fasern, und deren Verlauf nach der fortgesetzten Axe des Knochens begünstiget wird. Ausser den Ueberknorpelungen der Reibungsflächen der Gelenkköpfe

der

der Knochen giebt es in einigen Gelenken noch gewöhnlich halbmondförmige, fibrös-cartilaginöſe Zwiſchenblättchen: beſonders in ſolchen Gelenkhöhlen, in welchen die Bewegungen der Köpfe der Knochen ſehr ausgedehnt ſind, oder welche einem heftigen Drucke unterliegen; ſo z. B. in der Gelenkverbindung der Kiefer, in jener des Schenkelbeines mit dem Schienbeine, in jener des oberſten Bruſtbeines mit dem Schlüſſelbeine. — Zur Leichtigkeit der Bewegungen in den Gelenken trägt auch die Synovialfeuchtigkeit vieles bey. Die Quantität derſelben richtet ſich überall nach der Gröſse der Gelenkhöhle, und nach der gröſſeren oder geringeren Ausdehnung der Bewegungen in derſelben. Ihrer Qualität nach betrachtet iſt ſie eine albuminöſe Flüſſigkeit, übertrift an ſpezifiquem Gewichte das Waſſer, ſie iſt farbelos und die klebrigſte unter allen thieriſchen Flüſſigkeiten. Der Eiweiſsſtoff, welcher in ihr in ſehr groſser Quantität vorhanden iſt, beſitzt einen hohen Grad von Gerinnbarkeit. Auſſerdem enthält ſie Kochſalzsäure und kohlenſaure Soda, und phosphorſaure Kalkerde.

§. 520.

Da in jeder Gelenkhöhle nur eine doppelte Bewegung möglich iſt: nämlich Streckung, wodurch die Axe des Einen Knochens in die Richtung der fortgeſetzten Axe des andern trit, oder Beugung, wodurch die Axen beyder Knochen ſich in einem Winkel gegeneinander neigen; — ſo ſind auch alle

Muskeln entweder Flexoren oder Extenſoren. Der allgemeinſte Gegenſatz im Muskelſyſteme iſt alſo der Antagonismus zwiſchen Beuge- und Streckmuskeln. Daſs der Gegenſatz zwiſchen Extenſoren und Flexoren, ſo wie jeder Gegenſatz der Kräfte, von electriſcher Art ſey, erhellet beſonders aus der Wirkung der einfachen galvaniſchen Kette, und der volta'ſchen Säule auf Extenſoren oder Flexoren, welche innerhalb des Kreiſes der einfachen, oder der verſtärkten Kette eingeſchloſſen ſind. Von den beyden Polen der Säule, und der einfachen Kette, welche entgegengeſetzte Electricitäten zeigen, iſt der negativ electriſche den Flexoren, der poſitiv electriſche den Extenſoren entſprechend. Flexoren werden nur contrahirt, wenn ihre Nerven, oder die ſie angehenden Theile derſelben, dergeſtalt im Kreiſe der Kette zugegen ſind, daſs ihr Cerebralende im Verlaufe dieſer dem Silber, ihr Muskelende dem Zink zugekehrt iſt. Extenſoren werden nur bey entgegengeſetzter Vertheilung der Pole contrahirt. Deutlich zeigt ſich hierin die electriſche Antitheſis in den beyderley Muskeln. — Ueberhaupt wirkt auch die einfache Kette, und eine mäſsig ſtarke Säule immer zuerſt auf die Flexoren, als die ſtärkern, präpotenten Muskeln, und erſt wenn die Irritabilität derſelben der Erſchöpfung nahe iſt, wirkt der Ueberſchuſs des Metallreizes zugleich, und zuletzt einzig auf die Extenſoren: ſo wie die Flexoren bey allen Todesarten früher ſterben als die Extenſoren, und daher der Menſch meiſtens in der gröſsten Streckung aller Gelenke ſtirbt. — Dagegen wirken ſehr ſtarke Säulen von 600 — 1000 — 2000 Platten-paa-

ren ſogleich bey der erſten Schlieſsung der Kette ſehr auf die Extenſoren, indem ſie die Irritabilität der Flexoren bey der erſten Entladung vernichten, und mit ihrem Ueberſchuſs auf die Extenſoren wirken. — Auch werden die Extenſoren immer bey der Trennung einer Kette contrahirt, bey deren Schlieſsung die Flexoren ſich zuſammenzogen, und umgekehrt: — ſo wie im Auge die Trennung immer die entgegengeſetzt - electriſche Farbe der Schluſsfarbe giebt, und in anderen Sinnesorganen die Senſation bey der Trennung der Kette in die umgekehrte von jener bey der Schlieſsung übergeht. — Eine und dieſelbe Kette wirkt alſo nie auf Extenſoren und Flexoren zugleich: beyde ſind ſich nicht allein durch die Art ihrer Inſertion, und durch die daraus hervorgehende Verſchiedenheit ihrer Wirkung, welche ſomit auf mechaniſchen Verhältniſſen und auf der Anordnung der Theile beruhet, ſondern ſie ſind durch die ihnen einwohnenden Grundthätigkeiten im Gegenſatze gegen einander. Da wo bey dem Schluſs oder der Trennung Einer Kette zugleich Extenſoren und Flexoren zuckten, war ſicher nicht Eine Kette, ſondern bey dem Umwege, welchen der galvaniſche Strom machte, bey der ungleichen Leitung etc. mehrere Bogen zugegen, ſo daſs zugleich Silber auf das Cerebralende des Bewegungsnerven des Beugers, und Zink auf jenes des Ausſtreckers wirkte.

§. 521.

Da nun überall im Organismus Gleiches das Gleiche hervorruft, selbst zu dem ihm gleichen wird; — so ist auch das Verhältniss des Bewegungsnerven zu dem Muskel im Beuger das umgekehrte von jenem im Strecker. Denn Nerve und Muskel bilden für sich allein, so lange sie in organischer Verbindung sind, mit der in ihren Gefäsen enthaltenen Flüssigkeit eine Kette: und nach Aldini's Versuchen wird diese durch die Berührung des Hirnendes des Bewegungsnerven mit dem Muskel oder auch mit dem Muskelende des Nerven geschlossen: woraus hervorgeht, dass schon im Bewegungsnerven das Hirnende und das Muskelende, und je zwey Punkte, welche innerhalb des Verlaufes des Nerven jenen beyden Endigungen entsprechen, Polarität gegen einander zeigen, und sich, wie die entgegengesetzten Metalle in einer galvanischen Kette verhalten. Bey den Flexoren verhält sich nun das Hirnende des Nerven zu dem Muskelende, und der Nerve selbst zu dem Muskel wie Silber zu Zink, wie das minder Oxydable zu dem Oxydablen. Bey den Streckern aber verhält sich der Nerve zu dem Muskel wie oxydables zu dem minder oxydablen. Es ist somit eine gänzliche Umkehrung der Polaritäten, wodurch sich Flexoren im Gegensatze der Extensoren bilden: — und diess ist die wahre Bedeutung des Gesetzes des Antagonismus im Muskelsysteme. So wie der Prozess der Muskelzusammenziehung, im Ganzen betrachtet, ein electrischer Prozess, ein Electricitätentladungsprozess ist; — so

bezeichnet in dieſem die Streckung wieder das magnetiſche, die Beugung aber vorzugsweiſe das electriſche Moment. Die Streckung iſt überall ein magnetiſcher Prozeſs, und ſtrebt, die Dimenſion der Länge vorzugsweiſe zu bekräftigen; das geſtreckte Glied gewinnt an Länge; — der tetaniſch im Momente der Streckung Erſtarrte nimmt beträchtlich an Länge zu. Bey der Streckung ſelbſt trit der Eine Knochen in die fortgeſetzte Richtung der Axe des andern: beyde ſtreben, den Gegenſatz der Gelenkköpfe in der Gelenkhöhle aufzuheben, und die Continuität herzuſtellen: — im Momente der Beugung aber neigen ſich die Axen der Knochen im Winkel gegen einander: — die vollkommenſte Berührung der Gelenkende der Knochen in der gröſsten Anzahl von Punkten findet im Momente der Streckung, die unvollkommenſte Berührung in den wenigſten Punkten — im Momente der Beugung ſtatt. In den Verſuchen von Campetti iſt auch die Beugung eines vorher geſtreckten Gliedes, und die Ausſtreckung eines vorher gebogenen für ſich allein im Stande, alle Polaritäten umzukehren. Bey Krankheiten afficiren daher die Krämpfe, welche toniſch, vorzugsweiſe magnetiſch ſind, immer mehr die, magnetiſchen, Streckmuskeln. Der vollkommenſte Krampf, tetanus, endet in die vollkommenſte Streckung aller Gelenke, wobey alle electriſche Polarität im Muskelſyſteme vernichtet wird, und daſſelbe zuletzt einem Magnete gleich gilt. Die cloniſchen Krämpfe aber, die Convulſionen, ſind vorzugsweiſe von electriſcher Art, und afficiren daher auch beſonders die, electriſchen, Beugemuskeln.

§. 522.

Eigentlich aber ſind Streckung und Beugung nur die beyden Hälften einer zertrennten Kreisbewegung, und, beyde vereint, ſtellen wieder den ganzen Kreislauf her. Die Beuger zeigen die electriſche Natur der Arterien, die Strecker die magnetiſche Natur der Venen: jene ſind die arteriellen Muskeln, ſo wie die Arterien, an den obern Theilen im Gegenſatze der untern, und an der rechten Körperhälfte im Gegenſatze der linken überwiegend. Die Strecker ſind die venöſen Muskeln, ſo wie die Venen, an den untern Extremitäten etc. überwiegend. Nichts gleicht der Stärke der Streckmuskeln des Kniegelenkes und der Stärke der Wadenmuskeln, welche die Strecker der Fuſswurzel ſind, an den untern Extremitäten des Menſchen. — Das Verhältniſs der Arterien zu den Venen, und der Gefäſse überhaupt zu der Fleiſchmaſſe des Muskels — iſt gröſſer in den Flexoren als in den Extenſoren. — Da aber, wo die Muskelbewegung die vollkommenſte iſt, ſind die Strecker und Beuger in wechſelſeitigem Gegenſatze alſo geordnet, daſs durch die Aufeinanderfolge der einzelnen Wirkungen derſelben das Kreiſige der Bewegung wieder hergeſtellt wird. So unterwerfen ſich auch die Muskeln des Augapfels dem Geſetze des Antagonismus der Extenſoren und Flexoren; jedoch ergreifen ſie den Augapfel von ſechs Seiten her auf ſolche Weiſe, daſs, wenn ſie ſich ſucceſſiv zuſammenziehen, z. B. bey Convulſionen, eine Art von Rollung des Bulbus entſteht. Kreisbewegungen einzelner Glied-

maſſen, — des Hauptes, der Zunge, — entſtehen auch bey verſchiedenen Krankheiten, z. B. im Veitstanze.

§. 523.

Die Stärke der Bewegungskraft, mit welcher ein Muskel wirkt, iſt nicht nach der Maſſe oder nach dem Gewichte deſſelben beſtimmbar. Denn Sehnen, Aponeuroſen, interſtitielles Zellengewebe vermehren das Gewicht eines Muskels bedeutend, ohne ſeine Bewegungskraft zu vermehren. — Sicherer wird ſie nach der Anzahl ſeiner Faſern beſtimmt. Denn die Stärke der Zuſammenziehung eines Muskels iſt gleich der Summe der Contractionen ſeiner einzelnen Faſern. — Die Bewegung, welche ein Muskel hervorbringt, iſt um ſo ausgedehnter, je länger ſeine Faſern ſind: — aber deſto geringer iſt auch die Kraft, mit welcher er wirkt. — Ueberhaupt aber iſt die Kraft, mit welcher ſich ein Muskel zuſammenzieht, nicht gleich der Gröſse der Bewegung, welche er hervorbringt. — Die Bewegung der Knochen durch Muskeln iſt als eine Hebelbewegung zu betrachten. Der Ruhepunkt des Hebels liegt nämlich in dem Gelenkende des Knochens, welches mindeſt bewegt, und daher relativ-ruhend iſt. Der Kraftpunkt iſt an der Inſertionsſtelle des Muskels in die Knochenhaut; der Laſtpunkt aber iſt durch die Länge des Knochens ſelber und die zugleich mit ihm bewegten Theile vertheilt. Unter den drey Arten des Hebels kömmt nun gerade die wenigſt vortheilhafte, diejenige, bey welcher am meiſten Kraft verloren geht, am öfterſten vor. Näm-

lich der Ruhepunkt befindet sich am Einen Ende des Hebels, der Kraftpunkt zwischen diesem und der Last, und zwar in der grössten Nähe des Ruhepunktes. Die meisten Muskeln ergreifen den zu bewegenden Knochen ganz nahe am ruhenden Gelenkende. Dabey geht nun allerdings sehr viele Bewegungskraft verloren, aber auch die mindeste Verkürzung der Muskelfasern bringt die ausgedehnste Bewegung hervor. — Von den beyden andern Hebelarten kömmt diejenige, bey welcher der Ruhepunkt in der Mitte ist, und an die beyden Hebelarme Kraft und Last vertheilt sind, beynahe nur in der Anordnung des Rollmuskels, die zweyte, bey welcher sich die Last zwischen dem Ruhepunkt und der Kraft befindet, einigemale, z. B. in der Insertion der Achillessehne an das Fersenbein, vor.

Es ist kein Gleichgewicht zwischen den antagonistischen Flexoren und Extensoren im Muskelsysteme. Sondern es fällt ein bedeutendes Uebergewicht von Grösse der Bewegungskraft auf die Seite der ersten. So wie die Arterie im Gefässesysteme vorherrschend ist, so sind es die Flexoren im Muskelsysteme. Sie sind die positiven, die Ausstrecker aber sind die negativen Muskeln. So wie auch der Hydrogenpol der volta'schen Säule der stärkere ist, welcher den heftigern Schlag giebt, die lebhaftere Farbe bringt. etc. Im Muskelsysteme nämlich ist das electrische Moment über das magnetische vorherrschend: — und da sich die Thätigkeit der Streckmuskeln zu jener der Beugemuskeln verhält, wie Magnetismus zur Electricität, so ist in diesem Verhältnisse das natürliche Uebergewicht der letzten

über die ersten gegründet. Nur durch groſse Anſtrengung der Extenſoren wird jenes Uebergewicht von Thätigkeit auf der Seite der Flexoren aufgehoben; daher ermüden, z. B. bey dem Aufrechtſtehen die Extenſoren ſehr bald, und werden ſchmerzhaft afficirt. Schwachen Menſchen aber brechen die Kniee ein; bey Ohnmachten hört plötzlich die Ausſtreckung in allen Gelenken auf, und im Schlafe, ſo wie bey jedem andern Ruhezuſtande, nehmen die Glieder wenigſtens eine halbe Beugung in allen Gelenken an.

§. 524.

Die Art und Weiſe, wie der Wille die Bewegung der Muskeln mittelſt der Nerveneinwirkung beſtimmt, iſt ein Problem, welches nur, indem es auf einen allgemeinern Ausdruck gebracht wird, lösbar iſt. Der Wille bewegt nicht allein den Muskel, ſondern er bewegt auch den ſchwingenden Pendel in der Hand, und der reine, feſte Willen verändert die Richtung ſeiner Schwingungen und bringt ihn augenblicklich zur Ruhe: — er bewegt den zwiſchen den Fingern gehaltenen Degen: ja der ſtärkere Willen des Einen wirkt durch den Andern, ſchwächern hindurch, und der Wille des Magnetiſeurs erweckt, leitet und unterdrückt die Vorſtellungen der Magnetiſirten. Einem reinen, ſtarken Willen iſt nichts unmöglich, und alle Kräfte ſind ihm unterworfen. Die Art aber, wie der Wille den Muskel beherrſcht, iſt ein wahres Einwirken der Idee auf die Materie. Nicht bloſs Materie wirkt auf Materie, und Körper auf Körper, ſondern die

Seele wirkt unmittelbar auf den Leib, und dieser auf sie zurück. Die Vorstellung wird unmittelbar zur Bewegung, und die Thätigkeit des Sinnesorganes wird unmittelbar zur Anschauung. Beyde verändern hiedurch ihr Wesen nicht; an sich sind sie gleich; die Vorstellung ist an und für sich mit der Bewegung Eines, daher das Eine Wesen beyder jetzt Vorstellung und jetzt Bewegung seyn kann. Die Materie denkt, stellt vor, und will. — Der Somnambulismus ist nur die innigste Vereinigung, die vollkommenste Durchdringung der Seele und des Leibes; er ist erst der rechte Organismus, wo kein Unterschied zwischen Seele und Leib mehr ist, und wo das Leibliche innigst und durch sich selbst beseelt ist. Daher ist dort auch keine Freyheit des Willens mehr und kein Bewufstseyn der Perception. Denn beyde stammen aus der Reflexion und Trennung. Der Somnambule hat keinen vom Ganzen getrennten Willen, und kein Bewufstseyn eigener Persönlichkeit. Dafs der Wille übrigens gewöhnlich mittelst des Nerven auf den Muskel wirkt, — beweifst doch wohl keineswegs, dafs er nothwendig an diefs Medium gebunden sey, und durch dasselbe hindurchwirken müsse. Entschieden geht die Macht des Willens weiter, als die Nerven reichen. Allerdings verhalten sich die Nerven als Leiter hiebey. Aber diese Leitung ist weder passiv, noch materiell, noch überhaupt mechanisch zu verstehen. So wie bey aller Leitung das leitende Medium dem zu leitenden Agens selbst identisch wird, so auch hier der Nerve. Es geht nichts durch ihn hindurch, auch kein Nervensaft, und wenn ein sol-

cher hindurchströmte, so wäre hiedurch auch für die Erklärung nichts gewonnen. Eben so schwingen die Nerven bey jener höchst immateriellen Leitung nicht; und wenn bewiesen werden könnte, dass sie schwingen, so folgte ebenfalls hieraus durchaus nichts zum Behuf einer Erklärung.

§. 525.

Dem Menschen ist die aufrechte Stellung natürlich: und sie kömmt eigentlich keinem andern Thiere zu. Die Aufrichtung des Hauptes ist eine Folge der Wegwendung von dem Irdischen, und Ausdruck des Strebens nach dem Himmlischen. Der Scheitelpunkt des Menschen ist am gestirnten Himmel: die Thiere sind mit gesenktem Haupte auf die Erde verworfen, damit sie grasen und auf der Weide gehen; aber des Menschen Haupt ist gegen die Sterne aufgerichtet und von der Erde weggewendet, auf dass er das Himmlische schaue, was in den dort verkörperten Ideen leuchtet. Eigentlich hat der Mensch die aufrechte Stellung von der Pflanze. Denn diese trägt ihr Haupt, die Blume, der Sonne entgegen. Sie strebt nach dem Lichte und ihr Leben ist das tiefste und verborgenste Sehnen nach dem Lichtprincip, welches sie ausser sich sucht. Aber das Thier, welches das Licht vollkommener und gebundener in sich trägt, theilt diese Sehnsucht nicht. Das Haupt jedes Thieres ist um so mehr gegen die Erde gesenkt, je mehr an diesem die Gehirnbildung beschränkt ist, und je mehr die Region der Kauwerkzeuge über jene des Gehirnes und der Sinnesorgane vorherrscht. Aber auch die hierin am

meiſten Menſchen-ähnlichen Thiere, Affen, Bären etc. ſind zum aufrechten Gange nicht ſo vortheilhaft, als der Menſch gebildet. Die Vögel ſtehen zwar auf zwey Füſsen, aber nicht aufrecht. Der Schwerpunkt ihres Körpers fällt zu weit nach vorne, und um dieſen zu unterſtützen, ſind ihre Füſse ſehr nach vorne gerichtet; groſs iſt die Beugung des Unterſchenkelbeines in der Gelenkverbindung mit dem Oberſchenkelbeine, groſs jene der Knochen der Fuſswurzel in der Gelenkverbindung mit dem Unterſchenkel.

§. 526.

Die aufrechte Stellung iſt nur durch ein Uebergewicht der Thätigkeit der Streckmuskeln der unteren Extremitäten, und des Rumpfes über die Thätigkeit der Beugemuskeln möglich; jedoch ſind auch die Beugemuskeln der Gelenke hiebey, beſonders bei gewiſſen Stellungen, nicht vollkommen unthätig. Das Stehen iſt vielmehr ein beſtändiges Wanken zwiſchen Beugung und Ausſtreckung, und ſomit iſt auch im Muskelſyſtem eine ſtetige Oscillation. Der menſchliche Leib verhält ſich hiebey als ein umgekehrter Pendel, der mit Einem Endpunkte an die Erde befeſtiget iſt, mit dem andern aber frey in die Luft emporragt, und in ſich entgegengeſetzten Richtungen ſchwingt. Bey dem Stehen muſs die perpendikuläre Linie, welche von dem Schwerpunkt des Körpers auf den Boden gezogen wird, auf einen Punkt innerhalb des Viereckes fallen, deſſen beyde offene Seiten durch die von Einer Zehenſpitze zur andern und von Einer Ferſe zur andern gezo-

genen Linien umſchrieben werden. Am feſteſten und ſicherſten ſteht man alsdann, wenn die perpendiculäre Linie, welche aus dem Schwerpunkte des Körpers auf ſeine Suſtentationsbaſis gezogen wird, genau der Axe des Körpers parallel iſt. Aber dieſe Linie kann die Axe des Körpers ſelbſt in einem beträchtlichen Winkel ſchneiden, und man ſteht darum doch immer noch aufrecht. Der Fall iſt aber unvermeidlich, wenn jene vertikale Linie auf keinen Punkt innerhalb der Suſtentationsfläche mehr trift, und man fällt immer auf diejenige Seite, gegen welche jene Linie ihre Neigung hat. — Der Schwerpunkt fällt bey den erwachſenen Menſchen in das Becken zwiſchen dem Schaambeinbogen und das heilige Bein, bey dem Kinde fällt er in eine weit höhere Abdominalgegend. — Wenn der Fall nach irgend einer Seite hin bevorſteht, und der Schwerpunkt nach dieſer Seite hin abweicht, ſo werden unwillkührlich diejenigen Muskeln angeſtrengt, und in Thätigkeit verſetzt, welche dem Körper die entgegengeſetzte Richtung geben; ſo z. B. bey drohendem Fall nach hinten die Ausſtrecker der unteren Extremitäten, und die hinteren Rückenmuskeln. Die Aktion der erſtern iſt hiebey ſo heftig, daſs hierdurch oft eine Fraktur der Knieſcheibe bey dem Fall nach hinten hervorgebracht wird.

Die aufrechte Stellung iſt für irgend ein Thier um ſo leichter, je mehr ſein Kopf auf der Wirbelſäule im Gleichgewicht ſteht, je mehr die Wirbelſäule, welche in der Richtung der Axe des Körpers verläuft, und an welcher gleichſam alle Eingeweide der Bruſthöhle und des Unterleibes ſuſpendirt ſind,

senkrecht auf dem horizontalen Durchmesser des Beckens zu stehen kömmt, und je mehr der Knochen der untern Extremitäten in gerade fortgesetzter Richtung miteinander articuliren. Auch bey dem Menschen finden diese Bedingungen nicht in den vortheilhaftesten Verhältnissen statt. Die Gelenkverbindungen des Kopfes mit dem ersten Halswirbelbeine entsprechen nicht dem Schwerpunkt des Kopfes; die Wirbelsäule wird nicht in senkrechter Richtung von dem Beckenknochen getragen, und die Knochen der unteren Extremitäten haben in allen ihren Gelenkverbindungen, in welchen sie sich mit convexen und schlüpfrigen Gelenkflächen berühren, eine Neigung gegen einander. Besonders gilt diess vom Kniegelenke. Bey manchen Wasservögeln, welche sehr lange aufrecht stehen, um unbeweglich ihre Beute zu erwarten, ist jene Articulation ganz anders construirt. Es befindet sich nemlich an der Kniegelenkfläche des Oberschenkelbeins eine beträchtliche Höhle, in welche ein zapfenförmiger Fortsatz des Schienbeins so aufgenommen wird, dass das Kniegelenk nicht gebogen werden kann, ohne dass jener Fortsatz aus seiner Gelenkshöhle hervortrete; was nicht ohne eine sehr gewaltsame Ausdehnung mehrerer Gelenkbänder geschehen kann. Das Stehen in aufrechter Stellung wird daher bey dem Menschen nur durch die Wirkung der Streckmuskeln erzwungen. Aber das natürliche Uebergewicht der Beugungsmuskeln über die Streckmuskeln macht aus diesem Grunde das Stehen beschwerlich, indem die Streckmuskeln bey weitem schwächer als die Beugungsmuskeln sind. Es bedarf

daher einer grofsen Anftrengung sämtlicher Extenforen, um den Körper aufrecht zu erhalten.

§. 527.

Aus diefem Grunde ift nun das Aufrechtftehen dem Kinde in den erften Lebensjahren unmöglich; denn das Kind hat nach vollendeter Geftationsperiode feine Metamorphofe durch die Thierreiche hindurch noch nicht fo weit durchlaufen, dafs die menfchliche Form vollkommen in ihm ausgebildet wäre. Der neugebohrne Menfch gleichet in Rückficht der Conftruction feines Muskel- und Knochenfyftemes mehr den Thieren, welche auf vier Füfsen gehen; noch mehr gilt diefe Analogie von dem noch ungebohrnen Fötus, und noch mehr von den früherern Bildungsperioden des Fötus während der Schwangerfchaft.

Das dynamifche Uebergewicht der Beugungsmuskeln über die Streckmuskeln ift im kindlichen Alter noch gröfser, als zu jeder andern Zeit; da das Muskelfyftem felbft fich im Zuftande der gröfsten Flexion aller Gelenke, bey der gebogenen Lage des Fötus in der Höhle des Fruchthälters, bildet. Die Disproportion in dem Volumen des kindlichen Kopfes ift gröfser, wodurch diefer, befonders wegen der minderen Energie der Wirkfamkeit feiner Extenforen, auf die Sternalfläche des Thorax herabfinkt, und dadurch eine Propenfion des Schwerpunktes nach vorne veranlafst. Gleiches gilt auch von den Eingeweiden der Bruft- und Bauchhöhle, welche bey dem Kinde ebenfalls von gröfferem Volumen find, als bey dem erwachfenen Menfchen,

und vermöge ihrer Propenſion nach vorne, da ſie alle mehr oder weniger durch eigene Ligamente an der Wirbelsäule ſuſpendirt ſind, dem kindlichen Körper das Uebergewicht nach vorne zu geben tendiren. Auch iſt bey dem Kinde die Wirbelsäule noch nicht Sigmaförmig gekrümmet; gewöhnlich beſchreibt ſie nur eine ſehr leichte Krümme nach hinten, welche von der Beugung des Rumpfes während der Schwangerſchaft herzurühren ſcheint. Durch dieſe Krümmung, deren Convexität nach hinten gerichtet iſt, iſt ſchon an und für ſich eine Propenſion des Körpers nach vorne eine nothwendige Folge; ſo wie auf der andern Seite die drey Krümmungen des Rückgrates in entgegengeſetzten Richtungen bey den erwachſenen Menſchen der Rückenwirbelbeinsäule eine gröſſere, fingirte Dicke geben, als ſie an und für ſich wirklich hat; ſo daſs nun der Schwerpunkt ſeine Stelle beträchtlich verändern kann, ohne dadurch ſogleich ein Uebergewicht des Körpers nach vorne zu beſtimmen. — Auch fehlen an der Rückenwirbelbeinsäule des Kindes die Dornfortsätze, und die Knochenſtücke der Wirbelbeine ſind nach hinten bloſs durch ein Knorpelblättchen mit einander verbunden. Die Dornfortsätze der Wirbelbeine dienen aber beſonders dazu, um die Bewegungskraft mehr vom Ruhepunkt zu entfernen, und ſo den Arm des Hebels der zweyten Gattung zu vergröſſern. Da nun bey dieſer Hebelgattung der Vortheil der Maſchineneinrichtung im direckten Verhältniſs der Länge des Hebelarms ſteht, ſo geht auch durch jene unvortheilhafte Inſertion der Extenſoren

tensoren wieder sehr viele Bewegungskraft verloren. Besonders aber zeigt sich die Analogie des Fötus mit den vierfüssigen Thieren in der eigenthümlichen Bildung des Beckens; da der Mensch das am vollkommensten gebildete Becken unter allen Thieren besitzt. Denn das kindliche Becken ist beynahe eben so gestaltet, eben so enge, und die obere Apertur schief abwärts geneigt, wie die Becken der meisten Säugethiere. Erst in der Folge erweitert sich das Becken, und seine Axe hat eine geringere Neigung gegen den Horizont. Die Folge von jener Conformation des kindlichen Beckens ist die, dass hier, so wie bey den meisten Säugethieren, die Eingeweide, welche später in der Beckenhöhle selbst enthalten sind, oberhalb der oberen Beckenapertur liegen, und daher zur Vermehrung des Volumens des Unterleibes vieles beytragen. Die Kniescheibe, welche die Wirkung der Extensoren des Unterschenkels bey den Erwachsenen so ansehnlich verstärkt, ist bey dem Kinde noch nicht verknöchert, sondern stellt lediglich ein fibrös cartilaginöses Gewebe dar. Dem Menschen erleichtert besonders die Breite der Sohlenfläche seiner Füsse den aufrechten Gang. Die Füsse des Kindes sind aber verhältnissmässig weniger breit, als die Füsse des Erwachsenen, und das Kind hat darum eine weniger grosse Sustentationsfläche. Die unvollkommene Entwickelung und Ausbildung der unteren Extremitäten bey dem Fötus ist begründet in der Art der Gefässevertheilung bey demselben: indem das Bauchstück der Aorte, ehe diese sich in die Arterien der unteren Glied-

maſsen vertheilt, die beyden Umbilicalſchlagadern abgiebt, welche beyde die bey weitem gröſsten Aeſte von ihr in dieſer Gegend ſind, — ſo daſs nur ſehr ſchwache Aeſte zu den unteren Extremitäten gelangen. — Das Kind gleicht alſo in der Conſtruction ſeiner willkührlichen Bewegungswerkzeuge mehr den vierfüſsigen Thieren, als dem Menſchen, aber man kann es darum doch nicht wohl mit Barthez für ein vierfüſsiges Thier erklären, ſondern es iſt nur ein noch unvollkommen gebildetes, und noch in der Metamorphoſe und weitern Entwickelung befangenes Thier.

§. 528.

Ohngeachtet nun das Kind nicht aufrecht zu ſtehen und zu gehen vermag, ſo iſt dennoch die aufrechte Stellung die naturgemäſse des erwachſenen Menſchen. Zwar entſpricht der Artikulation des Hauptes mit der Rückenmarksäule weder der Mittelpunkt noch der Schwerpunkt des Kopfes, indem jene Gelenkverbindung weit mehr dem Hinterhaupte nahe liegt, als dem Kinne. Aber ſie nähert ſich bey dem Menſchen doch mehr dem Schwerpunkte des Hauptes, als bey jedem Menſchen ähnlichen Thiere. Nämlich jene Artikulation befindet ſich immer zunächſt der Oeffnung des äuſſeren Gehörganges. Wenn man über dieſen eine verticale Linie auf die horizontale Lage des Schedels aufrichtet, ſo theilt dieſe Linie den Schedel ſelbſt in zwey Hälften. Bey fleiſchfreſſenden Thieren fällt die gröſste Aufwölbung hinter dieſe Linie, bey pflanzenfreſſenden aber vor dieſelbe: und daher haben die

letztern einen nur ſehr wenig entwickelten Hinterkopf. Bey dem Menſchen als einem von gemiſchter Koſt lebendem Säugethiere liegt der Schwerpunkt des Hauptes jener verticalen Linie zunächſt. Bey dem Menſchen ſind daher die ſehr vollkommen ausgebildeten Nackenmuskeln hinreichend, um den Kopf auszuſtrecken, und der geringen Propenſion des Hauptes nach vorne das Gleichgewicht zu halten; bey den meiſten Säugethieren aber bedarf es hiezu des hinteren Nackenbandes, an welchem das Haupt ſuspendirt iſt. Dieſes Ligament ſchlägt ſich an den Dornenfortsätzen der Halswirbelbeine und an der Hinterhauptsgräthe an, welches Tuberculum auch bey ſolchen Thieren mehr als bey dem Menſchen entwickelt iſt. — Die dreyfache Krümmung der Wirbelbeinsäule, die Geräumigkeit des Beckens, die Breite der Suſtentationsfläche des Menſchen, die Stärke ſeiner Extenſoren, des Rumpfes, und der untern Extremitäten, alle dieſe Bedingungen beſtimmen ihn zu der aufrechten Stellung. So zweckmäſsig er zu dieſer organiſirt iſt, ſo unſchicklich iſt ſeine Geſtaltung zu dem vierfüſsigen Gange. Seine vorderen Extremitäten haben bei weitem nicht die Länge und Stärke der hintern, und dieſer Unterſchied wird um ſo gröſser und auffallender, je älter der Menſch iſt. Auch geben die oberen Extremitäten dem Körper keine ſo feſte und ſichere Stüze wie die hinteren. Auch die Augen ſind bey dem Menſchen ſo geſtellt, daſs ſie bloſs für die aufrechte Stellung nach vorwärts, ſonſt aber bey dem Gehen auf Vieren zur Erde gerichtet ſind. Das Herz

liegt bey dem Menſchen nicht wie bey den auf Vieren gehenden Thieren mit ſeiner breiten unteren Fläche auf dem Bruſtbein, ſondern es ruht in ſchräger Richtung auf dem Zwergfell. Die beyden unteren Extremitäten, da ſie die einzigen Stützen des Körpers ſind, und deſſen ganzes Gewicht tragen, bedürfen einer groſsen Feſtigkeit, und dieſe kömmt ihnen vermöge ihrer ganzen Configuration zu. So wie ſie nämlich auſſen in ihren muskulöſen Umgebungen zwey Kegel darſtellen, deren Baſis nach oben, und deren abgeſtumpfte Spitze nach unten gekehrt iſt, ſo ſtellen ſie, im Skelete betrachtet, einen Kegel mit nach oben gekehrter ſtumpfer Spize, und mit einer breitauslaufenden Baſis nach unten zu dar. — Dieſe Zerſtückung trägt ungemein vieles zur Feſtigkeit und Tragefähigkeit der unteren Extremitäten bey; denn von zwey Säulen hat bey gleicher Maſſa und bey gleichem Durchmeſſer die kürzere die gröſste Feſtigkeit und Dauerhaftigkeit. Eben ſo ſteht auch unter übrigens gleichen Umſtänden bey hohlen Säulen die Feſtigkeit in direktem Verhältniſſe des Durchmeſſers der Höhle, und die Markhöhlen der langen fiſtulöſen Knochen der unteren Extremitäten tragen daher nicht weniges zur Feſtigkeit derſelben bey. — — Keine andere Artikulationen geſchehen in ſo ausgedehnten Gelenkflächen als jene der Knochen der unteren Extremitäten. Man vergleiche das Schultergelenk mit der Pfanne; — und nirgendswo berühren ſich in einer beweglichen Artikulation die Gelenkende der Knochen in ſo vielen Punkten als hier. Auch iſt es gerade bey der aufrechten Stellung, wo die Berüh-

rung in den zahlreichſten Punkten geſchieht. So iſt die wechſelſeitige Berührung des Kopfes vom Schenkelbeine und von der Pfanne niemals ſo vollkommen, als gerade bey dem Stehen.

§. 529.

Bey dem Stehen trägt das Schienbein allein die ganze Laſt des Körpers. Die Schienbeinröhre dient nur, um die zu groſse Abduction des Fuſses nach auſſen, und das Umſchlagen deſſelben nach dieſer Richtung zu verhindern. Daher richtet ſich die Gröſse der Krümmung der Schienbeinröhre nach der Ausgedehntheit und nach der öfteren Wiederholung jener Abduction des Fuſses.

Bey ſeinem aufrechten Gange trit auch der Menſch mit ſeinem ganzen Plattfuſse auf den Boden. Nicht nur erhält er hiedurch eine gröſsere Suſtentationsbaſis, ſondern auch die Gewalt des Stoſses, mit welchem der Fuſs bey verſchiedenen Bewegungen gegen den Boden angedrückt wird, vertheilt ſich bey der groſsen Zerſtückung der Fuſs- und Mittelfuſs- und Fuſswurzelknochen auf mehrere Gelenke, ſo daſs den Knochen der Schenkel und des Rumpfes eine ungleich geringere Erſchütterung hierdurch mitgetheilt wird.

§. 530.

Die verſchiednen Arten der willkührlichen Bewegung ſind unter die einzelnen Claſſen der Thiere vertheilt: in jeder Thierclaſſe iſt die Art der willkührlichen Bewegung derſelben der vollkommenſte Ausdruck ihrer Natur und Beſonderheit. So deutet

der Flug der Vögel auf die Vorherrschaft des irritabeln Systemes, und der Sensibilität in diesem Systeme; denn der Flug ist der geschwindeste unter allen Ortsbewegungen, und er fordert den gröſsten Aufwand von Muskelkraft. Auch sind die Vögel am wenigsten an einen fixen Aufenthaltsort gebunden; es ist die gröſste Freyheit in ihren willkührlichen Bewegungen. Das Kriechen der Amphibien und Mollusken stimmt mit der phlegmatischen Natur dieser Thiere überein: — so wie die unvollkommensten Thiere im Wasser leben, so ist auch das Schwimmen eine mehr passive, und die unvollkommenste unter allen willkührlichen Bewegungen. Die willkührlichen Bewegungen des Menschen sind die vielseitigsten. An einzelnen Arten derselben wird er von den verschiedenen Thierclassen übertroffen, deren einseitige Bildung eben durch die Stärke einer besondern willkührlichen Bewegung sich darthut, welche eben darum die andern, und vorzüglich ihre entgegengesetzte ausschlieſst. — Ausserdem ist das Gehen, und zwar das Aufrechtgehen, die angemessenste, und zwar die ausschliessend ihm allein zukommende, Ortsbewegung des Menschen.

Unverkennbar ist die Uebereinstimmung zwischen den einzelnen Arten der Sinnegewahrnehmung und den Ortsbewegungen der Thiere. So wie die höhern und edleren Sinne in immer gröſſere Entfernung und auſſer Berührung mit dem zu appercipirenden Gegenstande wirken; so ist es die gröſſere Geschwindigkeit, wodurch sich die Ortsbewegungen der vorzugsweiſse irritabeln Thiere von den übrigen unterscheiden. Was das Getaste ist in

der Reihe der Sinnesorgane, das ist das Kriechen unter den Ortsbewegungen; das Getaste selbst eine kriechende Bewegung der wurmartig gebildeten Finger am zu befühlenden Objekt. — Dem Geschmacksinn entspricht das Schwimmen: — die Zunge selbst schwimmt in der schmeckbaren Flüssigkeit. Der Geschmack ist der Sinn für das Flüssige: das Schwimmen die Ortsbewegung im Flüssigen. — Das Springen ist durch sich selbst die am meisten rhythmische und musikalische Ortsbewegung; daher es seine Vollendung nur im Tanze hat: welche Entwickelungsstufe das Gehörorgan in der Reihe der Sinne einnimmt, — solche hier der Sprung. Der Flug ist zuletzt pfeilschnell und beflügelt gleich dem Blicke des Auges, und beyde in gleich grosse Entfernung tragend.

Durch die beyden Reihen der Reproductionsthiere von der Einen und der Irritabilitätsthiere von der andern Seite ist das Schwimmen, das Kriechen (Springen) und das Fliegen jedesmal die auszeichnende Ortsbewegung einer besondern Classe, obgleich die verschiedenen Geschlechter verschiedene Ortsbewegungen haben, und dadurch die Wiederkehre aller Thierclassen in jeder besondern Thierclasse beurkunden. Die untersten Thiere, Polypen, wenn sie sich anderst von Gehäusen und andern Befestigungsorten loszureissen vermögen, eben so die eigentlichen Würmer, (welche nur die vollkommnere Entwickelung der jetzt erst eigentlich thierisch-gewordenen Polypen darstellen) schwimmen im Wasser, und wenn auch einige Geschlechter diess auf einige Zeit verlassen, so bewegen sie sich,

nur unvollkommen kriechend, an feuchten Orten mühſam fort.

Das Kriechen iſt die den Mollusken als ſolchen und den an ſie angereiheten Schaalthieren eigenthümliche Ortsbewegung; ſo wie der Flug jene der Inſekten. Die meiſten Inſekten haben Flügel, und die Flügelloſen ſind wenigſtens mit den zahlreichſten Füſsen verſehen, und der ausgedehnteſten Ortsbewegungen, z. B. der kühnſten Sprünge fähig. Die Larve iſt noch kriechend, aber der Schmetterling beflügelt.

Bey den höheren oder Irritabilitätsthieren iſt wieder das Schwimmen die der erſten Claſſe zukommende Ortsbewegung. Die Fiſche ſind auf das vortheilhafteſte zu dem Schwimmen organiſirt. Ihr von allen Seiten mit hervorſpringenden Winkeln verſehener Körper, ihre mit Gaſsazot angefüllte Schwimmblaſe, welche ſie nach Willkühr ganz oder zum Theil zu entleeren vermögen, ihre Schwimmfloſſen, Bruſt - Bauch - Rückenfloſſen etc. erleichtern ihnen die Bewegungen an der Oberfläche und innerhalb eines flüſſigen Mediums in hohem Grade. Die mit Stickgaſs erfüllte Schwimmblaſe giebt nicht nur dem ganzen Körper des Fiſches die zum Schwimmen erforderliche und ihm eigenthümliche Leichtigkeit, ſondern ſie macht auch, vermöge ihrer Lage in der Bauchhöhle nach aufwärts und gegen den Rücken zu, dieſen leichter, da er urſprünglich der ſpecifiſch ſchwerſte Theil des Fiſches iſt. Bloſs dadurch wird es möglich, daſs der Rücken des Fiſches nach oben ſchwimme: und ſo bald die Schwimmblaſe geborſten iſt, ſinkt der Fiſch mit dem Rücken um. Eigene

Musculi compreſſores drücken die Schwimmblaſe zuſammen, und treiben die darin enthaltene Luft durch einen beſonderen Canal in den Magen oder in den Oeſophagus, wenn der Fiſch in die Tiefe hinabſteigen will. — Fiſche, welche keine Schwimmblaſe beſitzen, müſſen entweder immer in der Tiefe des Waſſers leben, oder ſie liegen mit einer ſehr breiten Oberfläche dem Waſſer auf, und beſitzen ſehr breite und flache Schwimmfloſſen, mittelſt welcher ſie ſich mit groſser Anſtrengung ober dem Waſſer erhalten, und welche mit Recht Flügel heiſsen, indem der Fiſch mit ihnen eben ſo das Waſſer theilt, und in demſelben eben jene Bewegungen macht, wie der Vogel mit ſeinen Flügeln in der Luft.

§. 531.

Unter allen Thieren iſt der Menſch zum Schwimmen am wenigſten geſchickt, nicht wegen der Gröſse ſeines ſpecifiquen Gewichts überhaupt; (denn dieſs iſt, beſonders bei fetten Menſchen, bey emphyſematiſchen, tympanitiſchen Anſchwellungen, nicht um ſehr vieles gröſſer, als das ſpecifique Gewicht eines gleichen Volumens von Waſſer) ſondern wegen der ungleichen Vertheilung dieſes Gewichtes auf einzelne Theile des Körpers; der Kopf iſt der ſchwerſte Theil des menſchlichen Körpers, und es koſtet wirklich einen groſsen Aufwand von Muskelkraft, um denſelben bey dem Schwimmen aufrecht zu erhalten, was erforderlich iſt, um der Luft den Eingang durch den Mund, durch den Luftröhren-

heit der willkührlichen Bewegungsorgane mit einer dieſer ebenmäſsigen Ausbildung der Organe des Blutumlaufes und der Reſpiration, — mit geringerer Vollendung in der Bildung des Gehirnes und der Sinnesorgane — iſt eben das Auszeichnende in der Claſſe der Vögel. Daſs aber nicht nur das irritable Syſtem überhaupt, ſondern die Senſibilität in dieſem vorherrſchend ſey, erhellet beſonders aus der Gröſse und Stärke ihrer Bewegungsnerven verhältniſsmäſsig zur Gröſse des Gehirnes und der Sinnenerven von der Einen, und verhältniſsmäſsig zur Fleiſchmaſſe von der andern Seite. — Die Muskeln der Vögel ſind am ſtärkſten gefärbt, am dichteſten; ſie beſitzen den höchſten Grad von Reitzbarkeit, die ſich bey ihnen am längſten nach dem Tode erhält. Auch wirken ſie bey den willkührlichen Bewegungen mit der relativ-gröſsten Energie: — beſonders die Muskeln der vordern Extremität, unter ihnen die Bruſtmuskeln. Kein Muskel von gleicher Fleiſchmaſſe bey irgend einem Säugethiere wirkt mit ſolcher Bewegungskraft, wie jeder Muskel des Flügels bey dem Adler.

Die Flügelſchläge bey den Fliegen ſind von einer Gewalt und Andauer, welche kein anderes Thier ſeinen willkührlichen Bewegungen zu geben vermag. An den Flügeln der Vögel iſt der Oberarm der prävalente Theil. An allen Brachialnerven aber iſt während ihres Verlaufes am Oberarm die notive Polarität überwiegend, während ihres Verlaufes am Unterarm aber thut ſich die ſenſitive Polarität mehr hervor: ſie geben nun immer mehrere Hautnerven ab, da ſie vorher mehr Muskeläſte ab-

gaben. Die Vögel können nicht, ſo wie die Fiſche, vermöge der mit Stickgaſs anzufüllenden Schwimmblaſe, ſich ſpecifiſch leichter machen, als das Medium, welches ſie trägt: ſondern die groſse Quantität von Luft, welche ſie in ihren ſehr ausgedehnten Lungen und den Fortsätzen im Unterleibe und in den Luftcanälen in den Höhlungen der Knochen tragen, ſo wie ihre ſpecifiſch ſehr leichten Federn tragen nur dazu bey, ihre ſpecifique Schwere gegen jene der Luft in etwas zu vermindern: aber nur durch gewaltſame Anſtrengung überwinden ſie den Zug der Schwerkraft und ihr eigenes ſpecifiques Gewicht, welches ſie gegen die Erde zieht. Denn gewaltig preſst der Vogel die Luft unter ſeinen Flügeln zuſammen, und wird dann durch den Gegendruck dieſer elaſtiſchen Flüſſigkeit in die Höhe getragen. — Zuerſt ſchwingt ſich der Vogel in die Luft, indem er von der Erde aufſpringt, oder ſich von einer gegebenen Höhe herabſtürzt. Ein Vogel mit ſehr groſsen Flügeln, welche ſchwerer in ihrem ganzen Umfange auszubreiten ſind, kann ſich nur ſehr ſchwer von der Erde erheben; daher muſs ein ſolcher Vogel einen Anlauf nehmen, um nach und nach mit ſeinen Flügeln die Luft umzuſchneiden. Die Flügel breiten ſich nun in horizontaler Richtung aus, wie die horizontalen Floſsfedern der Fiſche. Der Oberarm wird aufgehoben, und von den Seitenwendungen des Thorax entfernt, dann ſchnell abwärts gedrückt. Die Elaſticität der Luft widerſteht der auf ſie durch den Flügelſchwung ausgeübten Compreſſion, und durch ihre elaſtiſche Reaction wird nun der Vogel in die Höhe getragen;

dabey macht der Vogel ſeine Flügel convex, ſich ſelbſt aber ſo klein als möglich, um deſto leichter den Widerſtand der Luft bey der Aſcenſion zu überwinden. Aber ſeine ſpecifique Schwere und jener Widerſtand der Luft würden ihn ſehr bald wieder zu Boden drücken, wenn nicht ſeine Bewegung durch einen zweyten Flügelſchlag auf's Neue accelerirt würde. Der zweyte Flügelſchlag folgt aber auf den erſten, noch ehe die Geſchwindigkeit der Bewegung, welche der Vogel durch den erſten Flügelſchlag gewonnen hat, vernichtet wurde. — Will ſich nun der Vogel im Fluge weiter erheben, ſo wird die Succeſſion der Flügelſchläge accelerirt; will er aber herabſteigen, ſo wird dieſelbe retardirt; — will er in gleicher Höhe ſchweben, ſo bleibt die Geſchwindigkeit in der Aufeinanderfolge der Flügelſchläge unverändert. Zuweilen überläſst ſich ein Vogel plötzlich dem Gewicht ſeiner Schwere, welches er nicht mehr durch die Thätigkeit des Flügelſchlages zu überwinden beſtrebt iſt: er fällt alsdenn in accelerirter Bewegung zu Boden: und auf dieſe Art ſchieſsen Raubvögel pfeilſchnell von groſsen Höhen zu Boden auf ihre Beute. Mitten im Herabſinken breitet oft ein ſolcher Vogel bey der Gewahrnehmung von irgend einer Gefahr plötzlich ſeine Flügel aus, um ſeine Schwere zu überwinden.

Die Auflöſung der Frage: ob der Menſch fliegen könne, beruht nicht ſowohl auf der quäſtionirten Möglichkeit der Erfindung einer Flugmaſchine; ſondern ſie wird ſchon dadurch ſchlechthin verneinet, daſs die Unmöglichkeit augenſcheinlich iſt, den Oberarmmuskeln des Menſchen ſo viele Kraft und

Stärke zu verleihen, daſs ſie die Flugmaſchine zu tragen und willkührlich zu bewegen vermöchten.

§. 534.

Die dem Menſchen und den Säugethieren eigenthümliche Art willkührlicher Bewegung iſt das Gehen, Springen und Laufen. Nur der Menſch geht aufrecht. Jedoch vermögen die hierin menſchenähnlichen Thiere noch leichter einige Schritte aufrecht zu gehen als zu ſtehen, da bey der aufrechten Stellung die Streckmuskeln längere Zeit ausſchlieſſend angeſtrengt werden, bey dem Gehen aber die Thätigkeit derſelben mit jener der Beugemuskeln abwechſelt. — Die Ortsbewegung der meiſten Säugethiere iſt aber noch mehr Sprung oder Lauf als Gang. Beſonders gilt dieſs von jenen, bey welchen ein auffallendes Miſsverhältniſs der Länge zwiſchen den vorderen und hinteren Extremitäten obwaltet. Bey dem wirklichen Gehen auf vier Füſsen werden immer nur Ein Vorderfuſs und Ein Hinterfuſs zugleich bewegt, und zwar abwechſelnd mit den beyden andern. Bald aber iſt es der vordere und der hintere Fuſs der nämlichen Seite, welche zugleich gebogen und zugleich ausgeſtreckt werden, bald verhält ſich dieſs umgekehrt.

§. 535.

Bey dem aufrechten Gange der Menſchen findet abwechſelnd Beugung und Ausſtreckung in den Gelenken der unteren Extremitäten ſtatt, und zwar ſo, daſs die ſtärkſte Flexion der Einen mit der ſtärkſten Extenſion der andern zuſammentrift. Bey

dem Gehen nämlich ſetzt man zuerſt den Einen Fuſs ſo, daſs auf dieſem Gliede der Schwerpunkt des Körpers unterſtützt wird; dann wird die zweyte untere Extremität in allen Gelenken, ſowohl in jenem der Pfanne, als im Knieegelenke, und im Gelenke des Unterſchenkels mit der Fuſswurzel gebogen: durch die Wirkung der Extenſoren wird hierauf die auf dieſe Weiſe in den Zuſtand der Flexion verſetzte untere Extremität nach vorwärts gezogen und hiebey extendirt. Wenn dieſs geſchehen und die zweyte untere Extremität feſt gegen den Boden angedrückt iſt, ſo wird der ganze Körper nach vorn getragen, ſo daſs nun der Schwerpunkt von dem zweyten Fuſse unterſtützt wird: und nun werden die Gelenke des erſten Fuſses gebogen etc. — Die progreſſive Bewegung des Schwerpunkts folgt nicht der geraden Richtung, ſondern ſie geht immer von der Progreſſionslinie des einen Fuſses zu der gegenüberſtehenden, und dieſer parallelen Progreſſionslinie des anderen Fuſses in einem wahren Zickzack. Vermöge der Obliquität des Schenkelbeinhalſes wankt der Körper bey dem Gehen immer von einer Seite zur andern, die Arme vertreten hiebey die Stelle von einer Gleichgewichtsſtange: daher erklärt ſich das Balanciren bey dem Gehen. — Natürlich kömmt bey jedem Schritte, welchen wir machen, ein Moment vor, wo der Schwerpunkt nicht mehr von dem ſchon aufgehobenen hinteren Fuſse unterſtützt iſt und noch nicht von dem vorderen Fuſse unterſtützt wird: folglich ſchwebend und ohne beſtimmte Unterſtützung iſt. Daher auch das

das Gehen für ein fortgesetztes Fallen mit Recht erklärt wird. — Die ungleiche Stärke in der willkührlichen Bewegung der beyden unteren Extremitäten, nämlich die Prävalenz des rechten über den linken macht, daſs die zu bewegende Laſt des Körpers bey der Progreſſion im Gehen immer mehr gegen den linken Fuſs hinfällt, als gegen den rechten. Daher weicht man im Gehen jedesmal etwas von der geraden Richtung gegen die linke Seite hin ab, und dieſe Abweichung von der geraden Direktion würde noch weit beträchtlicher ſeyn, wenn der Gehende, der ein fixes und bleibendes Ziel vor Augen hat, nicht abſichtlich wieder gegen jene Linie einlenkte. Daher gehen Blinde nie in gerader Richtung, und wenn ſie ſich innerhalb eines Viereckes befinden, und auf den Mittelpunkt der ihnen gegenüberſtehenden Seite ausgehen, ſo kommen ſie in einem Winkel des parallelogrammen Vierecks an. — Hinkende Menſchen, bey welchen ein Fuſs kürzer iſt, als der andere, fallen immer beträchtlich von der Direktionslinie gegen die Seite des kürzern und ſchwächern Fuſses hin ab, und ihre ſehr gewaltſamen Agitationen bey dem Gehen kommen bloſs daher, weil es ſie äuſſerſt viele Mühe und Anſtrengung koſtet, um die gerade Direktion nicht gänzlich zu verlieren.

§. 536.

Je gröſſer die Baſis des Fuſses iſt, deſto ſicherer iſt der Auftritt; auf einer beweglichen und un-

ſtät wankenden Fläche, wie z. B. auf einem balancirenden Schiffe, ſucht man daher vermittelſt der Entfernung der beyden Füſse von einander den Umfang der Suſtentationsbaſis zu vergröſſern: und von daher erklärt ſich der eigenthümliche Matroſengang. — Da der weibliche Fuſs im Durchſchnitt genommen eine kleinere Baſis, als der männliche hat, ſo gehen Frauenzimmer auch, um die Suſtentationsfläche zu vergröſſern, immer mehr mit ausgeſpreiteten Füſsen, als Männer.

§. 537.

Bey dem Gehen ruht die ganze Laſt des Körpers beſonders auf der Gelenkverbindung der Knochen des Unterſchenkels mit jenem der Fuſswurzel. Das ganze Gewicht des Körpers, welches bey Erwachſenen gegen 150 Pfund und bey fetten Menſchen von 400 - 600 Pfund beträgt, wird von den Aufhebmuskeln des Ferſebeines in die Höhe gehoben, nebſt allem dem, was noch ein Menſch mit ſich trägt, was bis auf zehn Zentner gehen kann, und dieſs ganze Gewicht ruht bey der fortſchreitenden Bewegung im Gehen auf dem Sprungbein. — Dieſs wird möglich durch die mechaniſche Hebeleinrichtung in jener Gelenkverbindung und in der Inſertion der Achillesſehne an das Ferſenbein. Denn hier ſo wie nirgendswo iſt die zweyte Hebelgattung auf eine ſehr merkwürdige Weiſe angebracht. Die Laſt liegt dem Ruhpunkte näher als die Kraft, und der Vorſprung, welchen das Calcaneum aus den Knochen der Fuſswurzel macht, dient noch mehr dazu, den Punkt,

an welchem die Kraft angebracht ist, von dem Ruhpunkte zu entfernen. Daher besitzen auch die bessten Fussgänger immer die breiteste Ferse, und die vollkommenst - ausgebildete Achillessehne, in welcher sich die Ausstrecker der Fusswurzel verlieren: — eben so gute Tänzer, Forcespringer &c. Menschen mit wenig hervorstehendem Sprungbeine, und mit langem, platten Fusse, sind gewöhnlich schlechte Fussgänger. Auch der rechte Winkel, unter welchem sich die Achillessehne an das Fersenbein anschlägt, trägt sehr vieles zur Verstärkung der Action der Muskeln bey, deren aponeurotische Verflechtungen jene Achillessehne bilden; so wie auf der anderen Seite die eigenthümliche Textur der Wadenmuskeln, z. B. des Sohlenmuskels, dessen schiefe, und kurz von einer Aponeurose zur anderen verlaufende Fasern zahlreicher als in irgend einem andern Muskel sind. Aus jener höchst energischen Wirkung der Wadenmuskeln erklärt sich die Möglichkeit von Queerbrüchen des Fersenbeines, und von Zerreissungen der Achillessehne, so wie die Zerreissung einzelner Fasern irgend eines Wadenmuskels nach langen Fussreisen.

§. 538.

Bey dem Springen werden die Extremitäten zuerst in allen Gelenken stark gebogen, und dann plötzlich und mit einiger Gewalt wieder ausgedehnt. Im Momente des Sprunges selbst, wo sich der Körper vom Boden erhebt, ziehen sich die Streckmuskeln beynahe krampfhaft zusammen. Auch die

Wirbelbeinsäule, welche vor dem Sprunge eingezogen und ſtark gekrümmt war, wird durch die Action ihrer Extenſoren bey einem heftigen Sprunge mit groſſer Gewalt ausgedehnt, und da ſie vorher den Bogen beſchrieb, ſo nimmt ſie nun die Richtung der Sehne an, welche jenen Bogen ſpannt. Die Elaſticität und die hiedurch bewirkte Reaction des Bodens oder desjenigen Körpers, von welchem ſich der Springer erhebt, trägt ſehr vieles zur Verſtärkung der Gewalt des Sprunges bey. Aber wie ſtark hiebey die Wirkung der Extenſoren, beſonders an den unteren Extremitäten, ſey, — erhellet ſchon aus der Beobachtung, daſs durch einen heftigen Sprung ſogar die Knieſcheibe fractuirt, das Band derſelben oder die Sehne der Ausſtreckmuskeln zerriſſen werden könne. Wenn man zu einem Luftſprunge einen Anlauf nimmt, ſo iſt die Geſchwindigkeit des Sprunges ſelbſt, welche von der Thätigkeit der Streckmuskeln herrühret, noch potenzirt durch die mitgetheilte Geſchwindigkeit des Laufes. Daſs wirklich auf dieſe Weiſe die Geſchwindigkeit einer Bewegung in dem erſten Zeitmomente auf die Bewegung im zweiten Zeitmomente übertragen werde, beweiſet die Schwierigkeit, ſich mitten im Laufe bey groſſer Geſchwindigkeit einzuhalten, wenn nicht die Geſchwindigkeit Gradweiſe vermindert wurde. —

§. 539.

Der Lauf iſt eine Wiederholung entweder von kurzen Schritten oder von kurzen Springen. Der Schwerpunkt bewegt ſich hiebey ſehr geſchwind von

einem Schenkel zum andern, und bey dem ſehr ſchnellen Laufe werden die Gelenke weit unvollkommner als bey dem Gehen gebogen, ſondern ſie beharren beynahe in der Extenſion. Da wegen der öftern Muskelzuſammenziehung bey dem Laufe das Blut ſehr desoxydirt wird, ſo wird zu gleicher Zeit die Reſpiration weit mehr frequent. Aber bey dem Laufe kann die Bruſthöhle nicht ſehr erweitert, und jedesmal nur eine ſehr geringe Quantität von Luft eingenommen werden, denn die Wandungen des Thorax ſtellen bey dem Laufe feſte Punkte zur Befeſtigung der Lenden- und Beckenmuskeln dar, damit durch dieſe Muskeln ihre Inſertionsflächen an den Beckenknochen ſelbſt wieder hinlänglich befeſtiget werden, um einen feſten Punkt für die Muskeln der unteren Extremitäten abgeben zu können. Daher wird nun die Reſpiration zu gleicher Zeit kurz und frequent, d. h. keichend. Bey dem Laufe giebt man dem Thorax ſogleich des Anfanges einen hohen Grad der Erweiterung, bey welchem er alsdann groſſentheils beharret, und welcher durch die kurze Inſpiration und Exſpiration nur ſehr unbedeutend verändert wird. — Bey dem ſehr ſchnellen Laufe berührt der Fuſs nur mit der Spitze der Zehen, nicht mit der ganzen Baſilarfläche der Sohlen den Boden. Wollte der Läufer mit der ganzen Fuſsſohle auftreten, ſo würde ſowol durch die hiezu erfoderliche Zeit, als durch die weit gröſſere, und im Verhältniſs der Oberfläche vermehrte Reibung die Geſchwindigkeit ſeiner Bewegung um vieles vermindert werden, — da ferner bey dem Laufe

der Schwerpunkt des Körpers wegen der unvollkommenen Flexion der Gelenke beträchtlich nach vorn überhängt, — so ist begreiflich, warum ein Läufer so leicht nach vorn umschlägt: um diess zu verhindern, wirft jeder Läufer den Kopf, den Hals und die Schultergegend zurück, und balancirt mit den Armen.

Der Mensch ist vermöge seines aufgerichteten Körpers, seiner langen unteren Extremitäten, welche beinahe die Hälfte des ganzen Körpers ausmachen, sehr vortheilhaft zu dem Laufe gestaltet: auch besitzt der Mensch im Naturzustande beinahe unter allen Thieren die gröſste Geschwindigkeit im Laufen: besonders zeichnet er sich hierdurch von den vierfüſsigen Thieren aus, welche vier Sustentationssäulen haben, und daher auf diesen sich langsamer fortbewegen. Aber wenn vierfüſsige Thiere mit groſser Geschwindigkeit zu laufen versuchen, so geschieht diess auch immer auf eine Weise, daſs sie je zwei ihrer Füſse zugleich bewegen, und so ihre Anzahl gewissermassen auf zwey vermindern, welches z. B. bey dem forcirten Galop der Pferde geschieht.

§. 540.

Da bey dem Menschen die untern Extremitäten allein die Organe der Ortsbewegung sind, und da schon die Kürze und die unverhältniſsmäſsig geringere Stärke seiner obern Extremitäten beweiſst, daſs sie, das Gewicht des ganzen Körpers zugleich mit den untern Extemitäten bey der Ortsbewegung

zu unterstützen nicht geeigenschaftet seyen; so sind diese zu andern Bewegungen, zum Ergreifen, zum Betasten, und zuletzt zur Gesticulation, und zur ursprünglichsten aller Sprachen, zur Zeichensprache, organisirt. Diese verschiedenen Bewegungen gehen bey den Thieren um so mehr verloren, je weniger ihre vordern Extremitäten handartig, und je mehr sie als Organe der Ortsbewegung z. B. bey den Vögeln als Flügel gebildet und gestaltet sind. Zugleich dienen alsdann andere Theile, z. B. der Rollschwanz zum Ergreifen — die Verlängerungen der Lippen &c. zum Betasten. — So wie die obern Extremitäten des Menschen von den untern an Muskelstärke, besonders von der Seite der Extensoren, übertroffen werden, so übertreffen sie dagegen diese bey weitem an der Leichtigkeit und Vielseitigkeit der Bewegungen, besonders jener, welche sich auf Flexion beziehen. Schon die Bewegungen im Schultergelenke sind ausgedehnter als jene im Pfannengelenke. Am Vorderarme ist aber die rotirende Bewegung des Radius um den Cubitus besonders wichtig, welche an den untern Extremitäten gänzlich fehlt. Die Handwurzel kann in ihrer Gelenkverbindung mit den Knochen des Vorderarmes nicht nur vollkommen gegen die Palmarfläche der Hand flektirt werden; sondern die Ausstreckung geht auch in eine Flexion nach der entgegengesetzten Richtung über. Alle Knochen der Handwurzel sind in ihren Gelenkverbindungen unter sich, obgleich etwas undeutlich verschiebbar. Auf das vollkommenste ist aber die Hand des Menschen zum Ergreifen und Betasten gebildet. Von den Thie-

ren mit ungespaltener Hufe, bey welchen der Eine Finger in einem Gehäuse von Horn eingeschlossen ist, durch die Geschlechter mit gespaltener Hufe, bey denen zuerst die Hand nach vorne in Finger zerfällt, durch jene, bey welchen immer eine grössere Anzahl von Zehen, und immer weniger durch hornartige Bedeckung eingeschlossen, hervorbricht, durch jene, bey welchen die Zehen noch durch die Schwimmhaut vereiniget sind, durch das Affengeschlecht, bey denen der Daumen zwar getrennt, aber keiner vollkommenen Abduction und Opposition fähig ist, und kein Finger einen eigenen Beuger oder Ausstrecker besitzt, so dass keiner einzeln für sich, sondern nur alle insgesamt bewegt werden, geht eine ununterbrochene Reihe von Bildungen, bis auf der höchsten Entwickelungsstufe die Hand des Menschen sich bildet. Diese ist durch die Länge der trichotomischen Phalangen der Finger, durch die vollkommenste Trennung des Daumens von den übrigen &c. ausgezeichnet. Denn der so bedeutende Gegensatz, welchen am Vorderarme die Speichenarterie gegen die Ellbogenbeinarterie, der Speichennerve gegen den Ellbogenbeinnerven bildet, und welcher der eigentlich - bestimmende Grund der Möglichkeit der Pronation und Supination ist, bestimmt auch den Gegensatz der Finger unter sich, so wie sich dieser in den Versuchen mit den Pendelschwingungen ober dem Nagelgliede der einzelnen Finger offenbart. An der rechten Hand verhalten sich Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger negativ, an der linken positiv; der Ringfinger und Ohrfinger verhalten sich negativ an der linken und

positiv an der rechten. Die Bewegungen des Daumens, Zeigefingers und Mittelfingers sind vorzugsweise vom Radialnerven beherrscht, jene der übrigen Finger vom Cubitalnerven, so wie der Radialnerve überhaupt der stärkere motive und der Cubitalnerve der stärkere sensitive Nerve ist. Der Daumen und der Ringfinger aber sind die stärksten, und geben die Gegensätze am reinsten und bestimmtesten an. Der Daumen ist aber der am meisten selbstständige und freiest-gebildete. Daher ist er auch der vollkommensten Abduction und Opposition fähig. Schwächer und nur im Gegensatze der Abductoren und Opponenten des Daumens sind jene des kleinen Fingers gebildet.

§. 541.

Da nun die Finger des Menschen nicht nur insgesamt durch gemeinsame Muskeln, sondern mehrere insbesondere durch eigene Muskeln beweglich, besonders aber Daumen und Ohrfinger der Abduction und Opposition fähig sind, da gleichzeitig die Bewegungen der Pronation und Supination statt finden, das Schulterblatt aber, an welchem das Oberarmbein eingelenkt ist, durch das Schlüsselbein verhindert wird, auf die vordere Seite des Thorax zu fallen; so ist der Mensch vor andern Thieren zum Ergreifen und Betasten auf das vollkommenste geschickt.

XXI. Kapitel.

Stimme und Sprache.

§. 542.

Die erſte und natürlichſte Sprache und diejenige, welche dem Stimmloſen und dem Tauben noch übrig bleibt, iſt die Gebährdenſprache. So wie die mimiſche Haltung des ganzen Körpers, ſo ſind es vorzüglich die Bewegungen der obern Extremitäten, die Geſticulation, welche beſtimmte Gedanken und Empfindungen ausdrücken. Aber jeder Theil des Leibes hat wieder ſeine beſondere Sprache: — ſo iſt das Auge beredt, wenn das Stimmorgan ſprachlos iſt. — Alle Sprache iſt Bewegung, inſofern dieſe Ausdruck des Gedankens und Gefühles iſt. Das Sprachorgan macht daher einen Theil des Bewegungsorganes aus, und ſtellt die höchſte Vollendung in dieſem dar. Daher auch das Organ des Gehöres, als das dem Sprachorgan gleichgeſetzte Sinnesorgan muskulös und knöchern iſt. Die Tendenz des Reſpirationsſyſtemes aber, ſich zum Stimmorgan und zum Organ der Sprache zu erheben, iſt durch jene Modificationen des Athemholens bezeichnet, welche Ausdrucksarten beſonderer Affekte und Gefühle ſind: als das Weinen, Lachen, Seufzen u. ſ. f.

§. 543.

Schon die unteren Thiere, beſonders viele Inſecten, beſitzen einigermaſsen Stimme, da ſie mit verſchiedenen Theilen ihres Körpers ein Geräuſch

machen, wodurch ſie einander rufen, ihre Bedürfniſſe, Triebe u. ſ. f. ausdrücken. Die eigentliche Stimme bildet ſich aber in den Reſpirationsorganen der höheren Thiere; die Fiſche ſind ſtumm, da ſie durch Kiemen athmen; nur Amphibien, Vögel und Säugthiere haben Stimme; die Vögel, ſo wie ſie alle andere Thiere an Geſchwindigkeit des Kreislaufes, der Reſpiration und willkührlichen Bewegung übertreffen, leben auch im Reiche des Geſanges und der Melodie. Die goldene Gabe der Sprache aber iſt nur dem Menſchen verliehen. — Die Stimme bildet ſich aus der exſpirirten Luft, welche durch die Muskeln des Ausathmens aus den Lungen in die Bronchien, aus dieſen in die Luftröhre, dann in den Kehlkopf getrieben, und dort durch die ſehr enge Spalte, welche zwiſchen den elaſtiſchen geſpannten Bändern übrig bleibt, durchgepreſst wird. Dadurch bildet ſich der Ton, der in der Mundhöhle ſeine weitere Modulation erhält. Die Luftröhre trägt ſomit, wenigſtens bey den Säugthieren und Amphibien, nichts zur Bildung der Stimme bey, ſondern ſie iſt nur ein Luft zuführender Canal, und das eigentliche Stimmorgan iſt der Kehlkopf, die Rachen- und Mundhöhle. Die Stärke der Stimme hängt von der Capacität der Lungen, verhältniſsmäſſig zur Weite der Stimmritze ab. Je mehr Luft die Lungen faſſen, eine deſto gröſſere Quantität von Luft kann in derſelben Zeit, folglich auch mit deſto gröſſerer Geſchwindigkeit durch die Stimmritze hindurch getrieben werden. Daher haben Menſchen mit breiten Schultern, mit geräumiger Bruſthöhle, immer eine tiefe, ſtarke Stimme. Nach Tiſche,

wenn die Eingeweide des Unterleibes an Volumen vergrössert sind, und die Bauchhöhle auf Kosten der Brusthöhle erweitert ist, wird die Stimme schwächer.

§. 544.

So wie die Amphibien das erste Entstehen der Lungenrespiration in der Thierreihe bezeichnen, und daher noch eine sehr unvollkommne Respiration besitzen; so ist auch ihr Stimmorgan, der Kehlkopf, noch sehr unvollkommen gebildet; er ist der Epiglottis beraubt, besitzt keine Ventrikeln, und keine Vocalsaiten: da ihnen die Lippen und das Gaumenseegel fehlen, so ist ihre Stimme auch nur wenig der Modulation fähig. Bey den Vögeln ist eine wahre Stimmritze an der Bifurcationsstelle der Luftröhre zugegen, und die Singvögel besitzen sogar im Innern der Bronchien kleine, freie, und der Vibration fähige Lamellen. Die Vögel sind im Stande, mittelst ihres untern Kehlkopfes allein schon Stimme hervorzubringen, sie können noch schreien, nachdem man ihnen bereits die Luftröhre durchschnitten, ja sogar den Hals abgeschnitten hat. Die Luftröhre ist daher bey ihnen keineswegs, so wie bey den Säugthieren und Amphibien, für die Bildung der Stimme verloren. Uebrigens ist die Bildung des untern Larynx bey den Vögeln sehr verschieden, und mannichfaltig: am vollkommensten ist er bey den Singvögeln gebildet, bey welchen er auch sowol im Ganzen als in seinen einzelnen Theilen durch zahlreiche Muskeln beweglich ist.

Die grosse Verschiedenheit der Töne, welche sie hervorbringen, entsteht dadurch, dass sie die un-

tere Stimmritze mehr oder weniger erweitern, oder verengern, daſs ſie die Luftröhre mehr verlängern, oder verkürzen, zuletzt, indem ſie auch die obere Stimmritze mehr oder weniger verengern. Bey dem Menſchen und bey den Säugthieren bildet ſich die Stimme nicht innerhalb der Luftröhre, ſondern erſt im Kehlkopf, und zwar bey dem Durchgange der Luft durch die Spalte, welche die untern Bänder des Kehlkopfes zwiſchen ſich laſſen: ſie wird verſtärkt durch die Reſonanz in denjenigen Höhlen, welche ſich in den Larynx öffnen; ſind dieſe aber zu ſehr erweitert, oder iſt die Membran zwiſchen dem Larynx und dem Zungenbein in wahre Beutel aufgetrieben, welche dem Larynx adnex ſind; ſo geht in ihnen die Stimme verloren. Zuletzt erhält dieſe ihre Modulation am Gewölbe der Mund- und Naſenhöhle, durch die Bewegungen der Zunge, der Lippen und des Gaumenſeegels.

§. 545.

Der Larynx iſt eine knorpelige Höhle am Eingange der Luftröhre; ſeine dünne und elaſtiſche Knorpel ſind mit Membranen überzogen, und werden durch die innerlichen Muskeln des Kehlkopfs bewegt. Zu unterſt ſitzt der ringförmige Knorpel, der gleichſam nur der Ruhepunkt der übrigen, und das Centrum ihrer Bewegungen iſt; daher er auch vielen jener Muskeln eine Inſertionsfläche darbietet. Auf ihm erhebt ſich der Schildknorpel nach vorne, und von hinten zu beyden Seiten die gieſskannenförmigen Knorpel, zwiſchen welchen beſonders die Stimmritze offen bleibt, in welcher die reſpirirte

Luft zur Stimme wird. Die Epiglottis ist aber hiebey nicht blos als ein Deckel zu betrachten, welcher die Stimmritze von oben her verschliesst, und etwa den über sie hinüber gleitenden Bissen zur Brücke dient, sondern die Epiglottis als ein elastischer, frey beweglicher Knorpel, trägt durch ihre vibrirende Bewegung vieles zur Modulation der Stimme bey. Die einzelnen Knorpel des Larynx sind untereinander mittelst Bänder verbunden, welche bald mehr angespannet, bald mehr erschlafft sind, und welche darum bald höhere, bald tiefere Töne geben. So wie der Larynx im Ganzen durch eigne Muskeln beweglich ist, und bald in die Höhe steigt, wie bey der Hervorbringung hoher Töne, und bald mehr herabgezogen wird, wie bey der Hervorbringung tiefer Töne, da im ersten Falle der Canal zur Modulation der Töne verkürzt, im zweyten Falle verlängert wird; so sind auch seine einzelnen Knorpelstücke partieller Bewegungen fähig, durch welche die Stimmritze bald mehr verengert, bald mehr erweitert wird. Gleichzeitig sind bey der Verengerung der Stimmritze die Vocalsaiten mehr angespannt; bey ihrer Erweiterung mehr erschlafft. Die eignen Muskeln des Kehlkopfs verhalten sich daher als Antagonisten untereinander. So bilden die Crycoarytenoidei laterales, und die Thyroarytenoidei, als Erweiterer, einen Gegensatz gegen die Crycotyroidei und den Arytenoideus als Verengerer.

§. 546.

Weder die Annahme von Dodart, dass sich die Stimmwerkzeuge wie ein blasendes Instrument

verhalten, noch die entgegengesetzte Behauptung von Ferrin, der Larynx sey als ein mit Saiten bezogenes Instrument zu betrachten, und die Bänder desselben tönten wie gespannte Saiten, — erklären hinreichend den Umfang z. B. der menschlichen Stimme. Solche musikalische Instrumente sind vielmehr ein unvollkommenes Analogon der Stimmwerkzeuge der Thiere, als daſs die Bildungsgesetze von jenen sich in diesen wieder finden müſsten. Auch ist das Stimmorgan des Menschen nicht etwa die vollkommenste Sprachmaschine; die Stimme, und die Sprache, welche die höchste Offenbarung des Lebens sind, können nicht aus einem todten Mechanismus begriffen werden. Dieſs erhellet schon aus den Veränderungen der Stimme in Krankheiten, welche unter die wichtigsten semiotischen Reflexionsmomente in diagnostischer und prognostischer Rücksicht gehören.

Der das Stimmorgan belebende Nerve ist der einzige seiner Art, — ein Verbindungsnerve des gangliösen und des Cerebralsystemes. Die galvanische Bewaffnung dieses Nerven bey Thieren mit dem positivelectrischen Pole, bringt einen hohen Ton, mit dem negativelectrischen Pol, dumpfen, heiſsern Schrey hervor. Die Durchschneidung des Stimmnerven von der Einen Seite allein macht die Stimme schwächer; — sie erlischt, wenn beyde Stimmnerven durchschnitten werden. Die Stimme gewinnt an Stärke und Modulation durch die Resonanz der Töne am Gewölbe des Gaumens, der Nasenhöhle und der Anhangshöhlen derselben. Daher,

wenn diese Theile krankhaft afficirt sind, die Stimme unangenehm verändert wird.

§. 547.

Die auf diese Weise modulirte Stimme nimmt endlich durch die Bewegungen der Zunge, des Gaumenseegels, und vorzüglich durch jene der Lippen, organische Gestaltungen an, und wird zur Sprache. In dieser aber ist die höchste Einheit des physischen und des psychischen. Das Wort ist nicht das Symbol des Gedankens; es ist der ausgesprochene Gedanke selbst. Die Sprache ist somit eine stets sich erneuernde Vermählung der Seele mit dem Leibe, der Idee mit der Materie, und wären nicht beyde dem Wesen nach Eines, und nur Manifestationen desselben absoluten Grundes, so wäre auch die Sprache des Menschen nicht zu begreifen. Das Problem über die Sprache erhält somit, gleich allen höheren physiologischen Aufgaben, seine Lösung nur durch die Anerkennung der absoluten Idendität, und des sich selbst gleichen Wesens aller Dinge. Es ist das Leben, was in der Rede von den Lippen tönt, und das gesprochene Wort ist nur der äussere Wiederklang der innern Einheit zwischen Seele und Leib. Natürlich ist die Sprache das ausschliessende Eigenthum des Menschen: nur da, wo die höchste Einheit des Physischen und des Psychischen erreicht ist, giebt sich diese im Wort und in Sprache kund. Auch sind die Sprachwerkzeuge des Menschen allein vollkommen entwickelt: diess zeigt sich in der Bildung der Kiefer, der Mundhöhle und

und der höchſt unvollkommenen, wenig beweglichen Zunge der meiſten Säugthiere. Bei den meiſten Arten von Affen ſind zwar die Sprachwerkzeuge, ſo wie bey dem Menſchen gebildet; allein bei dieſen Thieren iſt die zwiſchen dem Zungenbein, und dem obern Rande des Schildknorpels ausgeſpannte Membran ſakartig erweitert, und bey einigen in den Wandungen jener Taſchen verknorpelt, und ſogar verknöchert: daher bey ihnen die aus dem Larynx hervorgepreſste, ſchon tönende Stimme ſich in jenen Taſchen verliert, und dieſen Thieren fehlt es wirklich an Stimme, um zu ſprechen. Aber die Thiere würden dennoch nicht ſprechen, wären ihre Stimmwerkzeuge auch noch ſo vollkommen gebildet.

§. 548.

Die Sprache iſt die organiſche Geſtaltung der Stimme: jedes Wort iſt eine beſeelte, pſychiſch belebte Zuſammenſtimmung von Tönen: ein in ſich geſchloſsner und vollendeter Organismus, der ſein eignes Leben lebt. Der Geiſt bedient ſich des Hauches, um ſich auszuſprechen, indem der Hauch ſelbſt geiſtiger Natur, und ein Pneuma von anderer Art iſt. So wenig man nun ſagen kann, ein organiſcher Leib ſey aus einzelnen Organen zuſammengeſetzt, wobey ſich dieſe als Bruchſtücke zur Ergänzung eines beſondern Organismus vereinigten, ſondern ſo wie die Möglichkeit beſonderer Organe nur in und mit dem Organismus gegeben iſt, ſo iſt auch das Wort nicht aus Buchſtaben zu-

ſammengeſetzt: denn jeder Buchſtabe iſt nur ein eigenes, durch das Ganze belebtes, und durch die Bedeutung des Wortes beſeeltes Organ deſſelben. Die Freiheit und die ideale Bildung der Sprache drücken die Vocalen, für ſich tönenden Buchſtaben, aus: ſie haben ihr eignes unabhängiges Leben, und ſind das Eine Element der Sprache. Die Nothwendigkeit und das reale Element der Sprache aber ſtellen die Mitlauter dar, welchen die Freiheit des Lebens und der Bewegung verſagt iſt, und welche nur mit und durch die Vocale tönen.

§. 549.

Die Sprache iſt nicht eine willkührliche Erfindung der Menſchen; ſie iſt von göttlicher Art, und göttlichen Urſprunges; ſie iſt eine nothwendige, und die höchſte Offenbarung des Geiſtes der Menſchheit. Sicher giebt es auch eine Urſprache, in welcher das vollkommenſte Gleichgewicht der beyden Elemente der Sprache, und jedes Wort zugleich ein höchſt nothwendiger, und höchſt freier Ausdruck des Gedankens iſt. Alle andern Sprachen ſind jener Urſprache nachgebildet, das Gleichgewicht der Elemente iſt in ihnen aufgehoben, und ihr eigenthümlicher Character durch die Vorherrſchaft des idealen oder des realen Elementes der Sprache bezeichnet. So offenbart ſich die Poeſie und das Idealiſche der Bildung, in welchem die ſüdlichen Völker leben, durch die Frequenz und das üppige Tönen der Vocale in ihren Sprachen. Die nördlichen Sprachen dagegen ſind durch die

Frequenz der Consonanten ausgezeichnet, und auch darin offenbart sich der Realismus der nördlichen Völker. Der Gesang ist die Poesie der Stimme und Sprache: denn bey dem menschlichen Gesange werden gewöhnlich articulirte Töne, Worte, vorgetragen. Bey dem Gesange durchläuft die Stimme mit grosser Geschwindigkeit und nach bestimmtem Rhytmus die Skale der hohen, der tiefen, und der zwischen ihnen liegenden Töne. Die Muskeln des Kehlkopfes wirken dabey mit grosser Energie: der Grad der Verengerung der Stimmritze und der Anspannung der Ligamente des Kehlkopfes wird sehr schnell und vielfach abgeändert.

§. 550.

Der Geschlechtsunterschied offenbart sich durch die Verschiedenheit der Stimme, so wie er sich besonders in der Bildung des Kehlkopfes, und in der Region des Halses überhaupt ausspricht. Der Hals des Weibes ist länger, der Kehlkopf bey demselben steht höher, die Stimmritze ist mehr verengert, und die Elasticität der Saitenbänder ist grösser: die Brusthöhle ist weniger geräumig, überhaupt die Respiration mehr beschränkt. Daher besitzt das Weib eine Discantstimme, in welcher die Höhe der Empfindung, und das Leidenschaftliche der Gefühle sich ausspricht: die Stimme des Jünglings ist Tenor; jene des Mannes ist die Bassstimme, in welcher die männliche Kraft und Stärke sich kund thut. Wird die Castration in früher Lebensperiode unternom-

men, so wird hiedurch die dem Manne eigenthümliche Entwickelung des Stimmorganes gehindert, und die Stimme reicht zum höheren Tenor, zum Alt hinauf.

§. 551.

Bey dem Leisereden wird nur eine geringere Quantität von Luft und nur langsamer durch die Stimmritze und durch die Sprachewerkzeuge hindurchbewegt; — bey dem Bauchreden aber wird ohne sichtbare Bewegung der Lippen und der Zunge, vorzüglich durch jene des Gaumensegels, und zwar nicht nur im Momente des Ausathmens, sondern auch in jenem des Einathmens gesprochen.

XXII. Kapitel.

Thierische Wärme.

§. 552.

Unter diejenigen Offenbarungen des Lebens, welche vorzugsweise Attribute des irritabeln Systemes sind, gehöret besonders auch das Vermögen des organischen Wesens, selbstthätig seine Temperatur zu bestimmen.

§. 553.

Wie sich die Cohäsion zur Schwere verhält, so die Wärme zu dem Licht. Denn wie die Schwere auf doppelte Weise den Dingen eingebohren ist, als Schwere, — und dann wieder durch die Besonderheit der Dinge zu einem eigenthümlichen

Leben in ihnen gelangend, als Cohäſion, — alſo wohnt ihnen auch das Lichtprincip auf doppelte Weiſe ein. Von daher iſt die Wärme im Gegenſatz der Cohäſion, ſie iſt das anticohärente, verflüſſigende, vergaſsende, — das allgemeine Menſtruum der Dinge. Es giebt keine andere Auflöſung der Dinge als jene durch die Wärme, und das Eine löst das Andere nur auf ſolche Weiſe auf, wie die Wärme das allgemein-Auflöſende iſt. Der Proceſs der Wärme iſt darum auch der umgekehrte Proceſs der Schwere. So wie die Schwere die centripetale Tendenz an den Dingen iſt, ſo wirkt dagegen die Wärme in der centrifugalen Richtung. Wie kann als Manifeſtation der dritten, ſynthetiſchen, Dimenſion gelten, was einer ſo ſehr beſtimmten, der expanſiven, Richtung folgt, und ſeinem Weſen nach durchaus antithetiſch iſt? Wärme iſt nicht Versöhnung der Differenzen, Ausgleichung der Gegenſätze, ſondern ſie iſt das Entzündende der Gegensätze: und alle Affinitäten der Dinge unter ſich, welche doch auf dem Gegenſatz der Qualitäten beruhen, treten nur bey beſtimmter Wärmetemperatur hervor. Wärme iſt Ausdruck von Thätigkeit, — und zwar von der Thätigkeit des Beſondern, Einzelnen, welche jedoch auf andere überzugehen, und dynamiſche Gemeinſchaft zwiſchen den Getrennten herzuſtellen beſtrebt iſt. Darin iſt die Möglichkeit der Uebertragung der Wärme, darin ihr Streben nach Gleichgewicht gegründet.

Ein unmittelbares Verhältniſs hat die Wärme nur zu dem Lichte, nicht zur Schwere. Sie ſtammt aus dem Licht, und gehöret zu denjenigen Attribu-

ten der Dinge, welche Ausdruck ihrer Beſeelung durch das Licht ſind. Dasjenige, was im Prozeſs der Wärme der Schwere entſpricht, iſt die Kälte: denn ſo wie es einen Erwärmungsprozeſs giebt, ſo giebt es einen Erkältungsprozeſs. Beide ſind die ſich entgegengeſetzten Manifeſtationen eines und deſſelben Grundes. Es iſt aber eine höchſt verwerfliche Anſicht, die Kälte blos als Entziehung von Wärme, als Privation derſelben zu betrachten. Kälte und Wärme ſind nicht blos quantitative Verſchiedenheiten einer der Zu- und Abnahme fähigen arithmetiſchen Gröſse; es iſt ein Gegenſatz der Qualitäten zwiſchen ihnen: die Kälte iſt ein Cohäſionsprozeſs: die Wärme ein Anticohäſionsprozeſs. — Die Wärme, inſofern ſie allgemeines Menſtruum der Dinge iſt, und dieſe auflöst, wird ſelbſt mit ihnen Eines, ſo wie dieſs der Begriff der Auflöſung iſt: ſie iſt inſoferne latente Wärme. Wenn der vorher aufgelöste Körper erſtarrt, trennt er ſich von dem Menſtruum, und die Wärme wird frey. Dagegen iſt die Verflüſſigung ſtarrer Körper und die Vergaſsung der flüſſigen nur inſoferne möglich, als ſie das Menſtruum in ſich binden, und mit der Wärme Eines werden. Nur indem die Wärme ſich die Körper aſſimilirt, werden dieſe flüſſig oder vergaſst. Der Durchgang der Materie durch die Elementarformen des Seyns, Starrheit, Flüſſigkeit und Luftform iſt ſomit nur durch das Binden der Wärme möglich. Die Temperatur jedes Dinges iſt durch die freye Wärme beſtimmt, welche daſſelbe in ſich nicht zu binden vermag. Capacität aber iſt das Vermögen der Körper, die Wärme in ſich zu binden,

und somit ihre Thätigkeit von der allgemeinen Thätigkeit zu isoliren.

§. 554.

Wärme ist die Identität des Lichtes und der Schwere, aber innerhalb der Potenz der Electricität: von daher ist jeder Wärmeerregungsprozess Electricitäterregung. Wärmeleitung ist ein electrischer Leitungsprozess. Der Satz: das organische Wesen erzeugt die Wärme in sich — ist gleichbedeutend dem Satze: das organische Wesen trägt in sich die Identität von Schwere und Licht, reflectirt in der zweiten Dimension. Denn so wie innerhalb der Atmosphäre der Erde die Wärme nur entsteht durch den Gegensatz zwischen Sonne und Erde, so hat das organische Wesen, welches das Centrum seiner Position in sich selbst trägt, und Mittelpunkt und Umkreis zugleich ist, den Quell der Wärme in sich selbst. Das Vermögen, die Wärme in sich zu erzeugen und sie zu binden, sich selbstthätig seine Temperatur zu geben, ist das Zeichen der cosmischen Vollendung am organischen Wesen. Das irritable System ist aber vorzugsweise jenes der Wärmeerzeugung: denn die Wärme ist Identität des Lichtes und der Schwere innerhalb der zweiten Potenz. Das Thier, da es ein mehr irritables Leben lebt, ist von daher auch vorzugsweise Wärme erzeugend: die Pflanze ist kalt; denn sie lebt durch den allgemeinen Erdmagnetismus. Unter den Thieren sind wieder die untern oder Reproductionsthiere kalt; ihre Temperatur ist nur wenig von der Temperatur des sie umgebenden Mediums verschie-

den. Je mehr irritabel, thierisch eine Thierclasse ist, desto höher steht ihre Blutwärme; es sind die Organe, welche vorzugsweise dem irritabeln System angehören, zugleich die Heerde der thierischen Wärmeerzeugung, das Gefäſsesystem, das Respirationssystem, und das Muskelsystem. Aus dem Blut erzeugt sich die thierische Wärme, und nicht im Nerven: der Nerve ist kalt, und wo kein Blut ist, da ist keine Wärme. Alle Irritabilitätskrankheiten äussern sich durch Veränderung der Temperatur; Fieber, Entzündungen und Exanthemen: alle sind phlogistisch; alle fodern die antiphlogistische Behandlung. Keine andere Krankheit, weder Sensibilitätskrankheit, Nevrose, noch Reproductionskrankheit, verändert ursprünglich die organische Temperatur. Das Fieber ist selbst nur ein Freywerden aller latenten Wärme. Eben so haben auch alle Irritabilitätskrankheiten nur Einen Ursprung, Veränderungen der Temperatur der Atmosphäre, und solche Veränderungen der Atmosphäre vermögen weder eine Nevrose, noch eine Reproductionskrankheit hervorzubringen. — Das irritable System ist also vorzugsweise jenes der Wärmeerzeugung. Die thierische Wärme erzeugt sich aus dem Blute, durch die stetigen Zersetzungen und Mischungsveränderungen, welche dasselbe erleidet. Die Wärme ist vorzüglich das Product der stetigen Verwandlung des arteriellen Blutes in venöses, und des venösen Blutes in arterielles. Entschieden ist die Veränderung, welche das Blut in den Lungen erleidet, eine Bedingung zur Erzeugung der thierischen Wärme, obgleich nicht die nächste oder die einzige Ursache

derselben. Die Temperatur jeder Thierclasse stimmt auf das genaueste mit der extensiven und intensiven Entwicklung ihres Respirationssystems überein. Der menschliche Fötns ist gewissermassen kaltblütig, so lange er nicht durch Lungen, sondern durch die Placenta, ein kiemenartiges Gebilde, athmet. — Jeder Veränderung der Temperatur des menschlichen Leibes ist eine gleichzeitige Affection des Respirationssystems entsprechend. Aber schon die Beobachtung, daſs das Blut kälter aus den Lungen zurückkehrt, als es dahin gelanget ist, beweiſst, daſs die thierische Wärme nicht in den Lungen unmittelbar erzeugt werde.

§. 555.

Die Erzeugung der thierischen Wärme fällt besonders in das Capillargefäſsesystem der Organe, überall dahin, wo die Verbrennung der phlogistischen Stoffe durch die Aura oxygenea des Blutes, und die Bildung der Oxyde vor sich geht. Denn die Erzeugung der Wärme in thierischen Organismen ist durch die Verwandlung des Luftigen in Halbgaſs, des letzten in Flüſsiges und durch die Verwandlung des Flüſsigen in Starres bedingt. Einerseits ist also die Aufnahme verschiedener Gaſsarten durch Einsaugung, sowol in den Lungen als an der Oberfläche der Haut eine Quelle der thierischen Wärme. Da jedoch das in das Blut aufgenommene Sauerstoffgaſs sich in dem Zustande eines Halbgaſses behauptet, und andererseits die Consumtion von Wärme durch Ausdünstung an jenen Oberflächen bedeutend ist, so trägt die Aufnahme luftförmiger Stoffe in das Blut wenig zur Erhöhung der organi-

schen Temperatur bey. Der eigentliche Quell der thierischen Wärme ist die Capacitätverminderung des Blutes, da wo es den arteriellen Character verliert und den venösen annimmt, — im Capillargefässesystem: — dann die Absonderung verschiedener Flüssigkeiten vom Blut, welche ebenfalls eine geringere Capacität besitzen, zuletzt die Ernährung der Organe, wodurch Flüssiges in Starres umgewandelt wird. Besonders ist die Muskelzusammenziehung, und die Veränderung, welche durch diese das Blut erleidet, mit Entbindung einer grossen Quantität vom Wärme verbunden. Auch die Auflösung der Speisen in den Verdauungssäften, die Verwandlung des Chylus in Lymphe und der Lymphe in Blut ist ein Quell der thierischen Wärme. Die Wärme aber wird im thierischen Lebensprocesse consumirt durch die Verflüssigung des Starren, bey der interstitiellen Absorption, durch die Verdünstung thierischer Flüssigkeiten, durch die Bildung verschiedener Gasarten, als der Intestinalgasarten, u. s. f. Sie wird gebunden durch Capacitätsvermehrung des thierischen Stoffes. Das Gleichgewicht der thierischen Wärme ist also ein Gleichgewicht der Wärmeerzeugung und der Wärmeconsumtion.

§. 556.

Alles Organische hat seine bestimmte nur innerhalb gewisser Grenzen veränderliche Temperatur; diese ist selbst nur der Ausdruck der Intensität seines irritablen Lebens. Schon die Pflanze hat ihren specifiquen Wärmegrad in der Umgebung mit der relativ kältesten Atmosphäre. Des Winters steigt der

Thermometer immer um mehrere Grade, wenn man ihn in ein ſriſch gemachtes Loch tief in einen Baum einbringt; und er fällt, wenn derſelbe Verſuch bey groſſer Sommerhitze angeſtellt wird. Auch die kaltblütigen Thiere ſind nur relativ kaltblütig: nämlich nur in Beziehung auf die Temperatur der warmblütigen Thiere. Fröſche und andere Amphibien zeigen immer eine um einige Grade höhere Temperatur, als jene der ſie umgebenden Atmosphäre. Unter den warmblütigen Thieren behauptet der Menſch eine Temperatur von 32 bis 34 Reaumürſchen Wärmegraden.

§. 557.

Die Temperatur jeder Thier- und Pflanzengattung, ja die Temperatur jedes beſonderen Menſchen iſt eine ihm eigenthümliche und bey dem letzten nach dem Geſchlechte, nach dem Alter, nach dem Temperamente verſchieden. Je mehr aber das irritable Syſtem vorherrſchend iſt in irgend einer Thierclaſſe, deſto höher iſt ihre Blutwärme: ſo übertrifft die Blutwärme der Vögel jene der Säugthiere wenigſtens um 10 Grade, und ſie ſteht mit der Geſchwindigkeit ihres Kreislaufes, mit der extenſiven und intenſiven Entwicklung ihres Reſpirationsſyſtems, und mit der Schnelligkeit ihrer willkührlichen Bewegungen im Verhältniſs. Bey dem Manne iſt vermöge der Vorherrſchaft des Gefäſseſyſtems und des Oxydationsprozeſſes in den Lungen — die Blutwärme höher als bey dem Weibe. Warmblütiger iſt der Jüngling als der Greis: ſein Vermögen, der Kälte zu widerſtehen, iſt gröſſer: — warmblütiger iſt der ſan-

guiniſche als der phlegmatiſche, warmblütiger der Südländer als der Nordländer.

§. 558.

In dem menſchlichen Leibe hat wieder jedes Organ eine ihm eigenthümliche Temperatur, welche von der Temperatur des geſammten Leibes, und von jener der ihm angrenzenden Organe verſchieden iſt. De Haen's Behauptung, die Temperatur sey in allen Organen gleich, widerſpricht der Theorie und der Erfahrung. Die innern Organe ſind wärmer als die äuſſern: daher das aus der Ader gelaſſene Blut, wenn es über die Hautoberfläche des Armes herabfließt, brennend heiſs für das Gefühl des Kranken iſt. Bey den heftigſten Brennfiebern und bey der ſtärkſten, phlegmonöſen Entzündung eines äuſſern Theiles ſteigt die Temperatur von der Hautoberfläche kaum ſo hoch, als ſie gewöhnlich in der Gegend des Zwergfelles iſt; ſo wie oft die Wärme nur für das Gefühl des Kranken vermehrt iſt, ohne daſs der Thermometer eine wahre Erhöhung der Temperatur beſtättigt. Merkwürdig iſt bey verſchiednen Krankheiten das umgekehrte Verhältniſs der Temperatur zwiſchen den äuſſern und innern Theilen: der äuſſere Starrfroſt mit Glühhitze in den Eingeweiden: und umgekehrt: — eben ſo die verſchiedne Vertheilung der thieriſchen Wärme an die einzelnen Organe. In den innern Theilen erhält ſich die höhere Temperatur nach dem Tode noch ungleich länger als in den äuſſern; und wenn die Haut ſchon ganz erkaltet iſt, beſitzen die Organe in der Bauchhöhle und in der Bruſthöhle oft noch die

Blutwärme. In der Bauchhöhle selbst ist die Temperatur wieder nach den einzelnen Regionen derselben verschieden; z. B. sie steht höher in der Oberbauchgegend als nach der Beckenhöhle hin. Ueberhaupt ist die Wärmetemperatur in der Gegend des Zwergfelles die höchste. Sonst steht die Temperatur in einem Organe um so höher, je blutreicher dasselbe ist, und je schneller in dem Capillargefässystem desselben das arterielle Blut in venöses umgewandelt wird.

§. 559.

Dem Organischen kann die Wärme nicht so wie dem Unorganischen von aussen her mitgetheilt oder entzogen werden. Das Organische behauptet sich in der ihm eigenthümlichen Temperatur unabhängig vom Wärmegrade des ihn umgebenden Mediums. Die ihm von aussen mitgetheilte, nicht in seinem Innern erzeugte Wärme erhöht seine Temperatur nicht; und diese fällt nicht im Verhältniss, als ihm Wärme durch ein kälteres Medium entzogen wird. Ja sogar, die Temperatur thierischer Organismen aus den höheren Classen steigt in einem Medium, welches tief unter der Blutwärme steht, zuerst um einige Grade, und fällt zwar in der Folge, aber nie bis zu dem Erkältungsgrade jenes Mediums herab. Eben so fällt die Temperatur in der Umgebung mit einem sehr heissen Medium zuerst um einige Grade, und steigt zwar in der Folge wieder, erreicht aber niemals die Höhe des Mediums selbst. Je höher eine Classe in der Thierreihe steht, desto weniger wird auch ihre Temperatur durch jene des umgebenden

Mediums verändert. Die höheren Thiere sind bey weitem mehr unabhängig vom Wechsel der Temperatur der Atmosphäre, von der äussern Erwärmung, und von der äusseren Wärmeentziehung, als die untern; sie perenniren durch den Wechsel der Jahreszeiten hindurch, da der Winterschlaf der andern das Zeichen ihrer grössern Abhängigkeit von der Temperatur der Erdatmosphäre ist. Die Fähigkeit des Menschen, in den verschiedensten Climaten, und unter allen Zonen zu leben, ist das Zeichen seiner grössern Unabhängigkeit von äusseren Natureinflüssen. — Ein Amphibion erleidet in der Umgebung mit einer bis zu einem gewissen Grade erhitzten Atmosphäre, relativ zu seiner gewöhnlichen Temperatur, eine ungleich beträchtlichere Vermehrung seines Wärmegrades als ein Säugthier. Der Mensch aber behauptet sich in der heissen Zone wie in den Polargegenden auf seinen 32 - 34 Reaumürschen Wärmegraden. Fordyce und Blagden dauerten ohne grosse Beschwerden in der Glühhitze aus: zwey Mädchen brachten in einem von der französischen Akademie der Wissenschaften gemachten Versuche mehrere Minuten in einem Backofen zu, wo Früchte gedörrt wurden, und wo cadaveröses Fleisch kochte; sie ertrugen 150 Reaumürsche Wärmegrade. Das Vermögen thierischer Organismen, der äussern Wärme zu widerstehen, ist bedingt durch gleichzeitige Capacitätsvermehrung, durch Verminderung der innern Wärmeerzeugung, und durch Vermehrung der Wärmeausleitungsprozesse. Umgekehrt ist ihr Vermögen, der äusseren Kälte zu widerstehen, bedingt durch gleichzeitige Capacitätsverminderung,

durch vermehrte innere Wärmeerzeugung, zuletzt durch Beſchränkung der Wärmeausleitungsprozeſſe. Man glaubte ehemals, aus der vermehrten Hautausdünſtung allein die Gleichheit der Temperatur in höheren Wärmegraden der Atmosphäre erklären zu können. Allein wenn man bedenkt, daſs Amphibien (Kröten, Fröſche) in bis zum Siedpunkte erhitzten Waſſer leben können, ohne ihre Temperatur merklich zu verändern; daſs die Verdünſtung von Flüſſigkeiten das Fleiſch todter Thiere nicht verhindert zu kochen; — ſo erſieht man, daſs jener Erklärungsgrund für ſich allein nicht hinreichend ſey, und daſs die Capacitätsvermehrung bey vermehrter Wärmemittheilung hiebey ſehr in Anſchlag gebracht werden müſſe. Die Capacitätsvermehrung iſt gewöhnlich vom Anfange ſogar auſſer Proportion der Wärmemittheilung, daher die Temperatur des thieriſchen Körpers in der Hitze zuerſt um einige Grade fällt, und nur ſpäter langſam ſteigt. — Dazu kömmt nun, daſs bey äuſſerer Hitze erſtens diejenigen Functionen, welche die vorzüglichſte Quelle der thieriſchen Wärme ſind, der Intenſität ihrer Thätigkeit nach vermindert werden, z. B. die Reſpiration, die Digeſtion, die Verwandlung des arteriellen Blutes in venöſes, die Ernährung (welche mit einem Uebergange der ernährenden Flüſſigkeit aus dem tropfbarflüſſigen in den ſtarren Zuſtand verbunden iſt) — zweytens, daſs die Entladung der Wärme nach auſſen, auch abgeſehen an der vermehrten Hautausdünſtung, raſcher vor ſich geht. Denn die beſonders im Innern des thieriſchen Körpers, und in den groſſen Cavitäten erzeugte Wärme

ſtrahlt beſtändig nach auſſen, und die äuſſeren Theile ſetzen dieſe Wärme an die ſie umgebende kältere Atmoſphäre mit ab.

§. 560.

Bey der äuſſeren Erkältung verhält ſich Alles auf die umgekehrte Weiſe der äuſſeren Erhitzung: und daher behauptet der thieriſche Körper auch in der kälteſten Atmoſphäre die ihm eigenthümliche Temperatur. Die Wärmecapacität des Organismus wird im gleichen Verhältniſſe der äuſſeren Wärmeentziehung vermindert. Die Hautausdünſtung und die Wärmeentladung durch die äuſſeren Theile an die äuſſere Atmoſphäre wird vermindert. Die Haut ſchrumpft ein, das Capillargefäſsſyſtem derſelben wird blutleer: das Blut häuft ſich in den inneren Theilen an &c. Alle diejenigen Prozeſſe werden vermehrt, wodurch die thieriſche Wärme erzeugt und unterhalten wird. In der Kälte verdaut man beſſer, als in der Hitze, und beynahe Jedermann genieſst eine gröſſere Quantität von Speiſen und von Getränken. — Eben ſo iſt auch die Reſpiration in der Kälte vermehrt, und man conſumirt eine gröſſere Quantität von Sauerſtoffgaſs als in der Hitze: eben ſo geht die fortgeſetzte Verbrennung des Bluts durch die in daſſelbe aufgenommene Aura oxygenea, oder die Umbildung des arteriellen Blutes in venöſes raſcher vor ſich: — die Nutrition iſt vermehrt, und der Anſatz von erſtarrter organiſcher Maſſe geht lebhafter von ſtatten: — eben ſo treibt in der Kälte jeden das Bedürfniſs zur körperlichen Bewegung

und

und Anſtrengung der Muskelkräfte, wodurch ebenfalls viele Wärme frei wird. Auffallend bringt auch ſolche Anſtrengung der willkührlichen Bewegungswerkzeuge das Gefühl von vermehrter Wärme hervor. Dieſelben Erſcheinungen finden örtlich und in dem beſchränkten Umfange einer umſchriebenen Hautſtelle ſtatt, wenn bloſs ein Theil der Kälte ausgeſetzt wird.

Aber auch in der Kälte bleibt die Capacitätsverminderung und die Vermehrung des Intenſitätsgrades der inneren Wärmeerzeugung nur bis zu einem gewiſſen Grade proportional der äuſſeren Wärmeentziehung. Ueber dieſe hinaus unterliegen der ſtrengen Kälte beſonders, und am früheſten ſchwächliche Organismen. Die Hautoberfläche wird livid, Empfindungslos, brandig; die Glieder werden ſteif: Mattigkeit und ein unwiderſtehliches Bedürfniſs des Schlafes ſtellen ſich ein, und gewöhnlich ſterben Erfrorene, in dieſen verführeriſchen Schlaf eingewiegt.

§. 561.

Um die Wirkung der Wärme und der Kälte auf den lebenden Organismus richtig zu beſtimmen, muſs auf jene Unabhängigkeit der eigenen Temperatur deſſelben, von der Temperatur des ihn umgebenden Mediums, und auf die Veränderungen, welche übermäſsige Kälte oder Hitze in den verſchiedenen Organen und organiſchen Syſtemen hervorbringt, Rückſicht genommen werden.

Lebensfunctionen.

Classe I.

Lebensfunctionen des Individuums.

Ordnung III.

Functionen des ſenſibeln Syſtems.

Gattung 1.

Selbstgefühl und dessen Affectionen.

XXIII. Kapitel.

§. 562.

Das uranfängliche jedes Dinges ist auch deſſen Vollendung, und ſelbſt durch ſeine Entwickelung und Fortpflanzung kehrt ein jedes wieder in ſeinen Urſprung zurück. Von daher ist die Senſibilität das Erſte und zugleich das Letzte in dem thieriſchen Leben: — die unendliche Liebe, mit welcher das organiſche Weſen ſich ſelbſt und das Ganze umfängt; da es weder dem Geſetze der Nothwendigkeit noch jenem der Freiheit weiter untergeben ist, ſondern beyde, Freiheit und Nothwendigkeit in Eines bildet, und den letzten Gegenſatz aufhebt. —

Durch die Senſibilität ſind alle Theile des Organismus unter ſich in Gemeinſchaft. Die Thätig-

keit des Nervensystems ist eine rein-dynamische Leitung. Wird die Continuität im Nervensysteme aufgehoben, durch Unterbindung, Durchschneidung, — so wird die Leitung unterbrochen, und die Sensibilität derjenigen Theile vernichtet, denen die durchschnittenen, unterbundenen Nerven angehören. Das Nervensystem ist daher Ausdruck der Totalität im Organismus. Als solcher, — ist jeder Nervenstrang nicht nur in's Unendliche theilbar, sondern wirklich in's Unendliche getheilt: und jeder besteht aus einer zahllosen Vielheit von besondern Faden. — Das ganze Nervensystem besteht in Identität und Selbstgleichheit, und Gehirnsubstanz, die Substanz der Ganglien, und die eigentliche Nervensubstanz sind im Wesentlichen nicht verschieden.

Nur sehr uneigentlich kann im Nervensysteme von Entstehung und Endigung einzelner Nerven, und von Verzweigung der Stränge die Rede seyn. Es ist hier die reinste Simultaneität der Production, ohne alles Nacheinander. Weder entstehen die Nerven im Gehirn und Rückenmark, noch enden sie darin. Im Nervensysteme ist das Einzelne auf das vollkommenste dem Ganzen gleichgebildet, und das Ganze ist in jedem Einzelnen vergegenwärtiget. Jeder Nerve ist auch Gehirn, in einem noch höhern Sinne des Wortes, als jede Arterie auch Herz ist. Die drey Elemente der Nervenbildung sind immer diese: der Nerve selbst, das Ganglion, und der Plexus. Alles andere ist nur Wiederholung der drey Urformen. So verhält sich das Gehirn wieder als

Ganglion, als die Totalität der Ganglien, das Rückenmark als Nerve, und die Gesamtheit der Gehirn- und Rückenmarksnerven stellt eine Art von Plexus in Beziehung auf das Gehirn und Rückenmark dar: — oder mit andern Worten: die Nerven bilden das Rückenmark, und die Ganglien das Gehirn.

Da der eigenthümliche Character des Nervensystems Ausdruck der Totalität ist — nämlich Vergegenwärtigung des Allgemeinen im Besondern, und Zurückbildung des Besondern in das Allgemeine, — so haben auch die meisten Nerven (um die Vorstellung eines Ursprunges derselben beyzubehalten) keinen einfachen Ursprung, sondern sie entstehen mit mehreren Faden, welche sich vereinigen, um Stränge zu bilden. Ueberhaupt ist der Ursprung, oder das Centralende der Nerven nicht da, wo die Anatomie dasselbe angibt: sondern die Nerven verbreiten sich entschieden in dass Hirn- und Rückenmarck weiter hinein, als die anatomische Untersuchung ihnen folgen kann.

§. 563.

Das Rudiment der Gehirnbildung liegt bey den untern Thieren in dem unpaarigen Knoten, der sich an ihrem Kopfende befindet, und durch zwey Markschenkel mit den Nerven zusammenhängt. Dieser treibt bey den rückgrathlosen Thieren mehrere kleinere Knötchen nach vorne hervor, welche in ihm mittelst nervöser Productionen wurzeln, welche aber unvereint bleiben, als zerstreut liegende Ganglien, und die erste Anlage zur Bildung des

groſsen Gehirnes darſtellen, da jener gröſſere Knoten ſich als kleines Gehirn verhält. Offenbar iſt das kleine Gehirn die frühere Bildung; die Ganglien, welche ſpäter zum groſsen Gehirne unter ſich zuſammenwachſen, entſtehen durch eigene Nerven eben ſo aus ihm, wie die übrigen Knoten, aus welchen die Nerven der einzelnen Organe entſpringen. — Das ganze Nervenſyſtem ist von dem Streben nach unendlicher Expanſion beherrſcht: — denn empfinden kann nur dasjenige, — was ſich in dem Empfundenen fortſetzt, und durch die höchſte Expanſion ſeiner ſelbſt — jenes in ſich aufzunehmen trachtet. — Jener unpaarige Knoten, das kleine Gehirn der höhern Thiere, ist nur die erſte Contraction des nach unendlicher Expanſion ringenden Nervenſyſtems. Er iſt das erſte und urſprünglichſte aller Ganglien. Denn es iſt leicht einzuſehen, daſs kein Nerve ohne Ganglion ſeyn könne; — die Ganglien der Gehirnnerven ſind nur mehr zuſammengedrängt in Eins gebildet; — noch bey den Fiſchen ſind die Ganglien des Gehirnes von einander getrennt, noch nicht zur Totalität gebildet, noch nicht in Eine Maſſe zerfloſſen. Auch im vollkommenſten Gehirne, des Menſchen, ſondern ſich wieder einzelne Ganglien von der Totalität ab, als geſtreifte Körper, als Sehnervenhügel, als Vierhügel, als olivenförmige Körper. Das Rückenmark iſt nur eine Kette von Ganglien, welche hier nicht, ſo wie jene des ſympathiſchen Nerven, blos durch communicirende Zwiſchenfaden unter ſich vereint ſind, ſondern welche unmittelbar in einander übergehen, und daher eine Linie bilden. Das paarige Aus-

ſtrömen der Rückenmarksnerven zwiſchen je zwey Wirbelbeinen beweiſst noch die ehmalige Trennung. Zur Evidenz aber wird dieſe Entſtehung des Rückenmarkes aus aneinandergereiheten Ganglien — dadurch gebracht, daſs die knotigen Rückennerven der untern Thiere ebenſowohl als ein knotiges Rückenmark, denn als ſympathiſche Nerven betrachtet werden können, da ſie auch in einzelnen Claſſen z. B. bey den Inſekten offenbar mehr ein knotiges Rückenmark, bey den Mollusken aber mehr ſympathiſche Nerven ſind.

Dem Streben des Nervenſyſtems nach unendlicher Expanſion (in ſeinen Geflechten) ſteht ſomit entgegen die neue Contraction deſſelben in ſeinen Ganglien. Dieſe ſind daher centrirende Bildungen, Strahlenheerde, in welchen das im Nervenſyſtem divergirende Licht gebrochen wird; da jedes Ganglion ſelbſt nur ein Streben zur concentriſchen Stellung und endlichen Verſchmelzung Aller im Gehirne ausdrückt.

§. 564.

Die Frage, ob die Empfindung an derjenigen Stelle, wo das peripheriſche Ende irgend eines Nerven afficirt wird, ſtatt finde, oder ob der Eindruck, welchen jenes erleidet, erſt im Gehirne, als dem Senſorium, zur Empfindung werde, ist vollkommen eitel. Weder das Eine noch das Andere. Das ganze Nervenſyſtem iſt eine Identität und Totalität. Beyde Meinungen ſind hinlänglich durch ihnen entgegenſtehende Thatſachen widerlegt. Wer aber das Weſen der Senſibilität erkannt hat,

dem ist es auch klar, wie bey einer besondern Empfindung das ganze Nervensystem, und in ihm vorzüglich das Gehirn, — und dennoch wieder der einzeln afficirte Nerve insbesondere empfinde.

§. 565.

Die Sensibilität ist die dynamische Gemeinschaft aller Organe, — ein allgemeiner Consens, eine Sympathie, — ein durchgängiger Rapport aller Theile des Organismus unter sich. Dieser allgemeine Rapport ist der Grund jedes besondern Consensus zwischen einzelnen Organen. Jede besondere Mitleidenschaft ist daher der allgemeinen (der Sensibilität) untergeordnet, und durch diese bestimmt. Denn auch die besondere Sympathie der Organe unter sich ist durch das Nervensystem vermittelt, welches zwischen solchen Organen eine besondere, nähere Leitung bildet, und sie in einen mehr unmittelbaren Rapport setzt.

§. 566.

Wird das Nervensystem in dem Momente der Identität und Selbstgleichheit betrachtet, so ist es reine Durchsichtigkeit, Klarheit ohne Trübung, eine unendliche Expansion ohne Schranke und Hemmung. Diess ist das Gemeingefühl, dessen lauterste Perception ohne Objekt, nämlich, so wie alles Ursprüngliche, früher als der Gegensatz eines Subjektiven und eines Objektiven, — ist. Das Selbstgefühl ist eben darum, weil es ohne Objekt ist, wahrhaft positiv, und jede Affection desselben ist als eine wahre Negation zu betrachten. So ist

das Gefühl der Gesundheit, das Wohlbefinden positiv, nicht eine Negation des Uebelbefindens, oder des Gefühles der Krankheit, sondern das letzte, und aller Schmerz ist nur eine Negation, eine Trübung und Hemmung jener klaren Selbstoffenbarung. Das Selbstgefühl ist darum die erste und ursprünglichste aller Empfindungen, die einzig positive Bedingung der Möglichkeit jeder andern: — die wahre, jeder Affection vorhergehende Position des Ich: — oder der Substanz in diesem. Nur daraus ist die Natur des Uebelbefindens und jene des Schmerzens zu erkennen. Beyde sind rein negativ, unwesentlich, zufällig; und der Schmerz entsteht überall da, wo die innere Identität und Ungetrübtheit der Selbstgewahrung aufgehoben und auf etwas objektives bezogen wird, was ein durchaus fremdartiges, nicht assimilirbares, in die Klarheit des Selbstgefühles nicht auflösliches ist. Das Selbstgefühl ist die vollkommne Durchsichtigkeit des organischen Wesens für die absolute Substanz. Denn durch das Selbstgefühl empfindet der Organismus nicht sich als eine Besonderheit; sondern er empfindet die in ihm manifestirte Substanz. Die angenehme Empfindung ist diejenige, welche wieder in die Klarheit und Ungetrübtheit desselben auflöslich ist. Der Schmerz ist die Hemmung der ursprünglich klaren Selbstentwickelung an objektiver Schranke: — eine Negation, — eine Contraction, welche die expansive Metamorphose des Nervensystems beschränkt. Der Schmerz zeigt daher überall in Krankheiten ein Ergriffenseyn der Sensibilität auf primäre oder secundäre Weise an. Alle ursprüngliche Sensibilitäts-

krankheiten ſind ſchmerzhaft: jede Nevroſe iſt urſprünglich Nevralgie, ſie wird in ihrem Fortgange Krampf (Hemmung der expanſiven Metamorphoſe des Nervenſyſtems durch ſixirte Contraction), dann Convulſion (totales Heraustreten des Nervenſyſtems aus ſeiner Indifferenz und Erſchöpfung in electriſchen Entladungen), und jede Nevralgie endet in Paralyſe (den ſenſiblen Tod).

§. 567.

Durch das Gemeingefühl beſteht der Organismus als eine ſich ſelbſt empfindende Identität, und Selbſtgleichheit, d. h. als eine Person. — Durch die Sinnesgewahrnehmung setzt er ſich das äuſſere Objekt entgegen, und es entſteht der Gegenſatz des Innern und des Aeuſſern. — Durch die Vorſtellung hebt er dieſen Gegenſatz wieder auf, und in jener iſt die höchſte und letzte Syntheſis und die Totalität aller Dinge.

Gattung 2.

Sinne.

XXIV. Kapitel.

§. 568.

Auch die Sinneerkenntniſs (die wahre) iſt eine Erkenntniſs des An sich der Dinge; nicht die Sinne täuſchen, und ſind in Scheinerkenntniſs verſtrickt; die Sinneerkenntniſs iſt nicht im Widerſpruch, im Gegenſatz mit der Vernunfterkenntniſs, ſo wenig das Beſondere im Gegenſatz iſt mit dem

Ganzen; — aller Schein und Trug ſtammt nur aus der Verkehrtheit der Reflexion, und die Sinneerkenntniſs, wenn ſie im Widerſpruch iſt mit der Vernunft, iſt auch im Widerſpruch mit ſich ſelbſt. Urſprünglich iſt in ihr die höchſte Religion, und wer die Natur freudig betrachtet mit ſeinen Sinnen, wie ſie ſich darbietet, auch der hat ſie wahrhaft erkannt, und vor vielen andern. Die Dinge erſcheinen dem unverdorbenen Sinn gerade wie ſie an ſich ſind, und nicht anders. Warum ſollte auch ein Trug und falſcher Schein auf den Dingen liegen? und woher dieſer? nur wer ihn ſich geſchaffen, und erdacht hat, nur der mag ihn anerkennen und ihn wieder aufzuheben trachten. Für die andern iſt er nicht vorhanden. Der Sinn erkennt zwar das Beſondere, aber nicht als ſolches, nicht als getrennt vom Allgemeinen, und dieſem ſubſumirt; d. h. durch ſeinen Begriff, ſondern er erkennt das Beſondere auf ſolche Weiſe, wie die Vernunft die Idee, als ein Ganzes für ſich und als ein unabhängig Lebendes. Nichts iſt herrlicher, als die wahre, nicht corrumpirte ſinnliche Anſchauung der Dinge; es giebt keine herrlichere Gabe als ſcharfen Sinn, keinen ſchmerzlichern Tod, als den Tod eines edleren Sinnes. Die Sinnlichkeit iſt nicht eine Trennung von dem Ganzen, ſondern eine Wiedervereinigung mit dem Ganzen. In demſelben Maaſse, als das organiſche Weſen ſich individueller bildet, und geſtaltet, legt die Natur ihm Sinne an, und in dem Maaſse erweitert ſich ſeine Sinnlichkeit. Keiner hat es bewieſen, daſs die Sinnen verdorben ſeyen, und daſs die Sinnlichkeit zum Böſen führe. Vielmehr erfreuet ſich ein unver-

dorbener Sinn alles Guten, Wahren und Schönen. Die Glücklichen, denen die Erkenntniſs des Höchſten und Seeligen als Gefühl einwohnt, erkennen dieſes und erfaſſen es durch den Sinn. Denn auch ſie erkennen es, obgleich unwiſſend, wie ihnen geſchieht, ſo daſs ſie die Erkenntniſs deſſelben abläugnen; woran ſie unrecht thun.

Die wahre Natur des Sinnes iſt dieſe: — Was urſprünglich Eines iſt und ungetrennt, — das ſoll auch in der Erkenntniſs Eines und ungetrennt ſeyn. Der Sinn tritt als Mittler zwiſchen das Innere und das Aeuſſere, zwiſchen das Subjektive und das Objektive: nicht Er iſt ſeiner Natur nach ſubjektiv oder innerlich, im Gegenſatze eines Objektiven oder Aeuſſerlichen: ſondern die Sinneserkenntniſs iſt eben die Aufhebung ſolcher Trennung. Der Sinn läſst ſie nicht mehr zu: er hängt ſich an das Objekt ſeiner Betrachtung unmittelbar, wie der Magnet an das Eiſen. Das Objekt ſetzt ſich in der Anſchauung fort: es iſt nicht das Bild des Gegenſtandes, noch weniger ein Trugbild deſſelben, was in der hintern Augenkammer auf die Netzhaut fällt, ſondern es iſt das wahre, lebendige Objekt ſelbſt, was im Lichte ſchwebend von der Netzhaut aufgefaſst wird. Nur in der Reflexion über die ſinnliche Anſchauung gehen die Momente derſelben in ein ſubjektives und in ein objektives Cauſalmoment der Senſation aus einander, — wer ſieht und hört, wird ſich ſolcher Trennung nicht bewuſst. Es iſt unmöglich, auf irgend eine Weiſe die Nothwendigkeit derſelben darzuthun.

§. 569.

Es giebt nur Einen Sinn in den Sinnen. Die ganze Reihe der Sinne ist nur die progressive Entfaltung jenes Einen Sinnes. Diese Manifestation des Einen Sinnes in den Sinnen wird die Sinnlichkeit genannt.

Die Sinne sind daher im Wesen von einander nicht verschieden: jeder ist nur die besondere Potenz Einer sich in allen wiederholenden Wurzel. — Nur indem alle Blüthen Eines Stammes, und Gewächse von Einerley Art, bloss dem Entwicklungsgrade nach verschieden, sind, ist es möglich, dass Ein Sinn den andern ergänze, und dessen Perception berichtige. Eben dadurch ist es aber auch möglich, dass Einer die Stelle des Andern vertrete, und dass der Somnambule mit andern Theilen als mit dem Auge sehe.

§. 570.

Die Reihe der Sinne verläuft nach demselben Gesetze, wie jene der dynamischen Thätigkeiten in der Natur. Jede Potenz des dynamischen Prozesses bestimmt eine besondere ihr gleichgesetzte Entwicklungsstufe der Sinnlichkeit. Denn die Sinneperception ist nur eine Wiederholung der allgemeinen Naturthätigkeiten, und das steigernde, potenzirende Princip in diesen ist auch das Princip der Entfaltung in der Reihe der Sinne. Die drey untersten Sinne entsprechen daher den drey Thätigkeitsformen der Natur: und den diesen gleichgesetzten Elementarformen des Seyns. Alles Sinnlich-Empfindbare, und jede dem Sinn aufgeschlossene Qualität

in den Dingen ist nur Attribut jener Elementarformen des Seyn's und ist Einer derselben nothwendig verknüpft. — So ist der Gefühlsinn der Sinn für das Starre, der Geruch für das Luftige, der Geschmack für das Flüssige. Von dem ersten wird nur das Starre, von dem andern das Luftige, von dem dritten das tropfbarflüssige empfunden. Der erste ist seiner Natur nach thetisch, der zweyte ist antithetisch, der dritte synthetisch. Das Schema der Perception des Gefühlsinnes ist der magnetische, das Schema des Geruchsinnes ist der electrische, das Schema des Geschmacksinnes ist der chemische Prozess. Daher wirkt der erste nur in unmittelbarer Berührung nicht so wie die andern durch ein bestimmtes Medium hindurch, und nur jene Qualitäten an den Dingen sind ihm aufgeschlossen, welche zunächst Attribute der Cohäsion sind. Der Geruch aber ist immer von electrischer Art, den alle Riechstoffe sind Inflammabilien, — aromatisch, — ätherisch - ölig. Der Geschmacksinn aber ist auflösend, — und das chemisch - Solvirte giebt einen bestimmten Geschmack. — In den höhern Sinnen wiederholt sich nur auf mehr ideale Weise, was die niedern auf mehr reale Weise darstellen. Mehr als diese, dringen jene in das Innere, in das An sich der Dinge ein, und ihnen giebt sich das Verborgenste kund. So wie die ersten in einzelne Systeme des Organismus hineingezogen werden, z. B. der Geschmack in das Verdauungssystem, der Geruch in das Respirationssystem, — so ordnen sich umgekehrt die höhern Sinne andere Systeme des Organismus unter, z. B. das Gehörorgan das ganze Knochensy-

ſtem, oder die Geſamtheit der harten Theile des Leibes. Sie ſuchen die Nähe des Gehirnes, und ſind in den höhern Regionen des Hauptes gelagert.

§. 571.

Zuerſt nun wiederholt ſich das Gefühl im Gehör, — denn das Hören iſt nur ein Fühlen mit den harten Theilen des Leibes. Das gewöhnlich ſogenannte Gefühl iſt nur die Eine Art des Fühlens, — das Weichgefühl. Bey dem Gefühle empfangen die weichen Theile, Haut, Fleiſch, den Eindruck des ſtarren Körpers, ihm nachgebend, und durch ihn comprimirt. Die weichen Theile ſchwingen hiebey in oscillirender Bewegung, wie im Gehöre die harten. Das Gehörorgan iſt ſeiner Natur nach knöchern; das geſamte Knochenſyſtem pflanzt die Schallſchwingungen fort. Die Vollkommenheit der Bildung des Gehörorgans geht jener des Knochenſyſtems parallel. — So wie nur der ſtarre Körper ein Objekt des Gefühles iſt, ſo tönt auch nur der ſtarre Körper. Der Schall ſelbſt iſt die ideale verklärte Seite des Magnetismus, daher ſind die Metalle vorzüglich mit Klang begabt: — die Rede aber und der Geſang geben das Innerſte, das An ſich, jene des Gedankens, dieſes des Affektes und der Leidenſchaft kund. Der Geruch wiederholt ſich unter den höhern Sinnen im Geſichte. Dieſes iſt der dem Licht verwandte Sinn, vor andern herrlich in ſeinem Innern ausgeſtattet, — das Auge die individuelleſte Bildung und Geſtaltung, der Spiegel des ganzen Thierleibes in ſeiner Verklärung. So wie der Geruch das höchſte iſt unter den niedern Sinnen,

so wie er selbst mitten inne steht zwischen den höhern und niedern — so ist das Gesicht der höchste unter den höhern Sinnen, und seine Perception wird Anschauung (unmittelbares Erkennen) vorzugsweise genannt. — Da das Schema der Function des Geruches der electrische Prozess ist, so ist das Licht, in welchem das Auge lebt, die Idee, das An sich der Electricität; — daher das Licht, so wie es getrübt wird, den electrischen Gegensatz der Farben in sich aufnimmt. — Das Gehör nimmt keine höhere Potenz in der Reihe der Sinne ein, als das Gesicht: das Auge ist edler, individueller gestaltet; — nur dringt das Gehör tiefer in das innere Wesen der Dinge ein, und ist seiner Natur nach gemüthlicher; — so wie die Schönheit der Form höher ist als die Harmonie der Klänge, und die plastische Kunst höher als die Musik. Doch bringt die Natur das Ohr später hervor und später zur Vollkommenheit als das Auge, weil das Thier ursprünglich weich, Molluske, ist, und später erst hart wird. Und es ist ein schöner Streit zwischen Gesicht und Gehör um den Vorzug. — Allein solch ein Gegensatz, wie der ist zwischen Gehör und Gesicht, kann nicht ungebunden bestehen; denn beyde sind sich der Richtung nach vollkommen entgegengesetzt, und was in dem Einen das Innerste ist, das ist in dem Andern das Aeusserste. Daher bilden sich auch beyde nach ganz entgegengesetzten Richtungen, das Auge von Aussen nach Innen, das Ohr hebt mit den innersten Bildungen an, und treibt die äussersten zuletzt hervor. Es giebt nur einen Sinn, der höher ist als beyde, und wieder auf beyde folgt, und in der Totalität,

was jene beyde in der Differenz, darſtellt. Dieſer Totalitätsſinn iſt ohne Namen und ohne beſtimmtes Organ: er iſt nicht Wärmeſinn, obgleich durch die Wärme die Dinge unter einander in dynamiſcher Gemeinſchaft ſind, und das Eine durch das Medium der Wärme hindurch das andere empſindet. Aber ſeine Sphäre iſt von weiterm Umfang. Wer möchte behaupten, das organiſche Ding habe für nichts weiters mehr Sinn als für Wärme? Alles, wodurch organiſche Weſen unter ſich in Gemeinſchaft ſind, und wodurch das Eine die Einwirkung des andern empfängt, iſt Affection dieſes Sinnes: — eben ſo das Unnennbare, was die Liebenden vereint, und das Widrige, was der Eine für den Andern hat; — was offenbar eine Sinnesgewahrnehmung iſt. Als Totalitätsſinn kann er ebenſowenig ein beſtimmtes Organ (auch nicht die Haut, welche doch offenbar das Organ des Gefühles iſt) als ein beſtimmtes Objekt haben. Er iſt Sinn, κατ᾽ ἐξοχὴν, iſt in allen Sinnen gegenwärtig. Er wacht, indeſs die andern ſchlafen, und iſt das alleinige Perceptionsorgan des Somnambulen. Er ſieht die Witterungsveränderungen voraus, und iſt die Ahnung künftiger Begebenheiten. Er richtet über Schönheit und Harmonie, iſt der Inſtinkt der Thiere, und das Vorgefühl künftiger Gefahren. Durch ihn empſindet der Waſſerſucher und der Metallfühler die Nähe dieſer Gegenſtände. — Er hat ſeine Amauroſen und ſeine Verdunklungen; — und bey denen er erblindet iſt, denen iſt es eben ſo eitel, von ſeinen Werken zu erzählen, als dem Blinden von der Farbe. Immer haben

ben die Physiologen seine Gegenwart anerkannt, aber ihn als etwas besonderes betrachtet, und ihm verschiedene Namen gegeben, von welchen aber keiner der passende ist, da er, obgleich ein besonderer Sinn, doch nur Totalitätssinn ist. — Dieser Sinn ist in allem Organischen, in Hartem und Weichem, jedoch in dem letzten vorzugsweise. Er ist nicht allein in der Haut, — mehr in den Eingeweiden, in der epigastrischen Gegend, wo die netzartigen Geflechte der zahllosen gangliösen Nerven liegen, die doch wohl etwas mehr als Gefäſsnerven sind. Dort ist er bey dem Hypochondrischen und bey der Hysterischen krank. Er ist überhaupt bey vielen Nevrosen idiopathisch afficirt, und jede andere Affection ist bey diesen nur secundär, symptomatisch. Wie das Gefühl die Wurzel und der Anfang aller Sinnegewahrnehmung ist, so ist dieser ihre Vollendung.

§. 572.

Nicht auf einerley Weise und nach demselben Gesetze treten die höhern und die niedern Sinne hervor. Die untern Thiere haben nicht den Sinn; sondern der Sinn hat sie, gleichsam als die ihm angebildeten Organe: — das ganze Thier ist der nackt hingelegte, für sich hervorgetretene Sinn. Daher bezieht sich in ihnen die Gehirnbildung auch nur auf den herrschenden Sinn. Die höhern Thiere aber haben die Sinne, und gebrauchen sie, und das Gehirn beherrscht die Sinne.

Zuerst verhalten sich die drey Hauptclassen in der Reihe der Reproductionsthiere wie die drey untern Sinne. Dem Gefühlsinn entsprechen die Polypen und Würmer, — dem Geschmacksinn die Mollusken und die Schaalthiere, dem Geruchsinn die Insekten. Polypen und Würmer sind selbst nur die Gefühls- und Betastungsorgane des Thierreiches. Auch später wiederholt sich in der Bildung der Gefühls- und Betastungsorgane der höhern Thiere immer die Urform des Polypen und des Wurmes. Die Gefühlfaden einiger Thiere, z. B. noch der Fische, sind wahre Polypen, welche auf diesen einen fixen Standort haben; jede Papille irgend eines Hautnerven besitzt noch eine polypenähnliche Bildung. Endlich ist die Bildung der Betastungsorgane des Menschen, jene der Finger, wurmähnlich, ihre Bewegung ist eine wurmförmige. Die Mollusken sind ganz Geschmacksorgan, und entschieden ist ihre äussere schwammige, feuchte Haut Geschmackshaut. Nach dem Grundsatz, dass jeder Sinn bey seinem ersten Hervortreten das ganze Thier sey, in der darauf folgenden Classe aber auf ein eigenes Organ eingeschränkt werde, — haben auch wenigstens die kopflosen Mollusken, gleich den nackten Würmern, keine Zunge. Nur die Cephalopoden, welche überhaupt eine höhere Thierclasse im Reiche der Mollusken repräsentiren, besitzen eine solche. Dagegen fehlt keinem Insekte die Zunge, so wie überhaupt ihre Geschmacksorgane vortrefflich gebildet sind. Dagegen besitzen alle Mollusken eigene, oft sehr vollkommen gebildete, Betastungsorgane. Die Zunge ist im eigentlichsten Verstande des

Wortes bey allen höhern Thieren ein mit der Geschmackshaut überzogener Molluske. So wie sich die Mollusken zu Schaalthieren erheben, so hat die Zunge ihr Gehäuse ausser sich in den Zungenbeinen; nur bey den Vögeln hat sie auch einen innern Knochen, gleichsam ein inneres Skelet. Es kann nicht vertheidiget werden, das Insekt als Personifikat des Lichtsinnes anzuführen, und den Geruchsinn in einer spätern Bildungsepoche, in der Classe der Fische erst nach dem Lichtsinn entstehen zu lassen. Eben nach dem Grundsatz, das Sinnesorgan sey da, wo es entsteht, das gauze Thier, und es gewinne erst in der darauf folgenden Classe ein vom Ganzen unabhängiges Leben, — folgt, dass das Insekt, welches ganz Respirationsorgan, und der Luft ganz in seinem Innersten durchgängig ist, dem Geruchsinn entspreche. Der Fisch aber hat die erste vom Ganzen getrennte Riechhaut. Noch bey den Mollusken, auch bey jenen, welche durch Lungen athmen, ist keine Spur eines Geruchsorgans. So wie bey den Würmern dient ihnen die äussere, weiche, schwammige, mit Schleim, als einer flüssigen Epidermis überzogene Haut, etwa zu einiger Apperception der Gerüche. Bey den Insekten zuerst ist diese in die Tracheen zurückgedrängt, hat dort an Weiche, Feuchtigkeit gewonnen — und der Geruchsinn ist am mächtigsten bey denjenigen Insekten, bey welchen die Riechhaut am Eingang und im Innern der Tracheen in Bläschen aufgetrieben ist. Mittelst des Geruchs nehmen die Insekten ihre Nahrung, ihre Weibchen gewahr. Der Ge-

ruchſinn iſt der Sinn für das Geſchlecht: und da wo zuerſt die Vertheilung der entgegengeſetzten Geſchlechter an entgegengeſetzte Individuen entſchieden iſt, in der Claſſe der Inſekten, trit auch zuerſt das Geruchsorgan hervor. — Das Auge aber als das Organ der geiſtigen Anſchauung, nimmt eine höhere Entwicklungsſtufe in der Reihe der Sinne ein, als daſs es mit irgend einer Claſſe aus der Reihe der untern Thiere zuſammentreffen könnte. Als Organ der Beſchauung iſt es nur bey den höhern Thieren gebildet. Aber der Einfluſs des Lichtes auf das Thier iſt zu mächtig, als daſs es nicht früher ſchon ein beſonderes Organ von der Maſſe des Ganzen losreiſſen, und ſich gleichbilden ſollte. Schon da, wo die (thieriſche) Bildung des Polypen zum Wurme entſchieden iſt, bricht zuweilen eine zarte Knospe des Auges hervor. Bey den Inſeckten iſt das Auge eine ſehr unbeſtändige, vielem Wechſel, beſonders der Zahl nach, unterworfene Bildung. Beſonders ihre polyedriſchen facettirten Augen haben kaum mit den Augen der höhern Thiere etwas gemein. Entſcheidend aber iſt für jene Behauptung, — daſs die Mollusken in der Bildung des Auges die Inſekten bey weitem übertreffen, und die Augen der erſten, beſonders der Tintenfiſche, in ihrem Bau ſo ſehr mit den Augen der höhern Thiere übereinſtimmen.

So wie die drey unterſten Sinne am wenigſten unter ſich verſchieden ſind, und Geſchmack und Geruch nur Modificationen, höhere Potenzen, des Gefühles darſtellen; ſo wie von daher auch die Bildung ihrer Sinnesorgane im weſentlichen nicht dif-

ferirt, ſondern überall häutig, nur auf verſchiedenen Entwicklungsſtufen befangen iſt; ſo iſt auch das Material für die verſchiedenen Sinne bey den untern Thieren noch nicht genau ausgeſchieden; da auch bey den höhern Thieren einzelne Theile des Leibes nicht ausſchlieſſend einem beſondern Sinn, ſondern mehreren zugleich angehören: z. B. die Lippen, welche noch Betaſtungsorgane ſind, aber auch ſchon einigen Geſchmack beſitzen. Solche Organe ſind die gegliederten Faden, welche ſich an der Mundöffnung der Inſekten befinden. Dieſe ſind zugleich Betaſtungs- und Geſchmacksorgane: — und in allen Thierclaſſen der erſten Reihe kommen Sinnesorgane vor, welche keinem beſondern Sinn ausſchlieſſend angehören.

§. 573.

Die beyden höhern Sinne, Geſicht und Gehör, treten nur in den höhern Thierclaſſen, bey den eigentlich thieriſchen, vorzugsweiſe irritabeln, Thieren mit einiger Vollkommenheit hervor. Nur ſchwache unvollkommne Spuren derſelben werden bey den Reproductionsthieren wahrgenommen. Auch bey den höhern Thieren werden ſie nur allmählich zu gröſſerer Vollkommenheit gebildet: und bey jeder Thierclaſſe ſpiegelt ſich die eigenthümliche Natur und Beſonderheit derſelben in der individuellen Geſtaltung des Auges und des Ohres. Beyde gehören dem Univerſellen an, und es giebt keine Thierclaſſe, welche insbeſondere den Geſichtſinn oder den Gehörſinn repräſentire. Als in ſich ſelbſt geſchloſſene Organismen der edelſten Art tragen ſie

alle Potenzen des Lebens in ſich: und manifeſtiren die Eine oder die Andere überwiegend in jeder beſondern Claſſe aus der Reihe der höhern Thiere. So iſt das Auge der Vögel mehr irritabel, das Auge der Säugthiere mehr ſenſibel. Aber das vollkommenſte, am meiſten individuell gebildete Geſichts- und Gehörorgan beſitzen die Säugthiere: — denn beyde nehmen, ſo wie die Gehirnbildung Antheil an der Vollkommenheit des Ganzen. —

Der Menſch iſt vor allen Thieren durch die gröſste Harmonie in der Entwicklung der Sinnesorgane, durch deren concentriſche Stellung, und durch ihr untergeordnetes Verhältniſs zum Gehirne ausgezeichnet. Noch bey den Säugthieren iſt es mehr die Bildung des herrſchenden Sinnes, welche jene des Gehirnes beſtimmt, als daſs ſie von dieſer beſtimmt würde. Aber ſchon bey den Säugthieren iſt ein Streben nach Gleichgewicht in der Thätigkeit ſich entgegengeſetzter Sinnesorgane, — und in der Thätigkeit der einzelnen das Sinnesorgan conſtituirenden Bildungen unter ſich. Nur in dem Menſchen aber wird dieſe harmoniſche Entwicklung der Sinnesorgane, ihre concentriſche Stellung und die vollkommenſte Unterordnung ihrer Thätigkeit unter jene des Gehirnes erreicht. Der Menſch wird zwar in der Schärfe der einzelnen Sinnesorgane von einzelnen Säugthieren übertroffen: — aber eben durch die prädynamiſche Entwicklung Eines Sinnesorganes wird in ſolchen Geſchlechtern das Gleichgewicht und die Harmonie der Thätigkeit von ſich entgegengeſetzten Sinnesorganen aufgehoben.

Der Menſch beſitzt daher die vollkommenſte Sinnlichkeit.

XXV. Kapitel.

Gefühl — Geſchmack — und Geruch.

§. 574.

Durch das Gefühl, als den unterſten, und gleichſam die Wurzel aller übrigen Sinne, wird die Materie, ganz als Materie, empfunden. Er allein giebt Gewiſsheit über das wirkliche Seyn der Dinge, und iſt in dieſer Beziehung weniger als andere der Täuſchung unterworfen. Dagegen bleibt ihm jede Qualität der Materie um ſo mehr verſchloſſen, je mehr ſie ideale Beziehungen an derſelben ausdrückt. Das Gefühl erkennt unmittelbar nur dasjenige, was Ausdruck der Cohäſion an den Dingen, und zunächſt durch dieſe beſtimmt iſt, als die Ausdehnung nach der Länge, Breite, Dicke u. ſ. f., und kaum daſs aus ſeinen Perceptionen eine dunkle Ahnung der Figur, der Umriſſe, der Farbe des befühlten Gegenſtandes hervorgeht. Nur ſtarre Körper ſind das Objekt derſelben: Flüſſigkeiten, ſowohl tropfbare, als luftförmige ſind ein zu leicht verſchiebbares und wandelbares Objekt, um von dem Gefühlſinne empfunden zu werden, der bloſs das In ſich Ruhende, Erſtarrte, nicht aber das innerlich Bewegte ergreift. — Der Gefühlſinn kann aber durch Uebung, und beſonders im krankhaften Zuſtande anderer Sinnesorgane, zum höheren Potenzgrade ge-

ſteigert werden, ſo daſs er alsdann auch die mehr idealen Beziehungen an den Dingen erkennt. Denn ſo wie bey den weniger menſchenähnlichen Säugthieren, bey der Beſchränkung des Einen Sinnes der Entgegengeſetzte um ſo mehr hervortrit, ſo wie z. B. das Auge im Katzengeſchlecht ſich nur auf Koſten des Geruchsorganes zu einem höheren Grade von Vollkommenheit bildet; ſo trit gewöhnlich auch bey Menſchen, bey welchen die Entwicklung irgend eines Sinnesorgans geſtöhrt, oder beſchränkt iſt, ein anderer Sinn um ſo mehr hervor: und hierin offenbaren ſich die Gegensätze der Sinnesorgane unter ſich. So unterſcheiden Blinde mittelſt der Befühlung ſogar Farben, und ſie gelangen zu Vorſtellungen, zu welchen gewöhnlich nur die Perceptionen des Seheorgans führen. Da auf das Gefühlorgan die Materie ganz als Materie wirkt, die Wirkung von Körper auf Körper, als ſolchem, aber eine Mechaniſche genannt wird; ſo kann die Thätigkeit des Gefühlſinnes in demjenigen Verſtande eine Mechaniſche heiſsen, in welchem die des Geſchmackſinnes eine chemiſche genannt wird. Die Entwicklung des Gefühlſinnes zum Taſtſinne, der kein Eigner von dem Gefühlſinne verſchiedener iſt, an den Händen, den Lippen u. ſ. f. bezieht ſich auf dieſes mechaniſche Ergriffenſeyn des befühlten Gegenſtandes vom Sinnesorgane.

§. 575.

Eben in der Art und Weiſe, wie das Gefühl durch Betaſtung, Muskelthätigkeit, und Knochenbewegung vermittelt iſt, zeigt es ſich deutlich, daſs

der Gefühlſinn als der Unterſte und Elementarſinn noch unvollkommen vom Bewegungsorgane losgeriſſen ſey, und ſich über daſſelbe nicht vollkommen zu erheben vermöge. Daher ſind die Gefühlsnerven, die ſenſitiven Hautnerven, noch am wenigſten von den motiven oder Muskelnerven getrennt: und ſie entſtehen gröſstentheils, ſo wie dieſe vom Rückenmarke. In allen minder edlen Sinnesorganen ſind die ſenſitiven Nerven wenigſtens zum Theil noch motive Nerven; oder beyde liegen in demſelben Strange vereint, noch die Geſchmacksnerven ſind wenigſtens zum Theil Bewegungsnerven der Zunge. Erſt das Geruchsorgan beſitzt einen rein ſenſitiven, olfactiven Nerven. In den höheren Sinnesorganen bleiben die Bewegungsnerven von den ſenſitiven Nerven durchaus getrennt: ſo verhalten ſich die Ciliarnerven und die Bewegungsnerven des Augapfels zum optiſchen, ſo der Antlitznerve zum akuſtiſchen Nerven. — So wie die hart gewordene Haut dem unteren Thiere zur Befeſtigung der Muskeln dient, und, des Gefühles beynahe beraubt, ganz dem Bewegungsorgane angehört; ſo dient ſie ſelbſt noch bey einigen Säugthieren dem Hautmuskel zur Befeſtigung, durch deſſen Wirkung die mit ihm durch häufige Zelluloſität verbundene Haut in Runzeln und Falten gezogen und die Haare aufgerichtet werden. Da, wo der Hautmuskel ſehr ausgebildet iſt, bleibt das Hautgefühl ſehr unvollkommen; bey den menſchenähnlichen Thieren verſchwindet der Hautmuskel immer mehr; und bey dem Menſchen ſind nur noch einige Ueberbleibſel deſſelben in dem Stirn - Hinterhauptsmuskel, in dem Au-

genliedermuskel, in dem Hautmuskel des Halſes, in der Ausbreitung des Cremaſters in der Fleiſchhaut des Hodenſackes zugegen. Auch bey dem Menſchen ſind dieſe mit dem Hautmuskel verſehenen Hautſtellen der Runzlung fähig. An ihnen ist das Hautgefühl das unvollkommenſte; und da, wo das Hautgefühl vollkommner iſt, verſchwindet der Hautmuskel gänzlich. — In der Haut iſt das eigentliche Gefühlorgan der Papillarkörper daſſelbe, was im Auge die Netzhaut iſt. In dieſem endigen die Hautnerven. Ihre Papillen ſind ſchwammige, koniſche Erhabenheiten mit ſtumpfer Spitze, an jeder Hautſtelle von anderer Geſtaltung. Jeder Sinnesnerve, ehe er ſich im Sinnesorgane ausbreitet, contrahirt ſich in eine ſolche Papille. In jedem Sinnesorgane ſtreben die ſenſitiven Nerven ſich in eine Membran auszubreiten: am vollkommenſten iſt dieſs im Auge erreicht, wo der Sehnerve wirklich zu einer Membran, zur Netzhaut, wird. — Wichtig iſt für den Gefühlſinn die Fettlage unter der Haut. Sie giebt der Haut ihre Spannung, ihre Weichheit, ihre Glätte und Weiſſe, und macht ſie folglich geſchickt, den befühlbaren Objekten ſich mehr anzuſchmiegen, und ſomit denſelben eine um ſo gröſſere Summe von Berührungspunkten darzubieten. Eine harte, rauhe, braune, runzliche Haut ſchmiegt ſich ſehr unvollkommen ganz kleinen Körpern an, und empfindet daher nur undeutlich die kleinen Ungleichheiten der Oberfläche ſolcher Körper, deren Volumen nicht ſehr beträchtlich iſt. Daher iſt das Fettpolſter unter der Haut, welches dem Papillarkörper zur Unterlage dient, an jenen Hautſtellen

am vollkommensten entwickelt, welche das feinste Hautgefühl besitzen, z. B. an den Fingerspitzen, wo dasselbe noch ausserdem mittelst der Nägel unterstützt, und gegen den zu befühlenden Gegenstand angedrückt wird. Das Malpighische Netz, als die Chorioidea der Haut, trägt besonders mittelst der Hautausdünstung zur Feinheit des Hautgefühles bey. Ueberall ist der Papillarkörper und das Malpighische Netz in gleichem Grade entwickelt: und diejenigen Hautstellen, welche am meisten transspiriren, besitzen auch das feinste Gefühl. Bey dem Menschen befinden sich die meisten Papillen in der Haut der flachen Hand und in jener des Plattfusses. Bey den Thieren verschwinden die Papillen und mit ihnen das feinere Hautgefühl um so mehr, je mehr die Haut behaart, befiedert, beschuppt, und je mehr die Oberhaut zur hornartigen Schale entwickelt ist; sie sind gewöhnlich nur an einzelnen Hautstellen, welche die Betastungsorgane dieser Thiere sind, in grösserer Anzahl zugegen: so an der Schnauze des Maulwurfs, am Rüssel des Elephanten, und am Rollschwanz einiger Thiere. Bey den Vögeln trifft man die Papillen sehr zusammengedrängt, und in parallelen Linien geordnet nur am Plattfusse und unter den Zehen an. Bey den Amphibien verschwinden sie schon in einigen Geschlechtern, z. B. in den beschuppten Schlangen gänzlich, und weiter hinab ist nichts mehr ihnen Aehnliches in den unteren Thierclassen anzutreffen. Die Oberhaut verhindert die unmittelbare Berührung der Hautnerven mit dem zu befühlenden Gegenstand.

Je mehr ſie verdichtet, und ſchwielig iſt, deſto ſtumpfer iſt das Hautgefühl.

§. 576.

Das Gefühl als die Wurzel und die Anlage zu den höheren Sinnen iſt darum auch das Allverbreitete; es erſtreckt ſich über die ganze Hautoberfläche; nur an einzelnen Stellen erhebt ſich daſſelbe zu höheren Entwicklungsſtuffen der Sinnlichkeit, wird Geſchmack, Geruch: aber es dauert dabey auch noch als Gefühl in der Geſchmackshaut und in der Riechhaut fort. Auch iſt das Gefühl von ungleicher Feinheit an verſchiedenen Hautſtellen: es iſt ſehr fein an den Lippen, an der Eichel des männlichen Gliedes u. ſ. f. Bey den meiſten Thieren ſind die Lippen, beſonders die Unterlippe, das vorzüglichſte Betaſtungsorgan. Wenn ſie am ganzen Körper beſiedert, behaart, oder beſchuppt ſind, ſo bleibt die Hautoberfläche der Lippen nackt. Beſonders iſt dieſs der Fall bey den Wiederkäuern, und bey den einhufigen Thieren. Die Barthaare, welche einige beſitzen, und welche ſich durch ihre Länge, Härte und Rauhigkeit auszeichnen, ſind auch als Betaſtungsorgane zu betrachten, da ſie unmittelbar aus den Papillen ſelbſt ſich erheben. Da ſie ſehr ſteif ſind, ſo pflanzen ſie die ihnen mitgetheilte Erſchütterung leicht zu den Papillen der Hautnerven fort. Sonſt ſind die behaarten Hautſtellen weniger empfindlich, aber meiſtens in der Nähe ſehr empfindlicher Theile, z. B. der Bart, und der Schnurrbart in der Nähe und Umgebung der Lippen: eben so der Haarwuchs an den Schaamtheilen, unter der

Achſel u. ſ. f. — An den Lippen befinden ſich meiſtens die zum Gefühl beſtimmten Fortsätze, oder dieſe ſind ſelbſt zu einem beweglichen, zugeſpitzten Rüſſel verlängert. Bemerkenswerth iſt die Verlängerung der Oberlippe des Elephanten in den Rüſſel, in welchem dieſer beynahe ein eben ſo feines Gefühl, als der Menſch in den Fingerſpitzen beſitzt. Solche Anhangsfortsätze befinden ſich aber auch an anderen Hautſtellen, z. B. die Kämme einiger Vögel beſonders aus den Hühnerarten. Die Fiſche, welche keine Extremitäten beſitzen, betaſten mittelſt der Gefühlfaden und einiger Seitenfortsätze des Körpers, welche Finger genannt werden.

Das vollkommenſte Gefühl aber beſitzt der Menſch an den obern Extremitäten. Auſſerdem, daſs dieſe die vollkommenſten Betaſtungsorgane und am meiſten geſchickt zum Ergreifen, Feſthalten ſind; iſt ihnen auch das feinſte Gefühl verliehen. Die Anzahl, die Länge, die Abrundung, die Beweglichkeit ſeiner Finger, an deren Palmarfläche, vorzüglich an jener des nur nach hinten hornartig überkleideten Nagelgliedes — die Nervenpapillen ſehr gedrängt und in Reihen geordnet ſtehen, — verſchaffen ihm den Vorzug über alle andere Thiere.

§. 577.

Die erſte Bedingung der Schmeckbarkeit eines Körpers ist deſſen Verflüſſigung: entweder er muſs für ſich selbſt flüſſig ſeyn, oder in den Verdauungsſäften der Mundhöhle bey der gewöhnlichen Temperatur des Körpers aufgelöst werden können. Das Speichelorgan gehört daher dem Geſchmackſinne

an, und dieſer producirt das Medium ſelbſt, durch welches er ſein Objekt empſindet. Bey Fiebern, wenn die Zunge trocken, hart, und unbeweglich iſt, geht immer der Geſchmack verlohren. Starre Körper, welche im Speichel nicht auflöslich ſind, geben keinen Geſchmack, und ſie werden ſelbſt an der Zungenſpitze nur auf die nämliche Weiſe, wie an irgend einer Hautſtelle der äuſſeren Oberfläche empfunden: ſie wirken nur durch ihre Schwere, und durch den mechaniſchen Eindruck. Die Metalle im regulinischen Zuſtand ſind daher ohne Geſchmack, die Körper aber ſind um ſo ſchmeckbarer, je auflöslicher ſie ſind. Das eigentlich ſchmeckbare aber iſt das Salz, welches in der relativen Cohäſionsreihe die Indifferenz der alkaliſchen, und der Säurepolarität, eben ſo wie das neutrale Waſſer die Indifferenz der Oxygenthätigkeit, und der Hydrogenthätigkeit ausdrückt.

Die Senſation des Geſchmacks iſt eben ſo wenig durch die Annahme beſtimmter Figuren in den Elementartheilen der ſchmeckbaren Körper, als durch die Vorausſetzung eines eigenen Schmeckſtoffes in dieſen begreiflich. Es iſt nicht leichter einzuſehen, wie ein ſchmeckbarer Stoff in dem Körper durch das Geſchmacksorgan wahrgenommen, als wie dieſer ſelbſt geſchmeckt werde. Aber ſchon die ſpecifique Verſchiedenheit, und die entgegengeſetzte Beſchaffenheit der Geſchmacksempſindungen hätte das Unſtatthafte in der Annahme eines ſchmeckbaren Stoffes darthun können: man müſste eben ſo viele Schmeckſtoffe annehmen, als es ſpecifique Arten des Geſchmacks giebt. Aber dasjeni-

ge, was die Geschmacksempfindung in den Körper bringt, ist nicht etwas zu dem materiellen Substrate desselben gehöriges, ihm als ein besonderer Stoff einwohnendes, sondern das Salz hat nur für das Geschmacksorgan einen Geschmack. Der Geschmack beruht nur auf einer dynamischen Veränderung, Polarisirung der Nerven der Zunge, und der Mundhöhle: es entstehen verschiedene Geschmacksarten, ohne alle materielle Einwirkung auf diese, z. B. der bittere Geschmack bey Gallenfiebern, der eben so eine Illusion der Geschmacksnerven, wie die Photopsie für den optischen, und das Ohrensausen für den akustischen Nerven ist. Eben so bringen die sich entgegengesetzten Pole der Volta'schen Säule entgegengesetzte Geschmacksarten hervor. Schon im Gefühlsinne drückt sich der electrische Gegensatz der beyden Pole durch entgegengesetzte Empfindungen aus. Derjenige Pol, an welchem sich die positive Electricität entwickelt, bringt im Schlussmoment die Empfindung des Aufschwellens der afficirten Hautstelle, der negative Pol aber die Empfindung der Contraction in sich selber, als würde ein Loch durch die Haut geschlagen, hervor. Eben so ist auch der Gegensatz der Oberflächen befühlbarer Körper, jener der rauhen und der polirten Oberflächen von electrischer Art: der negative Pol bringt dasselbe Gefühl, welches bey dem Betasten einer rauhen Fläche, und der negative dasjenige hervor, welches bey dem Betasten polirter Oberflächen entsteht. Aber schon mehr schliesst sich das Innere der Dinge dem Geschmacksinn auf; und bey der Auflösung schmeckbarer Körper in der Mund-

höhle wird positive oder negative Polarität in den Geschmacksnerven rege. — Nämlich aus dem mittelsalzigen Geschmack gehen, als die beyden Formen desselben, der saure und der alcalische Geschmack hervor. So wie das Mittelsalz das vollkommenste Salz ist, so stellen die Säure und das Alcali in relativer Differenz, was jenes in der Indifferenz dar. Der Gegensatz des sauren Geschmackes und des alcalischen ist aber gleich dem Gegensatz von Alcali und Säure, von Hydrogenelectricität und von Oxygenelectricität. Die entgegengesetzten Empfindungen des Geschmacksinnes sind daher gleich dem Hervortreten der entgegengesetzten electrischen Pole in den Geschmacksnerven; — daher bringt der negative Pol beym Schluss der Kette den alcalischen und der Oxygenpol den sauren Geschmack auf der Zunge hervor. — Im Momente der Trennung gehen diese Geschmacksempfindungen in die entgegengesetzten über. Geschmacksinn verhält sich zu Geruchsinn wie Contraction zur Expansion: — daher giebt die Säure vorzugsweise einen Geschmack, aber die Empfindung, welche das Alcali hervorbringt, reicht schon mehr zur Geruchsempfindung hinauf. Beyde Sinnesorgane haben keine bestimmte Grenze gegen einander. — Eigentlich ist nur das Mittelsalz die Säure, und das Alcali das Objekt des Geschmacksinnes. So wie aber die flüchtige Säure und das flüchtige Laugensalz einen Geruch bringen; so geben auch andere Dinge, Inflammabilien, welche ursprünglich das Geruchsorgan afficiren, einen Geschmack, und zwar um so mehr, je weniger flüchtig,

tig, je weniger expandirt, hydrogenisirt sie sind. So giebt es noch einen aromatischen, ätherischöligen Geschmack, wobey aber die Geschmacksempfindung schon mehr zur Geruchsempfindung hinaufreicht: und wobey, so wie bey dem geistigen, weinigen Geschmack, die Expansion in den Geschmacksnerven überwiegend hervortrit. Dagegen entspricht der bittere, der adstringirende und der gerbestoffige Geschmack der Contraction, und ist mit dem Gefühle von Zusammenziehung auf der Zunge verbunden. Der süsse, schleimige Geschmack ist mehr indifferent, und steht zwischen den beyden sich entgegengesetzten Geschmacksarten, dem ätherischöligen und dem adstringirenden mitten inne.

§. 578.

Die Geschmacksnerven sind auf der zweiten Entwicklungsstuffe in der Reihe der Sinnenerven befangen. Alle Geschmacksnerven sind noch zugleich Bewegungsnerven der Zunge: jedoch bilden die drey Nerven der Zunge, nämlich der Zungenast des Unterkieferastes des fünften Paares, der Zungenfleischnerve, und der Zungenschlundnerve eine Reihe unter sich, auf solche Weise, dass zwar jeder derselben zugleich Aeste an das Fleisch der Zunge und an die konischen und schwammähnlichen Papillen abgiebt; ja sogar die Verzweigungen jenes Astes vom fünften Paare, und des neunten Paares verbinden sich unter einander, und versehen gemeinschaftlich die Papillen, jedoch ist der Zungenast des Unterkiefernerven vorzugs-

weiſe ſenſitiver Nerve der Zunge: beynahe alle Faden deſſelben enden in Papillen; obgleich einige ſchwache Faden deſſelben auch zur Muskelſubſtanz der Zunge gelangen. Dagegen hat der Zungenfleiſchnerve ſeine Benennung von daher, weil er gröſstentheils ſich in der Muskelſubſtanz der Zunge verliehrt, und nur die ſchwächeren Faden deſſelben in warzige Papillen enden. Er iſt alſo vorzugsweiſe, jedoch nicht ausſchlieſſend Bewegungsnerve der Zunge. Zwiſchen beyden inne ſteht der Zungenſchlundnerve, welcher eben ſowohl den Bewegungen der Zunge, als der Geſchmacksempfindung dient. Daher geht die Geſchmacksempfindung am meiſten durch die Unterbindung, Durchſchneidung, oder Zuſammendrückung des Zungennerven verlohren: die galvaniſche Bewaffnung des Zungenfleiſchnerven mit dem Einen Pole der Säule, und der Muskeln in der Zunge mit dem anderen Pole bringt convulſiviſche Bewegungen der Zunge hervor; da hingegen, wenn der dritte Aſt vom fünften Paare, welcher den Zungenaſt dieſes Paares abgiebt, vor ſeinem Austrit aus der Schädelhöhle in den Kreis der Säule eingeſchloſſen wird, kaum ein merkliches Zittern der Zunge entſteht. Das Verhältniſs zwiſchen dem Geſcmacks- und Geruchsorgane wird beſonders durch den Naſengaumennerven vermittelt; beyde ſtehen dadurch in dem innigſten Conſens; ſo wie von der anderen Seite die Leitung zwiſchen Geruchsſinn und Seheorgan durch den Naſenzweig des Augenhöhlenaſtes vom dritten Paare vermittelt iſt. Die Geſchmacksnerven enden in die Papillen, welche in der Geſchmackshaut nur gröſſer, mehr ver-

dichtet, und zahlreicher als in der äuſſern Haut ſind. Der Geſchmacksſinn trit ſchon an der innern Oberfläche der Lippen, ja ſogar am Rande derſelben, im Zahnfleiſch, jedoch ſehr unvollkommen hervor; er hat gegen den Gefühlſinn keine beſtimmte Grenze. Einige Gattungen des Geſchmackes werden ſchon an den Lippen empfunden. Eben ſo verhält es ſich mit der Schleimhaut des Gaumens. Der Geſchmacksſinn trit aber, um ſo vollkommner hervor, je weiter die Metamorphoſe der allgemeinen Bedeckung in eine Schleimhaut fortgeſchritten iſt. Denn die Geſchmackshaut iſt eine Schleimhaut mit ſehr entwickeltem Papillarkörper, und mit mehr zurückgetrettenem, hier ſehr verdünntem malpighiſchem Netz. Dieſe Bildung iſt am vollkommenſten in der Zunge erreicht, beſonders gegen die Zungenſpitze hin. An der Zunge bilden die koniſchen Papillen einen Gegenſatz gegen die ſchwammigen, die Erſten theilen ſich an ihrer Spize in mehrere Faden: und ſind beſonders zahlreich gegen die Zungenſpitze, und gegen die Mitte der Zunge hin, da ſie an den Seitentheilen derſelben in ſtumpfere Hügelchen enden. Die ſchwammigen befinden ſich in gröſſerer Anzahl gegen die Wurzel der Zunge hin: ſie ſitzen auf einem dünneren Stiele, und ſind an der Spitze aufgetrieben. Sie verhalten ſich unter einander wie die entgegengeſetzten Geſchmacksarten: dem alkaliſchen Geſchmacke entſprechen die koniſchen, dem ſauern die ſchwammigen Papillen. Daher wird der Erſte beſonders und beynahe ausſchlieſſend an der Zun-

genſpitze wahrgenommen. Die kelchähnlichen Papillen ſind beſonders als Ausführungsgänge der Zungendrüſen zu betrachten. Die Papillen der Zunge ſind der Erection fähig, z. B. bey dem Anblick, oder bey dem wirklichen Genuſſe einer wohlſchmeckenden Speiſe. Die Papillen liegen nicht in allen Thiergattungen frey, und nur durch eine dünne Epidermis bedeckt. Die Oberhaut iſt öfters da, wo ſie die Papillen umgiebt, ſchon unter den Säugthieren im Katzengeſchlechte, zu hornartigen Schaalen verdichtet, welche dieſelben wie Nägel umgeben. Bey den Vögeln iſt dieſe Schaale öfters ſogar knorplich und knöchern. Bey den Amphibien verſchwindet ſchon der Gegenſatz zwiſchen den koniſchen und den ſchwammigen Papillen; nur die Erſten ſind noch übrig. Die Geſchmackshaut iſt öfters ſchon zottig: bey den Fiſchen iſt endlich keine Art von Papillen mehr wahrzunehmen. Der Geſchmacksſinn iſt daher nirgendwo ſo vollkommen, als in der Claſſe der Säugthiere, und unter dieſen beſonders bey den Wiederkäuern, als den Reproductionsthieren unter denſelben, bey welchen daher die Maſtication höchſt ſinnig iſt. Nach vorne ſind bey den Wiederkäuern die koniſchen Papillen am vordern Theile der Zunge ſehr häufig und gedrängt; die ſchwammigen ſind an der hintern Hälfte der Zunge ſehr groſs, und die kelchförmigen beſonders häufig. Ueberhaupt iſt die Vollkommenheit des Geſchmackſinnes in den verſchiedenen Thiergattungen im Verhältniſs der Gröſse und der Anzahl der Geſchmacksnerven, da ihre Anzahl in der Claſſe der Fiſche auf zwey vermindert

ist; sie richtet sich nach der Bildung der Papillen: nach der Freyheit derselben. Denn so wie das Hautgefühl um so stumpfer wird, je mehr die Epidermoidalbildung prävalirt, eben so nimmt die Feinheit des Geschmackes in dem Grade ab, als die Epidermis der Zunge mehr hornartig, lamellös gebildet ist, je mehr die Zunge beschuppt, incrustirt, oder mit Zähnen besetzt ist. Eben so hängt die Vollkommenheit des Geschmacksinnes auch von dem Umfang und von der Beweglichkeit der Zunge ab. Bey den Vögeln ist der Geschmacksinn auch aus dem Grunde sehr stumpf, weil ihr sehr grosses Zungenbein die Bewegungen der Zunge sehr erschwert; bey vielen Amphibien ist die Zunge bis an die Spitze angewachsen, bey dem Krokodile nicht bloss in der Mitte durch ein bis dahin verlängertes Zungenbändchen, sondern auch an den beyden Seiten. Der Geschmack des Menschen ist ursprünglich sehr fein, er wird aber durch den Genuss der so verschiedenartig gemischten Nahrungsmittel, und besonders durch jenen der geistigen Getränke sehr abgestumpft.

§. 579.

Das Schema der Perception des Geruchssinnes ist der electrische Prozess: und die erste Bedingung der Riechbarkeit eines Körpers ist dessen Inflammabilität. Diese Sinnesgewahrnehmung hat eben so wenig ein materielles Substrat, als die übrigen: — es giebt keinen eigenen Riechstoff, kein besonderes Arom, keinen Spiritus rector, welcher als ein besonderer constitutiver Bestandtheil, und

von den übrigen verſchieden, den riechbaren Körpern einwohnte. Fourcroy's Meynung iſt dieſe: die riechbaren Stoffe der Körper ſeyen nur die durch Wärme verflüchtigten ätheriſchöligen oder andere Beſtandtheile derſelben. Allerdings geben manche Körper nur bey ihrer Verflüchtigung und Verwandlung in Gaſsform einen Geruch. So hat nur die flüchtige überſaure Kochſalzsäure, ſo nur die in Dämpfen aufſteigende unvollkommne nitröſe Säure, ſo nur das aus dem Salmiack oder aus andern mittelſalzigen Verbindungen ausgetriebene Ammonium einen Geruch. Aber daraus, daſs verflüchtigte Körper riechen, folgt ja doch keineswegs, daſs die Senſation des Geruches durch gaſsförmig ausſtrömende Partikeln bewirkt werde. Nicht jede Geruchsempfindung iſt mit einer Verdünſtung verbunden. Wenigſtens erleiden manche Körper, z. B. ein Gran Moſchus, welcher 20 Jahre lang die ausgedehnteſte und ſtets erneuerte Atmosphäre mit den durchdringendſten Gerüchen erfüllt, nicht die mindeſte, wahrnehmbare Gewichtsabnahme. Manche Körper verdünſten, ohne Geruch zu veranlaſſen; — und viele riechen, ohne zu evaporiren; z. B. geriebenes Kupfer. — Obgleich allerdings in der Luft ſchwebende Stoffe einen Geruch hervorbringen können, ſo hat doch die Entſtehung von Gerüchen einen ganz andern Grund als die Evaporation; und ſie iſt ganz unabhängig von der Ausſtrömung körperlicher Partikeln. Es iſt eine rein dynamiſche Einwirkung des riechenden Körpers auf das Geruchsorgan; und ſo wie keine ſchallende Partikeln von dem ſchallenden Körper ausſtrömen; ſo empfindet

das Geruchsorgan ſein Objekt auſſer materieller Berührung durh das Medium der Luft hindurch. Fourcroy's Theorie iſt nur ein verfeinerter Materialismus: aber materialiſtiſch bleibt ſie immer. — Die Verbreitung der Gerüche geſchieht übrigens ganz auf dieſelbe Weiſe, wie die Verbreitung der Wärme. — Alle Gerüche ſind entzündlich, und daher durch die Wirkung flüchtiger mineraliſcher Säuren zerſtörbar. Wenn dieſe ſelbſt durch das Geruchsorgan wahrgenommen werden, ſo iſt die Geruchsempfindung ſchon mehr zur Geſchmacksempfindung herabgeſetzt.

§. 580.

Der Geruchsſinn beſitzt gleich den höheren Sinnesorganen einen rein ſenſitiven Nerven, und nun erſt erſcheint der Sinn ganz vom Bewegungsorgan getrennt: eben ſo iſt in allen höheren Sinnesorganen die Einheit der Perception durch die Einheit des ihr vorſtehenden Nerven bezeichnet. Nämlich die Riechhaut erhält auſſer dem olfactiven Nerven noch viele andere, als z. B. gangliöſe Nerven, von dem Knoten, welcher die innere Kieferſchlagader bis zu ihrer letzten Veräſtung verſieht. Dieſe ſind die Gefäſsnerven der Riechhaut, und ſtehen der Schleimabſonderung, als gangliöſe Nerven vor. Der Ethmoidalaſt des Augenhöhlennerven vom fünften Paare iſt als ein Leiter zwiſchen Geruchsorgan und Geſichtsorgan, — der vom Meckelſchen Ganglion herſtammende Keilbein - Gaumennerve aber iſt als ein Leiter zwiſchen dem Geruchsorgan und dem Geſchmacksorgan zu betrachten. Die Senſibilität of-

fenbart ſich in der Riechhaut zuerſt als empiriſche oder Cerebralſenſibilität, welche durch dieſe zahlreichen, nicht olfactiven, Nerven vermittelt iſt: — dann als ſenſitive, ſpecifique, welche nur dem erſten Gehirn - Nervenpaare angehört. Denn nur wenn der Geruchsnerve Einer Seite oder von beyden Seiten zugleich durch krankhafte Metamorphoſe eine Desorganiſation erleidet, ſo geht jedesmal der Geruch, entweder nur auf der Einen, und zwar auf der — der leidenden entgegengeſetzten — Seite, oder auf beyden zugleich verloren. Dagegen bringt die Verletzung oder totale Zerſtörung irgend Eines jener anderer Nerven, z. B. eines Zweiges vom fünften Paare, keine merkliche Veränderung der Senſation des Geruches hervor.

Die Unabhängigkeit beyder Arten von Cerebralſenſibilität in der Schleimhaut der Naſenhöhle erhellet beſonders aus den Erſcheinungen des kranken Zuſtandes. So iſt bey dem Schnupfen die Cerebralſenſibilität krankhaft geſteigert, indem dieſe ſchmerzhaft iſt, und bey der leiſeſten Berührung die gröſste Empfindlichkeit äuſſert, indeſs zugleich die olfactive Senſibilität deprimirt iſt, und kein Geruch, wenn er nicht ſehr heftig und durchdringend iſt, von der Schneiderſchen Haut empfunden wird. Beſonders aber zeigt ſich die Verſchiedenheit, und wechſelſeitige Unabhängigkeit beyder von einander in den ſeltnen Fällen von Geruchloſigkeit, wobey der Kranke keine Art des Geruches unterſcheiden kann, und dennoch die Empfindlichkeit der Schneiderſchen Haut für ſogenannte mechaniſche Eindrücke, und chemiſche Einwirkungen unverletzt erhal-

ten ist. — Jene Nasennerven, das erste Cerebralnervenpaar ausgenommen, verhalten sich als wahre Hautnerven, oder Gefühlsnerven.

Die Feinheit des Geruches hängt von der innern Bildung und zugleich von der Ausdehnung und dem Flächeninhalt der Riechhaut ab. Um diesen zu vergrössern, und dem Objekte der Sensation eine desto ausgedehntere Oberfläche darzubieten, tragen die 3 Nasenmuscheln, die obere, mittlere und untere, über welche die Schneidersche Haut ausgespannt ist, nicht wenig bey. Diese schwammigen Beine, welche die innere Oberfläche der Nasenhöhle beträchtlich vergrössern, ohne dass hiedurch eine Vergrösserung der Höhle selbst, und eine disproportionirliche Prominenz derselben in den Gesichtstheilen veranlasst würde, ragen daher bey solchen Thieren, die einen sehr feinen Geruch besitzen, mehr als bey andern hervor, und sind mehr gewunden, mehr schwammig aufgetrieben, und die Rinnen, die sich zwischen den einzelnen Muscheln befinden, sind von weit ansehnlicherer Tiefe. — Die Schneidersche Haut ist an denjenigen Stellen, wo sie an den Muschelbeinen adhärirt, ganz verschieden von andern Stellen ihres Verlaufes gebildet. Hier ist sie viel dichter, schwammiger, mehr aufgelockert. Dagegen ist sie in den Anhangshöhlen mehr dünne und härtlich, indem sie in ihrer Textur mehr den Cohäsionsgrad der Beinhaut erreicht. Jene Höhlen sind durch Expansion der Nasenhöhle gebildet. Daher trit die Periode ihrer Entstehung und Ausbildung später als jene der Bildung der Nasenhöhle ein. Bey dem Fötus existiren die mei-

ſten jener Anhangshöhlen noch nicht, und im kindlichen Alter ſind ſie relativ von weit geringerem Umfange, als bey dem Erwachſenen. Die Schleimhaut der Stirnhöhlen und Hygmorshöhlen, der Riechbeinhöhlen, der vordern und hintern Keilbeinhöhlen, beſitzt keine olfactive Senſibilität: und wahrſcheinlich erſtrecken ſich keine Faden des Riechnerven in dieſelben. Aber ſie beſitzt viele andere Nerven und einen hohen Grad von Cerebralſenſibilität. Nachdem bey lebendigen Thieren die Stirnhöhle oder die Hygmorshöhle durch Trepanation geöffnet iſt; kann man ſich deutlich, wenn ein Stilet durch die gemachte Oeffnung eingebracht, und damit die Schleimhaut betaſtet wird, von der groſsen Empfindlichkeit derſelben überzeugen. Daſſelbe geſchah bey einem Menſchen, der eine callös gewordene Fiſtelöffnung in den Stirnhöhlen trug. Aber in eben dieſen Fällen zeigt es ſich ganz deutlich, daſs die Schleimhaut der Stirnhöhlen keine olfactive Senſibilität beſitze. Dechamps konnte durch eine Fiſtel der obern Extremität der Naſenhöhle in die Stirnhöhle eine mit den durchdringendſten Gerüchen geſchwängerte Luft eintreiben, ohne daſs der Kranke den mindeſten Geruch davon hatte, da umgekehrt dieſelbe mit Gerüchen imprägnirte Luft auf der Schneiderſchen Haut die lebhafteſten Empfindungen des Geruches hervorbrachte. Die Anhangshöhlen des Geruchsorgans verhalten ſich zu dieſem, wie die Zellen des Warzenfortſatzes zum Gehörorgan. So wie dieſe nur zur Verſtärkung der Schallſtralen dienen, ſo jene zur Verſtärkung der Gerüche, indem ſich eine gröſſere Quantität der mit Gerüchen im-

prägnirten Luft in ihnen ansammelt, und länger darin aufhält. Daher sind bey jenen Thieren, welche den feinsten Geruch besitzen, besonders die Keilbeinhöhlen vom gröſsten Umfange. Der gröſste Theil ihres Gesichtes besteht aus solchen Höhlen, und daher rührt die Leichtigkeit des Schädels bey dem gröſsten Umfange desselben, indem die meisten Gesichtsknochen hohl sind, und ihre Höhlen mit der Nasenhöhle in Verbindung stehen. Diese Höhlen, die bey dem menschlichen Fötus zum Theil noch nicht vorhanden sind, bilden sich später eine nach der andern. Zuerst die Oberkieferhöhle im 7ten oder 8ten Monate der Gestation, die Keilbeinhöhlen kurz vor, oder nach der Geburt, die Stirnhöhlen in dem ersten Lebensjahre. Sie bilden sich keineswegs nach Art anderer Knochenhöhlen durch die Expansion einer von allen Seiten durch compactes Knochengewebe geschlossenen Knochenmarkhöhle, sie öffnen sich nicht in die Nasenhöhle, sondern sie bilden sich aus dieser hervor. Nämlich es entsteht zuerst ein Eindruck des Knochens an derjenigen Stelle der Nasenhöhlenwandung, an welcher sich später das Verbindungsloch derselben mit jener Anhangshöhle befindet. Diesem Eindrucke bleibt überall die Schneidersche Haut fest angeschlossen, und er selbst scheint nur aus dem Triebe dieser zu excentrischer Metamorphose gebildet zu seyn. Dieser Eindruk vergröſsert sich immer mehr, evolvirt sich nach und nach zu einer Höhle mit einem erweiterten Grunde, und mit einem verengerten Eingange, in einem vorher ganz compacten Knochen.

Der eigentliche Sitz des feinsten Geruches ist an dem obersten und vordern Theil der Nasenhöhle. Hier ergeben sich jener Schleimhaut die meisten Faden des olfactiven Nerven, der die Löcher des Siebbeins auf dieselbe Weise durchbohrt, wie der Sehnerve das Siebhäutchen vor seinem Eintrit in die Augenhäute. Beyde Siebplatten, hier die knöcherne, dort die membranöse drücken nur auf die Expansion und auf das strahlichte Auseinanderfahren des Sinnesnerven in dem Sinne selbst. Der Geruchsnerve, nachdem er aus den Zellen des Siebbeines hervorgetreten ist, expandirt sich in unzähligen Bündeln, bildet hiedurch eine Art von parenchymatösem Gewebe, welches, mit dem eigenthümlichen Gewebe der Schleimhaut auf das vollkommenste vereiniget, von dieser durchaus nicht zu unterscheiden, oder anatomisch zu trennen ist. Die warzenförmige Bildung der Sinnenerven an ihrer peripherischen Endigung hört schon im Geruchsorgan auf: und hier trit die fadige pulpöse ein. Die Riechhaut unterscheidet sich vor andern Schleimhäuten auffallend durch ihre Röthe, durch ihre Dichtigkeit, und durch ihre mehr schwammige Textur. Innigst vermischt sich mit ihrem eigenthümlichen Gewebe die Pulpe des Riechnerven, da das wenige Nevrilemma desselben sich mit dem athmosphärischen Zellengewebe, welches die Schleimhaut an das Periost anheftet, verbindet. Diese Schleimhaut transspirirt wie jede andere, und setzt die peripherischen Endigungen der Geruchsnerven in unmittelbare Berührung mit einer wässerigen Feuchtigkeit, in welcher diese baden, und dadurch in ihrer Weichheit

erhalten werden. Sie ſondert auſſerdem häufige Mucoſität ab, und incruſtirt ſich und jene Nervenpapillen mit einer Schleimlage, welche als eine halbflüſſige Epidermis den unmittelbaren Contact derſelben mit der atmosphäriſchen Luft und deren Vertrocknung verhindert. Auch die Schleimabſonderung in den Anhangshöhlen der Naſe iſt nicht unbeträchtlich, und wenn die Schleimhaut derſelben catarrhaliſch entzündet, oder ihre Ausführungsgänge in die Naſenhöhle verſtopft ſind, ſo entſtehen verſchiedene Krankheiten von der Anſammlung der Mucoſität in denſelben. So wie nun der Sinn des Geſchmackes in der Mundhöhle entfaltet iſt, und vorzugsweiſe der Digeſtion angehört; der Sinn des Geruches aber in der Naſenhöhle und daher ein direktes Verhältniſs zur Reſpiration bezeichnet, ſo inſpirirt man, um irgend einen Geruch genau zu unterſcheiden, beynahe einzig durch die Naſe, und ſchlieſst den Mund, um die ganze Maſſe der einzuathmenden Luft durch die Naſe zu ziehen, daher erweitert man in gleicher Abſicht beyde Naſenlöcher. Umgekehrt wenn man einen unangenehmen Geruch vermeiden will, ſo verengert man unwillkührlich die beyden Naſenlöcher, was ſich durch das Naſenrümpfen ausdrückt, und man athmet bloſs durch die Mundhöhle ein.

XXVI. Kapitel.

Gehör.

—

§. 581.

Der Schall ist nicht das Produkt einer mechanischen Vibration des schallenden Körpers, und der Fortleitung dieser Vibration durch die Luft: — sondern der Schall ist eine dynamische Influenz, wodurch die Dinge ihr Innerstes kund geben. Der schallende Körper ist ein in sich ruhender, starrer, durch äussern mechanischen Anstoss bewegter: aber die Vibrationen desselben, welche den Schall bilden, sind nicht die Folge der ihm mechanisch mitgetheilten Bewegung, sondern Ausdruck des Bestrebens, wieder in seinen Ruhezustand zurückzukehren: der Klang ist die Sehnsucht des in seinem Innersten Bewegten nach Ruhe: das Bestreben, die Einheit des Ganzen den Theilen zu verleihen, und das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen. In dem Klange spricht sich daher auf ideale Weise das Wesen des Magnetismus aus, welcher das Bestreben ist, in sich als ein Ganzes zu ruhen, und die Identität der Totalität einzupflanzen. Der Schall hat daher, so wie alles dem Magnetismus angehörige, sowohl in seiner Entstehung als Fortleitung, den Schein einer mechanischen Bewegung: aber er ist eben so wenig eine Bewegung des Körpers in Masse, als eine Bewegung seiner Atome, deren Annahme als körperlicher Elementartheile ohnehin nicht zulässig ist. Die mag-

netische Natur des Schalles offenbart sich auch in seinem Streben nach Gestaltung: jedem Ton entspricht eine bestimmte Gestalt; und diess ist der Grund der Entstehung der chladnischen Figuren. Nur starre und elastische, das heisst, bey äusserer Ruhe innerlich bewegliche Körper, sind idiosonor: Flüssigkeiten, besonders elastische, sind Leiter für den Schall, das Medium, durch welches der schallende Körper dem Gehörorgane sich kund giebt. Tropfbare Flüssigkeiten, z. B. das Wasser, scheinen sich hier als Halbleiter zu verhalten. Die verschiedenen Gasarten besitzen nicht einerley Leitungsfähigkeit für den Schall. Die Leitungsfähigkeit irgend einer Luftart verhält sich überhaupt, wie die Elasticität derselben: daher pflanzt sich der Schall an heitern Wintertagen am leichtesten, und in die grösste Entfernung fort. Die Fortpflanzung des Schalles geschieht gleich jener des Lichtes in gerader Richtung, und ist eine excentrisch-ausstrahlende: — sie wird nur von dem Lichte an Geschwindigkeit der Bewegung übertroffen. Die Stärke des Schalles hängt von der grössren oder geringeren Ausdehnung der Schwingungen des schallenden Körpers ab. Die Geschwindigkeit der Aufeinanderfolge dieser Schwingungen aber bestimmt den Ton. Die Höhe desselben steht im Verhältnisse der Geschwindigkeit der Vibration. Der schallende Körper verändert hiebey seine Oberfläche: und geräth in einen Wechsel von contractiver und expansiver Bewegung: bey dem hohen Ton ist eine rasche Aufeinanderfolge expansiver und contractiver Thätigkeit, und in dieser ist das Moment der Expan-

XXVI. Kapitel.

Gehör.

—

§. 581.

Der Schall ist nicht das Produkt einer mechanischen Vibration des schallenden Körpers, und der Fortleitung dieser Vibration durch die Luft: — sondern der Schall ist eine dynamische Influenz, wodurch die Dinge ihr Innerstes kund geben. Der schallende Körper ist ein in sich ruhender, starrer, durch äussern mechanischen Anstoss bewegter: aber die Vibrationen desselben, welche den Schall bilden, sind nicht die Folge der ihm mechanisch mitgetheilten Bewegung, sondern Ausdruck des Bestrebens, wieder in seinen Ruhezustand zurückzukehren: der Klang ist die Sehnsucht des in seinem Innersten Bewegten nach Ruhe: das Bestreben, die Einheit des Ganzen den Theilen zu verleihen, und das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen. In dem Klange spricht sich daher auf ideale Weise das Wesen des Magnetismus aus, welcher das Bestreben ist, in sich als ein Ganzes zu ruhen, und die Identität der Totalität einzupflanzen. Der Schall hat daher, so wie alles dem Magnetismus angehörige, sowohl in seiner Entstehung als Fortleitung, den Schein einer mechanischen Bewegung: aber er ist eben so wenig eine Bewegung des Körpers in Masse, als eine Bewegung seiner Atome, deren Annahme als körperlicher Elementartheile ohnehin nicht zulässig ist. Die mag-

netische Natur des Schalles offenbart sich auch in seinem Streben nach Gestaltung: jedem Ton entspricht eine bestimmte Gestalt; und diess ist der Grund der Entstehung der chladnischen Figuren. Nur starre und elastische, das heisst, bey äusserer Ruhe innerlich bewegliche Körper, sind idiosonor: Flüssigkeiten, besonders elastische, sind Leiter für den Schall, das Medium, durch welches der schallende Körper dem Gehörorgane sich kund giebt. Tropfbare Flüssigkeiten, z. B. das Wasser, scheinen sich hier als Halbleiter zu verhalten. Die verschiedenen Gassarten besitzen nicht einerley Leitungsfähigkeit für den Schall. Die Leitungsfähigkeit irgend einer Luftart verhält sich überhaupt, wie die Elasticität derselben: daher pflanzt sich der Schall an heitern Wintertagen am leichtesten, und in die grösste Entfernung fort. Die Fortpflanzung des Schalles geschieht gleich jener des Lichtes in gerader Richtung, und ist eine excentrisch-ausstrahlende: — sie wird nur von dem Lichte an Geschwindigkeit der Bewegung übertroffen. Die Stärke des Schalles hängt von der grössren oder geringeren Ausdehnung der Schwingungen des schallenden Körpers ab. Die Geschwindigkeit der Aufeinanderfolge dieser Schwingungen aber bestimmt den Ton. Die Höhe desselben steht im Verhältnisse der Geschwindigkeit der Vibration. Der schallende Körper verändert hiebey seine Oberfläche: und geräth in einen Wechsel von contractiver und expansiver Bewegung: bey dem hohen Ton ist eine rasche Aufeinanderfolge expansiver und contractiver Thätigkeit, und in dieser ist das Moment der Expan-

ſion das vorherrſchende, bey dem tiefen Ton folgen ſich die Schwingungen langſamer, und der Moment der Contraction iſt vorherrſchend. Der Zerlegung des Lichtes in die Grundfarben entſpricht die Zerlegung des Schalles in die ſieben Grundtöne. Wie ſich zu dem Weiſſen das Schwarze, ſo verhält ſich zu dem Grundton die tiefere Octave: zwiſchen beyden inne ſtehen die ſechs anderen Töne, wie die ſechs Farben zwiſchen dem Weiſſen und Schwarzen. Die Conſonanz des Grundtones und ſeiner Octave iſt gleich der Schattirung des Lichtes, und ſomit gewährt beydes Harmonie. Miſslaute entſtehen, wenn Töne ſich folgen, die ſich nicht entſprechen, und Disharmonie der Farben, wenn ſolche Farben, die ſich nicht entſprechen, nebeneinander aufgetragen ſind. Die Grundfarben ſind als die einfachen Actionen des Lichtes, die Grundtöne ſind als die einfachen Actionen des Schalles zu betrachten. Im Momente des Uebergangs der Einen Grundfarbe in die andere entſtehen durch Nuancen und Schattirung die Uebrigen, oder die gemiſchten Farben. So liegen die halben Töne zwiſchen den Grundtönen inne. — Gleich den Lichtſtrahlen ſind die Schallſtrahlen der Refraction und Reflexion fähig. Weiche, und nicht hinreichend geſpannte Körper ſind den Schallſtrahlen durchgängig gleich: ſie verhalten ſich zum Schalle wie durchſichtige Körper zum Licht. Aber ſie werden reflectirt an der Oberfläche harter und elaſtiſcher Körper, in Winkeln, welche ihren Anprellungswinkeln gleich ſind. Es entſteht durch dieſe Reflexion des Schal-

les

les der secundäre Ton, oder der Nachklang, welcher die Stärke des ursprünglichen Klanges vermehrt. Wenn der Nachklang den vollen Inhalt des ursprünglichen Schalles wiederholt, und später als dieser gehört wird, so entsteht das Echo. Das Echo verhält sich zu dem ursprünglichen Klange, wie das im Spiegel verzeichnete Bild des Gegenstandes zu dem abgespiegelten Objecte. — Die Schallstrahlen lassen sich gleich den Lichtstrahlen zur convergirenden Bewegungsrichtung bringen, im Focus sammeln, und so mit deren Wirkung verstärken.

§. 582.

Da nur das Gleiche von dem Gleichen empfunden wird, die wahrhaft entgegengesetzten aber nirgendwo weder sich suchen, noch finden, so kann auch nur das Harte, Gediegene und Metallische im Organismus sich zum Gehörorgan bilden. Daher wird der Schall wahrgenommen früher, als ein besonderes, einzeln für sich unterscheidbares Gehörorgan sich bildet. Denn der Schall wirkt gleich dem Lichte nicht bloss auf das ihm entsprechende Sinnesorgan, sondern unmittelbar auf den ganzen thierischen Leib. Im allgemeinen sind aber die der harten Theile beraubten, skeletlosen oder Reproductionsthiere auch ohne besonderes Gehörorgan. Die erste Spur eines solchen findet sich bey den Tintenfischen, welche überhaupt eine höhere Thierclasse unter den Mollusken repräsentiren. Dagegen, so wie die Mollusken mit einer harten

Schaale ſich umgeben und Cruſtaceen werden, fehlt auch nirgends ein Rudiment von Gehörorgan. So wie bey dem Krebſe der ganze Leib beſchaalt iſt, ſo bildet ſich bey ihm der erſte Labyrinth in einem harten, hornartigen Knochenplättchen, in welchem der Hörnerve eingeſchloſſen iſt.

§. 583.

Das Gehörorgan bildet ſich aber ganz von innen nach auſſen, ſo wie auch der Schall nur eine Veräuſſerlichung des Innerlichſten iſt. Es giebt drey Gehörhöhlen, welche in derſelben Ordnung auf einander folgen, als ſie mehr äuſſerlich ſind. Die erſte iſt der Labyrinth, die zweyte iſt die Trommelhöhle, die dritte iſt der äuſſere Gehörgang. Die Aufeinanderfolge dieſer drey Höhlen iſt jene der höhern Thierclaſſen. Bey den Fiſchen erſcheint zuerſt der Labyrinth als eine conſtante Bildung: — die Trommelhöhle kömmt im Gehörorgan der Vögel hinzu: und zugleich wird die Bildung des Labyrinthes reicher und mannichfaltiger. Die Claſſe der Vögel bezeichnet eine neue Bildungsperiode für das Gehörorgan. Es entſteht eine neue Bildung: — und die vorhandenen werden reicher und mannichfaltiger ausgeſtattet. Eine dritte Gehörhöhle, ein knöcherner äuſſerer Gehörgang bildet ſich in der Claſſe der Säugthiere. Die Evolution des Gehörorgans iſt alſo eine ſucceſſiv von innen nach auſſen fortſchreitende Knochenproduction. Bey dem menſchlichen Fötus iſt noch der äuſſere Gehörgang knorpelich, nicht verknöchert: — und ſelbſt bey dem Erwachſenen bleibt das äuſſere Ohr, und der An-

fang der Eustachschen Trompete knorpelich; welche letzte dagegen bey den Vögeln ganz knöchern ist.

§. 584.

Schon bey seinem Eintrit in den gemeinschaftlichen Canal des innern Gehörganges ist der Sehnerve in drey Hauptäste getheilt: überhaupt trit die fadenartige Bildung im Gehörnerven früher, als im optischen Nerven hervor, der eine in sich homogene Substanz darstellt, bis er bey seinem Durchgange durch das Siebhäutchen in vereinzelnte Faden zerfährt. Mit jenen 3 Hauptästen umfängt er den Antlitznerven. Wenn gleich dieser in seinem ganzen Verlaufe von seinem Anfange her bis zu seiner peripherischen Endigung von dem eigentlichen Gehörnerven immer getrennt bleibt, und nirgendwo durch einen Faden mit ihm in organische Gemeinschaft trit, so deutet doch die räumliche Nähe beyder Nerven, und die Art, wie die 3 Aeste des Hörnerven den Antlitznerven umfassen, auf die nähere Beziehung beyder auf einander hin. Auch versieht der Antlitznerve während seines Verlaufes in den ihm bestimmten knöchernen Canälen im Felsenbein, und vor seinem Austrite aus dem Griffelwarzenloch die Muskeln der Gehörknöchelchen mit Aesten, so den Muskel des Steigbiegels, den Paukenfellspanner, &c., so wie er nach seinem Austrite aus dem Griffelwarzenloche die äussern Theile des Ohres, der Schleimhaut des äussern Gehörganges, und die bewegenden Muskeln des Ohres, sowol die äussern, als die innern mit Nervenfaden versieht. Der

Antlitznerve verhält ſich alſo zu dem Gehörorgane, wie ſich das dritte Nervenpaar in ſeinen zwey Hauptäſten, das vierte, ſechste und der Orbitalaſt des fünften zum Geſichtsorgane verhalten. So wie die Ciliarnerven, welche beſonders die Gefäſshäute des Auges mit Nerven verſehen, einen Gegenſatz gegen den optiſchen Nerven bilden, ſo wird das Trommelfell, und die Muskeln der Gehörknöchelchen von dem vorzüglichſten Aſte des Antlitznerven mit Faden verſehen. So wie aber alle motiven Nerven des Augapfels, nachdem ſie die Augenhöhle oder ihre dort gegrabenen knöchernen Canäle verlaſſen haben, ſich in Geſichtsmuskeln und in die Haut verbreiten, ſo auch der Antlitznerve, der jetzt erſt dieſen Namen verdient. Jene urſprüngliche Trichotomie des Gehörnerven iſt aber beſonders darum merkwürdig, weil jeder ſeiner 3 Aeſte ſich in einem beſondern Theile des Labyrinthes verbreitet. Der knöcherne Labyrinth iſt bey den höhern Thieren nur eine Incruſtation des membranöſen. Die Membran des Labyrinthes iſt ſchon bey den Fiſchen durch mehrere verengerte Stellen in einzelne Höhlen getheilt, welche die 3 halbzirkelförmigen Canäle bilden: aber theils nicht in einer beſondern knöchernen Höhle eingeſchloſſen, ſondern frey in der Schädelhöhle enthalten, theils zwar mit knöchernen Halbzirkeln umgeben, aber durch beträchtliche Abſtände von ihnen getrennt ſind. Die Gehörknöchelchen ſind urſprünglich in der Membran des Labyrinthes eingeſchloſſen, und adhäriren den pulpöſen Nervenfaden ſelbſt, deren Incruſtation ſie ſind. Was vom Labyrinthe nicht zu den 3 halbzirkelförmigen Canälen

gehört, bleibt als ein Sack, in welchen die Mündungen der Canäle offen ſtehen, d. h. als Vorhof zurück: — unter den Amphibien erſcheint die doppeltbläterige Schnecke nur bey den Crocodillen und Eidechſen: — aber der knöcherne Labyrinth umgiebt den membranöſen immer enger, und liegt ihm in den genannten Geſchlechtern ganz an. Bey den Vögeln iſt die Schnecke eine conſtante Bildung: aber nur bey den Säugthieren iſt ſie wirklich ſchneckenförmig gewunden. Gleichzeitig mit dem Entſtehen der Schnecke verſchwinden die Steine, welche noch der Labyrinth der meiſten Amphibien enthält. Bey den Säugthieren iſt auch der Labyrinth in dem härteſten unter allen Knochen, im Felſentheil des Schläfebeines eingeſchloſſen. Die Membran des Labyrinthes iſt auch bey ihnen nicht als ein inneres Perioſt zu betrachten. Sie iſt eine eigenthümliche Haut, welche ſackartig gebildet iſt und die beyden Fenſter des Labyrinthes verſchlieſst. Sie iſt mit einer ſeröſen und lymphatiſchen Feuchtigkeit angefüllt, welche die Lymphe des Cotunni heiſst, und in der die peripheriſchen Terminationen des weichen Gehörnerven baden. Dieſe Lymphe iſt zur Sinnesverrichtung des Gehörorgans weſentlich erforderlich. Der Ausfluſs derſelben bey der Zerreiſſung der Membran des runden Fenſters, oder ihre Vertrocknung im höhern Alter hat unheilbare Taubheit zur Folge. Wenn man bey ſehr ſtrenger Winterkälte die Gehörwerkzeuge von den einige Zeit in der Kälte liegen gebliebenen Cadavern alter tauber Menſchen zergliedert, ſo findet man in ſehr vielen Fällen kein Eis im Labyrinthe, und in der

Paukenhöhle, ſo wie man dieſs gewöhnlich bey jungen wohlhörenden Subjekten findet. Dieſe Flüſſigkeit erleidet durch die Wirkung des. Schalles nicht bloſs eine mechaniſche Erſchütterung, welche ſie etwa durch wellenförmige Bewegung zu den filamentöſen Endigungen des Sehnerven fortpflanzte. Sondern die verſchiedenen Töne bringen eine dynamiſche Veränderung jener Lymphe hervor, welche einer Galvaniſchen Waſſerzerſetzung gleich iſt: — und der mittelſt dieſer Flüſſigkeit in die Kette eingeſchloſſene Nerve wird auf dieſelbe Weiſe bey hohen Tönen, wie durch die Wirkung des negativen Poles der Säule, und bey tiefen Tönen, wie durch den poſitiven Pol afficirt. Von den drey Gehörhöhlen verhält ſich der Labyrinth in der Geſamtheit der das Gehörorgan als einen in ſich geſchloſſenen Organismus conſtituirenden Bildungen — wie ſenſibles Syſtem: — die Trommelhöhle mit ihren muskulöſen und Knochenbildungen wie irritables Syſtem: — und der äuſſere Gehörgang wie reproductives Syſtem. Im Gehörorgane iſt das Veshältniſs der eigentlichen, das Sinnesorgan enthaltenden Höhle, zur Vorhöhle, zu jener des Trommelfelles — das Verhältniſs des Nervenſyſtems zum Muskelſyſteme, im Auge aber findet zwiſchen der Netzhaut und den Gefäſshäuten des Auges das Verhältniſs des Nervenſyſtems zum Gefäſseſyſtem ſtatt. Durch das eyförmige Loch ſteht die Paukenhöhle mit dem Labyrinth in Verbindung. Das eyförmige Loch aber iſt durch die Basis des Steigbiegels und die eigenthümliche Membran dieſes Loches geſchloſſen. Das runde Loch führt in eine Treppe der Schnecke,

und über dieſes iſt ebenfalls eine eigene Membran, als ein zweytes Trommelfell ausgeſpannt.

Auſſerdem hat die Pauckenhöhle noch zwey andere Ausgangsöffnungen, eine in den äuſſern Gehörgang, welche mittelſt des Trommelfelles verſchloſſen wird, und eine andere mittelſt der Euſtachiſchen Röhre in der Rachenhöhle. Das Trommelfell iſt eine geſpannte, elaſtiſche Membran in einem knöchernen Ringe ſuſpendirt, und noch höherer Spannung und Erſchlaffung fähig. Es erſtreckt ſich aber von dem Pauckenfell bis zur Membran des eyförmigen Fenſters, einer ununterbrochenen Kette von Knöchelchen, welche auf verſchiedene Weiſe unter einander artikuliren, und die verſchiedenartiger Bewegungen in jenen Gelenken fähig ſind. Kleine Muskeln, die ſich an ihren Fortſätzen anſchlagen, ſetzen ſie auf verſchiededene Weiſe in Bewegung. Bey allen Thieren mit einer Vorhoföffnung der Pauckenhöhle iſt dieſe durch eine Knochenplatte geſchloſſen, welche ſich in einen Stiel verlängert, der ſich bis zum Trommelfell oder zur allgemeinen Bedeckung fortſetzt. Die Vögel und Amphibien beſitzen nur Einen ſolchen Knochen: bey den Säugthieren aber zerfällt dieſer in vier zuſammenhängende Knöchelchen. Wenn das Trommelfell durch die Wirkung des vordern Hammermuskels erſchlafft iſt, ſo werden hiedurch ſehr ſtarke Töne geſchwächt. Iſt aber der Grad der Spannung durch die Wirkung des innern Hammermuskels vermehrt, ſo wird die Stärke des Tones erhöht. Eben ſo wechſelt auch nach Verſchiedenheit der Stärke des Tones der Grad der Anſpannung

und Erschlaffung der Membran des runden und jener des eyförmigen Fensters. Die Anspannung des Trommelfelles entspricht somit dem Erweiterungszustande der Pupille, und dessen Erschlaffung ihrem Verengerungszustande: die Bewegungen des Trommelfelles überhaupt den Bewegungen der Iris. So wie der Grad der Verengerung der Pupille nur durch die Menge der Lichtstrahlen, nicht durch die Färbung derselben bestimmt wird; so hat auch die Höhe oder Tiefe des Tones keinen bestimmenden Einfluss auf die Anspannung des Trommelfelles. Diese ist einzig durch die Stärke des Schalles bestimmt. Da die Regenbogenhaut gleich den unpaarigen Sphincteren ihren Gegensatz in sich selbst hat; so verhalten sich die bewegenden Muskeln des Hammers als Antagonisten unter einander.

Aus der Trommelhöhle führt ein eigener Kanal in die Warzenzellen, so wie diese überhaupt nur durch die excentrische Metamorphose der Schleimhaut der Trommelhöhle gebildet werden. Es findet ganz dieselbe Beziehung von ihnen zum Gehörorgane statt, wie von der Anhangshöhle der Nase zum Geruchsorgane. In ihnen verbreitet sich die Luft aus der Trommelhöhle offenbar mehr verdünnt, und in höherm Grade durch Wärme expandirt, als in der Trommelhöhle. Offenbar sind aber die Warzenzellen ein Rest von früherer Gebildung, nämlich aus der Classe derjenigen Thiere, bei welchen der ganze Warzenfortsatz noch ausgehöhlt ist. So wie sich das Geruchsorgan mittelst der Thränenwege in das Sehorgan fortsetzt, eben so ist organische Gemeinschaft zwischen der Geschmackshöhle

und dem Gehörorgan durch die Eustachische Trompete hergestellt. Durch die Eustachische Trompete geschieht die Erneuung der in der Paukenhöhle eingeschlossenen Luft, welche durch die Fortleitung des Schalles nicht bloss mechanisch erschüttert, sondern auch dynamisch verändert, und ihrer Elasticität beraubt wird. Das sehr lästige Ohrensausen, welches jedesmal bey Verstopfung der Eustachischen Trompete entsteht, ist eine Folge des aufgehobenen Gleichgewichts zwischen der in der Paukenhöhle eingeschlossenen, und der im äusseren Gehörgange enthaltenen Luft. Einige, jedoch unzureichende Erneuung der Luft in der Pauckenhöhle geschieht auch durch die Poren des Trommelfelles. Auch wird durch die Eustachische Trompete die Schleimflüssigkeit ausgeleert, welche in der Trommelhöhle, so wie in der Trompete selbst abgesondert wird: auch hierin verhält sich die Trompete ganz wie der Thränensack und der häutige Nasenkanal; die vollkommenste Uebereinstimmung beyder offenbart sich in ihren verschiedenen Krankheiten. Bey den Amphibien communicirt dieTrommelhöhle meistens unmittelbar mit der Rachenhöhle durch ein grosses Loch: nur bey dem Krokodil bildet sich eine Trompete von mittlerer Länge. Bey den Vögeln ist die Eustachische Trompete ganz knöchern, aber von ihrer Pauckenhöhlenöffnung an gegen das andere Ende hin progressiv verengert. Bey dem Menschen und bey den Säugthieren kann schon die Flügelgrube als der Anfang der Eustachischen Trompete betrachtet werden: wenigstens setzt sich die unterste Rinne dieser Grube un-

mittelbar in den knorplichen Theil der Trompete fort. Bey der Gehörfunction selbst ist sie weder als Zuleitungskanal, noch als Ableitungskanal der Schallstrahlen zu betrachten.

§. 585.

Die dritte Parthie der Gehörwerkzeuge bildet der äussere Gehörgang mit der Ohrmuschel, und den äussern Theilen des Ohres mit dessen Knorpel und Läppchen &c. Die Bildung des grössern Gehörganges ist eben darum, weil sie den dritten Moment in der architectonischen Construction des Gehörorganes ausdrückt, auch die späteste, und stellt den Uebergang der besondern Bildung des Sinnesorganes in die allgemeine Bildung der Bedeckungen dar. Die äussern Theile des Ohrs verhalten sich ganz wie die äussern, und umgebenden Theile des Augapfels, nämlich wie die Augenlieder, wie deren Knorpel und Muskeln, und wie die bewegenden Muskeln des Augapfels. Der Pavillon des Ohrs, und der äussere Gehörgang können füglich einem acustischen Horn verglichen werden, dessen äusserer mehr erweiterter, und ausgeschweifter Theil, welcher durch das Ohrläppchen, und die Ohrmuschel gebildet ist, die Schallstrahlen sammelt, zur convergirenden Richtung bestimmt, und in den äussern Gehörgang wirft. An der äussern Oberfläche jenes Pavillons ragen mehrere Erhabenheiten mit ihren entsprechenden Vertiefungen hervor, als der Tragus und Antitragus, der Helix und Antihelix. Diese Theile entsprechen in ihrer Bildung ganz der Bildung der Augenlieder. So wie

bey diesen ist ihre eigenthümliche Grundsubstanz ein flibrös-cartilaginöses Gewebe, in welchem es noch nicht zur räumlichen Ausscheidung der fibrösen Haut als perichondrium vor der eigenthümlichen Knorpelsubstanz gekommen ist.

Den Muskeln der Augenlieder, dem Aufhebemuskel des obern Augenliedes, und dem Ringmuskel, entsprechen die äussern Muskeln des Ohrs, der obere, hintere und vordere. Entsprechend der Menge des Lichtes bewegen sich die Augenlieder, und ihre Spalte wird erweitert oder verengert. Entsprechend der Stärke des Schalles bewegt sich auch das äussere Ohr des gesunden Menschen im Normalzustande, und bilden verschiedene, der Richtung der Schallstrahlen entsprechende Muscheln. Die Sekretion des eigenthümlichen Talges in den Maibomschen Drüsen der beyden Augenlieder entspricht der Sekretion des Ohrenschmalzes, — den bewegenden Muskeln des Augapfels aber die innern Muskeln des Ohrläppchens. Bey verschiedenen Thieren sind die Ohrläppchen sehr entwickelt, und können in Muscheln von verschiedener Art gestaltet werden, so bey dem furchtsamen Haasen; er kann sie dem Schalle entgegenrichten. Auch beym Menschen sind die innern und äussern Muskeln sehr vollkommen gebildet. Wilde Völker vermögen willkührlich ihre Ohren aufzurichten, zu spitzen, daher ihr feines Gehör. Aber durch den Druck der Mützen hat der Pavillon des Ohrs bey den polizirten Menschen eine andere Gestalt erhalten, indem die concave Oberfläche des Ohrs ganz nach aussen gekehrt ist, und nun für die Aufsamm-

lung der Töne verloren geht, und zweitens indem jene Muskeln, die äusserlichen und die innerlichen, durch den anhaltenden Druck beynahe gelähmt werden.

Das Ohr des Menschen ist so gestaltet, dass die meisten Schallstrahlen unter ihren Einfallungswinkeln gleich grosser Abprellungswinkel gegen den Grund der Ohrmuschel hin gebrochen werden. Von dem Grunde der Ohrmuschel aus werden sie nun in einen Strahlenbündel vereiniget in den äussern Gehörgang geworfen, der in seiner doppelt gekrümmten Richtung der Strahlenbündel bis zum Trommelfell fortleitet; indem seine überknorpelten Wände in schwingende Bewegungen gerathen, und durch ihre Resonanz, so wie besonders durch die Resonanz der Ohrmuschel den Ton verstärken. So wie nun in der Construction des Gehörorgans drey wesentlich verschiedene Parthieen vorkommen, welche den drey Dimensionen entsprechen, nämlich der Labyrinth, die Pauckenhöhle und der äussere Gehörgang, so müssen auch in der Sinnesempfindung, in ihren Zeitverhältnissen betrachtet, drey Perioden unterschieden werden. 1) Die Auffassung und Refraction der Schallstrahlen im äussern Ohre, so wie die Fortleitung des Strahlenbündels durch den äussern Gehörgang. 2) Die expansive und contractive Bewegung des Trommelfelles, und die Erschütterung der Gehörknöchelchen in der Pauckenhöhle. 3) Die galvanische Wasserzersetzung im Labyrinthe, und das Hervortreten bestimmter Polarität im Gehörnerven selbst.

XXVII. Kapitel.

Gesicht.

§. 586.

Das Licht ist das Medium, durch welches hindurch das sichtbare Objekt von dem Auge empfunden wird. Eigentlich ist aber das Gesichtsorgan im vollen Sinne des Wortes Lichtsinn: denn es ist nur das Licht und die Farbe, welche ursprünglich von dem Auge empfunden werden. Auf die Höhe, die Breite der Körper, auf die Ungleichheit ihrer Oberfläche, auf die Richtung und die Entfernung derselben wird nur geschlossen. Was nun das Licht im Organismus des Ganzen ist, das ist das Auge im Thierleibe: jenes die lebendig gewordene Anschauung der Natur: dieses das Organ der Anschauung. Wie die Beleuchtung durch das Sonnenlicht jede leicht veränderliche Polarität irgend eines Dinges in die ihr entgegengesetzte verwandelt; also auch der darauf fallende Blick des Menschenauges. Durch das Licht sind Sonne, Planeten und Monde unter sich in Gemeinschaft, nicht durch die Schwere. Alles Licht gehört ursprünglich der Sonne an: und irdische Körper haben ihr Vermögen, zu leuchten, nur von der Sonne. Irdische Körper treten in den Lichtzustand vorzüglich bey solchen Prozessen, bey welchen sie ihr Innerstes aufschliessen, und der Vernichtung ihres besonderen Seyns anheim fallen: bey dem Verbrennungsprozesse und bey jenem der Fäul-

nifs. Das Vermögen des Phosphors, zu leuchten, ſtimmt mit ſeiner groſsen Verbrennlichkeit überein. Das Vermögen der ſpontanen Lichtentwicklung iſt aber beſonders dem Auge verliehen; daher der Glanz, welcher daſſelbe umgiebt, daher die Phosphorescenz einiger Thieraugen, daher die Photopſie des erkrankten menſchlichen Auges. Das reine noch ungetrübte Licht beſitzt urſprünglich eine unendliche Geſchwindigkeit ſeiner Verbreitung. Denn das Licht iſt urſprünglich den Bedingungen der Zeitlichkeit nicht unterworfen; da die Zeit ſelbſt nur eine Manifeſtation des Lichtprincips iſt, und zu deſſen Form des Seyns gehört. Das ſchon getrübte in irdiſcher Atmosphäre erſcheinende Licht, ſo wie ſich dieſes dem Auge offenbart, übertrifft noch immer an Geſchwindigkeit ſeiner Verbreitung jede andere Naturthätigkeit. Die Verbreitung des Lichtes geſchieht in excentriſcher Richtung, folglich in Strahlen: denn das Licht iſt gleich der unendlichen Expanſion ſelbſt. Die Durchſichtigkeit der Körper beruht auf ihrer innerlichen Identität mit dem Lichte. Denn nur das Gleiche ſetzt ſich im Gleichen fort, und iſt demſelben auf dynamiſche Weiſe durchdringlich. Keines irdiſchen Körpers Durchſichtigkeit aber iſt vollkommen: und daher erleidet das Licht bey ſeinem Durchgange durch dieſe eine Brechung. Die dem Lichte am meiſten heterogenen Körper ſind ganz undurchſichtig und dem Lichte undurchgängig. Das Licht wird bey ſeinem Durchgange in durchſichtigen Körpern um ſo mehr gebrochen, je mehr dieſe dem Lichte heterogen, folglich je mehr phlogiſtiſch, verbrennlich ſie ſind, und je gröſser die ſpecifiſche

Dichtigkeit des Mediums ist. Die Beschaffenheit der Oberfläche durchsichtiger Körper bestimmt nur die Richtung, in welcher die Brechung der Lichtstrahlen geschieht. In Körpern mit convexer Oberfläche werden die Lichtstrahlen gegen die Axe dieser Körper hin gebrochen; so daſs sie sich im Strahlenheerde vereinigen. Bey ihrem Durchgange durch Körper mit concaver Oberfläche geschieht die Refraction in der entgegengesetzten Richtung, und der Strahlenbündel wird auseinander geworfen. — Die Theilung des Lichtes in einzelne Strahlen ist nicht als eine mechanische zu betrachten: sie kann nicht geschehen, ohne daſs die Identität und Selbstgleichheit des Lichtes aufgehoben werde, und dieses den Gegensatz der Farben in sich aufnehme. Die Entstehung der Farben in dem durch das Prisma zerlegten Lichte ist nicht die Folge einer mechanischen Theilung und Spaltung desselben. Ein empfindliches Auge zerlegt auch für sich selbst, ohne Hülfe des mechanischen Theilungsinstrumentes, das Licht in die Grundfarben, z. B. wenn ein einzelner Lichtstrahl durch eine schmale Oeffnung in ein dunkles Zimmer fällt. In Zuständen von krankhaft erhöhter Sensibilität des Sehorgans wird sogar jeder Gegenstand zum Prisma: und überall werden hier verschiedene Farben an den Winkeln, Rändern und Flächen der beleuchteten Gegenstände wahrgenommen.

§. 587.

So wie das Licht das An sich, die Idee der Electricität ist, nämlich die vorbildliche Möglichkeit des Gegensatzes der beyden Formen der Elec-

tricität ausdrückt; so muss das Licht da, wo dessen Indifferenz aufgehoben ist, und irgend ein Gegensatz an demselben entsteht, nothwendig die Antithese der beyden Formen der Electricität in sich aufnehmen: je zwey Farben zeigen daher immer electrische Polarität gegen einander, und der Gegensatz beyder ist in einer dritten gebunden. Schon die Verschiedenheit der Coloration der Funken, welche den beyden Formen der Electricität entsprechen, und deren einer mehr in das Röthliche, der andere mehr in das Blaue spielt, noch mehr der Gegensatz des auf verschiedene Weise colorirten Lichtes, welches bey der Bewaffnung des Augapfels oder der Augengegend mit den Conductoren der entgegengesetzten Pole der Volta'schen Säule entsteht, — beweisst deutlich, dass der Gegensatz der Farben von electrischer Art sey. Die grüne Farbe ist die positiv electrische, alcalische, und beweisst die Vorherrschaft der Hydrogenelectricität, die rothe Farbe aber ist die negativ electrische, dem Oxygenpol entsprechende. Daher wird die blaue Pflanzentinctur durch die freye Säure geröthet, und durch die Beymischung des Laugensalzes grün gefärbt. So wie die rothe Farbe der Gegenschein der grünen ist, so die violette der Gegenschein der blauen, und die Orangefarbe jene der gelben. Das Weisse hat den vollen, noch ungetrübten Glanz des Lichtes, und enthält die vorbildliche Möglichkeit jeder besondern Farbe. Das Schwarz stellt das endliche Erlöschen alles Lichtglanzes und aller Farbe in der Finsterniss dar. Ist aber das Weisse von

dem

dem Schwarzen umgeben, ſo ſtrahlt bey prismatiſcher Zerlegung aus dem erſten in das zweyte, da wo ſich beyde berühren, auf der Einen Seite das Blaue, auf der andern das Gelbe, jenes im ſchmalern, dieſes im breitern Streife hinein; und aus dem Schwarzen ſtrahlt in das Weiſſe, aus der Finſterniſs in den Lichtglanz auf der dem Blauen entſprechenden Seite Violet im breiteren Streife, und auf der dem Gelben entſprechenden Seite die Orangefarbe im breiteren Streife hinein. Bis dahin giebt das Prisma die Analyſe: — aber es giebt auch wieder die Syntheſe. Denn wird gelb und orange neben einander gelegt, — ſo entſteht da, wo das Eine in das andere übergeht, das ſynthetiſche roth, und blau und violet neben einander gelegt, — entſteht im Uebergange das ſynthetiſche grün. — Jede Farbe hat ihre eigenthümliche, nicht bloſs ſymboliſche, Bedeutung: ſo ſtellt das Weiſs für ſich den ungetrübten Lichtglanz der Unſchuld dar: — aber gepaart mit dem Schwarz iſt es die Farbe des Todes, weil das Leben nur in der Entſtehung der beſondern Farben zwiſchen beyden iſt. Das Schwarz für ſich allein iſt der ganz erloſchene Glanz, die Farbe der in ſich verſenkten, ihres Objektes nichr mehr bewuſsten Trauer &c. Grün, gelb und blau ſind mehr die Farben des Lichtes: roth, orange und violet ſind die Farben der Finſterniſs: — daher ſind jene mehr erleuchtend, dieſe mehr erwärmend. Da das Licht bey ſeinem Durchgange durch irgend ein Medium — um ſo mehr gebrochen wird, nicht nur je heterogener dieſes ſelbſt gegen das Licht iſt, ſon-

dern auch je mehr es ſich noch als reines, ungetrübtes Licht verhält; ſo ſind auch der grüne, der gelbe und der blaue Strahl der ſtärkſten Refraction unterworfen. Am ſchwerſten aber geſchieht die Brechung des rothen Strahles, welcher auch der am meiſten erwärmende iſt. — Jener Gegenſatz der Farben unter ſich offenbart ſich auch in der ſpontanen Erſcheinung der entgegengeſetzten Farbe bey der Ermüdung des Auges durch die Betrachtung eines einfarbigen Objektes. Wenn man lange Zeit einen weiſſen Streif betrachtete, und dann den Blick auf eine weiſſe Fläche wendet, ſieht man auf dieſer jenen Streif ſchwarz; — gelb, wenn er blau; roth, wenn er grün war.

§. 588.

Das Auge iſt nun ganz dem Lichte gleichgebildet, iſt von gleicher Natur mit dieſem, unter allen Sinnesorganen am Meiſten des Idealen in ſich bewahrend. Sein Weſen iſt Durchſichtigkeit für das Licht, und damit iſt mit Einem Male die ganze Conſtruction des Auges gegeben. Das Auge iſt der einzige, durchſichtige Theil; — die weſentlichen Theile des Auges ſind auſſer dem Nerven ſeine durchſichtigen, dem Lichte identiſchen Medien; — es entſteht überall da ein Auge, wo das Licht ſich ein beſonderes Gebilde ganz zu aſſimiliren, und daſſelbe zur vollkommenſten Durchſichtigkeit zu verklären vermag. Wie durch den Einfluſs des Lichtes ſich die Blumenknospe öffnet, und zuerſt der Blumenkelch, dann auch die Blumenkrone ſich aufſchlieſst, — ſo öffnet ſich dem Lichte die zuerſt verwachſene Au-

genliederſpalte, dann die ebenfalls früher geſchloſſene Pupille; — denn die Iris wird nur vom Licht durchbrochen, und hat daher ſtetig das Beſtreben, das Sehloch wieder zu ſchlieſſen. Hiedurch iſt das ganze Problem über die Bewegung der Iris, und über die verſchiednen Formen der Pupille gelöst. — Es iſt aber das äuſſere Licht nur im Gegenſatze des innern, wodurch der Lichtſinn des Thieres ſich aufſchlieſst und dem Tage ſich öffnet. Denn nur das Gleiche kann das Gleiche empſinden, und ſich in dieſem fortſetzen. So wie das ganze Nervenſyſtem eine Conſtruction des den Organismus in ſeinem Innerſten durchdringenden, ſonnig von Einem Mittelpunkte ausſtröhmenden, aber in verſchiedenen Strahlenheerden gebrochenen und reflectirten Lichtes iſt; — ſo hat vor andern der optiſche Nerve an der Natur des Lichtes Antheil, und ſicher geht eine ſpontane Lichtentwicklung von der Netzhaut aus. Die weſentlichen und nothwendigen Theile des Auges ſind daher ein Sehnerve und ein dem Lichte identiſches Medium zwiſchen beyden, ein Cryſtall. Beyde erſcheinen ſchon in den noch ungereiften polyaedriſchen Inſektenaugen, — auſſer dieſen aber (nämlich dem Sehnerven und dem facetirten Cryſtall) iſt nichts bey ihnen mit Beſtimmtheit zu erkennen. Alle andere Theile liegen noch in Ununterſcheidbarkeit. Nur ein Rudiment der Gefäſshaut, mit ſchwarzem Pigment überzogen, umgiebt die häutige Ausbreitung des Nerven, und nirgends in einem Sehloche durchbrochen, ſchlieſst es die Sehhaut enge ein, und hält das Licht von ihr ab. Aber

dieſs alles iſt nur noch ein Chaos von Bildungen, aus welchem erſt das Auge erſtehen ſoll. Mit der erſten Pupille iſt das erſte Auge gegeben: denn erſt jetzt begegnet das innere Licht dem äuſſern: und ſomit reift das Auge zur Frucht erſt bey den höhern, oder Irritabilitätsthieren: — denn auch, was die Mollusken an Augen beſitzen, das haben ſie nicht aus ſich ſelbſt, ſondern gleichſam entlehnt von einer höhern Thierclaſſe. Erſt der Fiſch hat einen Sehnerven, welcher bloſs dem Auge angehöret, und keine Bewegungsnerven, keine Gefühlsfaden mehr abgiebt. Er beſitzt eine Cryſtalllinſe, welche noch vollkommen ſphäriſch, und unzerlegt iſt, daher ſie die noch nicht von ihr ausgeſchiedene wäſſerige Feuchtigkeit beynahe verdrängt hat. Das Fiſchauge zeigt eine Chorioidea und Iris. Aber das Ciliarnervenſyſtem, die Ciliarfortsätze, mit jenem das eigene, ſelbſtſtändige Leben der Iris — fehlen hier gänzlich. Die Pupille ſpielt in verſchiedene Formen, ohne eine bleibende darzuſtellen. Zwiſchen den beyden Schichten der Chorioidea bleibt nach hinten ein Drüſen-ähnlicher Körper zurück. Das Auge der Amphibien unterſcheidet ſich nur ſehr wenig vom Auge der Fiſche, ſo wie überhaupt in beyden Thierclaſſen irgend ein Organ um ſo weniger differirt, je edler es iſt. Doch vermehrt ſich ſchon die Quantität der wäſſerigen Feuchtigkeit, die Aufwölbung der Hornhaut, — es entſtehen Ciliarfortsätze. — Die irritabeln Bildungen im Auge, die Gefäſshäute, das Ciliarnerven- und Ciliargefäſseſyſtem, erreichen ihre Vollkommenheit in der irritabelſten Thierclaſſe, in jener der Vögel.

Bey den am meiſten irritabeln Thieren, den Vögeln, iſt auch in der Bildung des Auges die Irritabilität ganz über die Senſibilität vorherrſchend, und zwar nicht nur in der Bildung des Auges überhaupt, ſondern ſelbſt in jener der Netzhaut. Von der Eintritsſtelle des Sehnerven her erhebt ſich eine aller Nerven beraubte, rein gefäſsartige Bildung, der Kamm, eine gefaltete, gegen die Axe des Augapfels zurückgedrängte Membran, welche einen zweyten Ciliarkörper darſtellt. Der Kamm iſt in den Augen der Vögel um ſo mehr entwickelt, und von deſto anſehnlicherer Gröſse, je irritabler, raubgieriger, ſie ſind. Der Kamm im Vogelauge iſt die für ſich hervorgetretene, losgetrennte, frey und herrſchend gewordene vasculoſe Membran der Retina.

§. 589.

Je vollkommener die Bildung des Auges iſt, deſto mehr werden ihm die umgebenden Theile deſſelben, und deſto mehr werden in dem Bulbus alle Gebilde dem Sehnerven untergeordnet. Zuerſt iſt ſelbſt die äuſſere Schichte der Membranen des Augapfels noch der allgemeinen Bedeckung angehörig: die Hornhaut wird mit dieſer abgeworfen, und periodiſch erneuet. Bey den höhern Thieren conſtituirt ſich aber die Hornhaut unter der Bindehaut als ſelbſtſtändige Membran; obgleich ſie bey verſchiedenen Krankheiten wieder die Natur jener Schleimhaut annimmt, und da ſie bey der gonorrhoiſchen Ophthalmie ſelbſt Schleim abſondert, ſo geht hiebey ihre eigenthümliche Bildung verloren.

Je vollkommener die Bildung des Auges iſt, deſto mehr iſt auch die Sclerotica, die Scheidenhaut des Augapfels, der Scheidenhaut des Sehnerven aſſimilirt, gleichgebildet. Alsdann wird dem Bulbus ein Theil der allgemeinen Bedeckung in der Umgebung deſſelben als Augenlieder angeeignet, — drüſige Theile in ſeiner Nähe, die Thränenorgane, werden in Beziehung auf denſelben gebildet: — und je mehr er zur höchſten Ausbildung gelanget, deſto mehr erhält er alle Theile, ſelbſt die knöchernen, in Abhängigkeit von ſich. Um den vollkommenſten Augapfel bildet ſich auch die vollkommenſte nach allen Seiten durch Knochenwandungen geſchloſſene Augenhöhle; und wird der Augapfel frühzeitig bey einem jungen Thiere zerſtöhrt, ſo erhält auch die Orbita ihre regelmäſſige Ausbildung nicht. — Je vollkommener der Augapfel gebildet iſt, deſto freyer und deſto vielſeitiger iſt auch ſeine Beweglichkeit. Durch die verſchiedenen Thierclaſſen hindurch bis zu dem Menſchen hinauf nimmt die Beweglichkeit des Augapfels, gleichſam ſeine Befreyung von einem fixen Standorte, immer mehr zu. Zuletzt convergiren, mit zunehmender Vollkommenheit des Bulbus, nach hinten die Axen der Augenhöhlen immer mehr. Die Augen ſelbſt weichen aus den Seitengegenden des Kopfes zurück, und nähern ſich der Mitte; — am nächſten kommen einander bey dem Menſchen die Spitzen der beyden Pyramiden, welche die Augenhöhlen bilden. Jedoch iſt auch bey dem Menſchen noch die nach vorne gerichtete Baſis der Orbita ſchief von innen nach auſſen abgeſchnitten; daher kann auch noch der Menſch, beſonders bey

der Präponderanz des äuſſern geraden und des untern ſchiefen Augenmuskels, ohne Verdrehung des Kopfes, Gegenſtände zur Seite betrachten.

§. 590.

Zur Vollkommenheit werden die äuſſern, das Auge umgebenden Theile am ſpäteſten, und nur als Wiederſchein der innern Vollkommenheit, gebildet. Das menſchliche Auge zeigt unter allen Thieraugen die gröſste Vollkommenheit, und ein Gleichgewicht von ſich entgegengeſetzten Bildungen. Es iſt darum am meiſten ſphäriſch geſtaltet. Der Querdurchmeſſer des Augapfels verhält ſich bey ihm zu der Axe wie 136: 137. Bey allen andern Thieren iſt die Differenz zwiſchen beyden gröſſer. Seine Pupille ſteht am meiſten in der Mitte des Auges, und weicht am wenigſten von der Zirkelform ab. Eben ſo iſt bey ihm das vollkommenſte Gleichgewicht zwiſchen der Entwicklung der Cryſtalllinſe von der Einen und der Erzeugung der wäſſerigen Feuchtigkeit von der andern Seite.

Die umgebenden Theile des Auges ſind dem äuſſern Ohre gleichgebildet. Zu oberſt ſtehen die Augenbraunen, und mehr nach unten am Rande der beiden Augenlieder die Cilien, welche zur Schönheit des Angeſichts beytragen, und das Auge im Verhältniſs ihrer gröſſern oder geringern Menge und Dichtigkeit, beſonders aber auch ihrer Farbe — beſchatten. Zur Beſchattung des Auges trägt der Vorſprung des Oberaugenhöhlenbogens über den Augapfel vieles bey. — Gewiſs aber ſtehen die Cilien und Supercilien noch in einer mehr innigern

dynamischen Verknüpfung mit dem Prozesse der Vision. Denn ihre Anzahl, Härte, Farbe, und übrige Beschaffenheit steht mit der Empfindlichkeit des Auges, und mit andern Modificationen des Sehvermögens im genauen Verhältniss — Troxler hält sie für electrische Ausleitungskanäle des erloschenen Lichtes aus dem Auge, und glaubt, dass die sich an ihren Spitzen öffnenden Kanäle im Innern des Augapfels entstehen. Die Augenlieder, durch deren verschiedene Bewegungen die Augenliederspalte erweitert und verengert wird, sind zwey Faltungen der allgemeinen Bedeckungen, in deren Duplicatur sich die Augenliederknorpel mit häufiger Zellulosität befinden. Dieses Zellgewebe enthält statt des Fettes eine beynahe gallertartige Flüssigkeit, wodurch die Bewegungen der Augenlieder sehr erleichtert werden. Durch die Wirkung des Ringmuskels wird die Augenliederspalte geschlossen. Durch die Wirkung des Aufhebemuskels des obern Augenliedes, und mittelst der Herablassung des untern wird sie erweitert. Die Bewegungen des obern Augenliedes sind aber bey weitem ausgedehnter als jene des untern. — Da die Augenlieder ursprünglich verwachsen sind, und nur durch das Eindringen des Lichtes gespalten werden, wesswegen sie sich bey mehreren Thieren erst einige Tage nach der Geburt öffnen; so haben sie auch stets das Bestreben, sich wieder zu schliessen und dem Licht den Eingang zu wehren. Unter allen Thieren besitzt der Mensch die am vollkommensten gebildeten Augenlieder, da in den untern Thiergattungen die Augen oft ganz ohne Bedeckung sind; oft nur

durch die Blinzhaut, eine Verlängerung der Hautfalte im innern Augenwinkel, bedeckt werden. Durch die Augenlieder wird die Einwirkung des Lichtes auf die Augen gemäſſiget. Aber auch die Augenlieder ſind nicht ganz undurchſichtig, ſondern ſie laſſen einige Lichtſtrahlen in das Auge fallen. Bey dem Mangel der Augenlieder, oder ſchon bey dem Colobom entſteht Schlafloſigkeit, eine heftige ophthalmitis, welche ſich von den Augenhäuten ſehr bald auf die Gehirnhäute fortſetzt. Auſſerdem, daſs die Augenlieder die Einwirkung des Lichtes mäſſigen, dienen ſie auch dazu, um das Auge bey der momentanen Beſchattung, welche ſie demſelben gewähren, ſtets dem Licht wieder zu entfremden, und bey jeder Nyctitation bricht ein neuer Tag an. Die Augenlieder müſſen zuletzt noch in Beziehung auf das Thränenorgan betrachtet werden.

So wie die Secretion überhaupt den Moment der Senſibilität in der Reproduction bezeichnet, ſo iſt die Secretion der Thränenfeuchtigkeit, deren Organe zuerſt in der Claſſe der Vögel ihre Ausbildung erhalten, eine ganz beſonders durch die Senſibilität beſtimmte Secretion. Nicht ſo wie die meiſten andern Secretionen, greift dieſe in den ſtetigen Reproductionsprozeſs des Organismus ein; ſondern ſie iſt zunächſt der Function eines der ſenſibelſten Organe verknüpft. Daher erhält die Thränendrüſe unter allen ſecernirenden Organen beynahe allein cerebralnerven, und zwar einen ſo merkwürdigen, und mit vielen andern Nerven verbundenen Faden, als der Thränennerve iſt, ſo wie auch ihre Arterie ein Abkömmling der Carotis iſt. Die innige Ver-

knüpfung der Function der Thränendrüse mit jener des Sehorganes ist daraus zu ersehen, daſs die Hornhaut bey unterdrückter Secretion der Thränenfeuchtigkeit sehr bald ihren eigenthümlichen Glanz verliert, und aufhört, dem Lichte durchgängig zu seyn. — Das Thränenorgan zerfällt in die Thränen - erzeugende, Thränen - zuführende und die Thränen - abführende Parthie.

Diese Eintheilung von Johann Adam Schmidt ist aus dem Grunde die richtige, weil hier das Auge als dasjenige Organ angenommen wird, zu dessen Befeuchtung die Thränen bestimmt sind, welchem sie also zugeleitet, und von dem sie wieder abgeführt werden. Zu der Thränen erzeugenden Parthie gehören die beyden Thränendrüsen mit ihren siebenmündigen Ausführungsgängen. Die von ihnen abgesonderten Thränen sind eine seröse, schleimige Flüssigkeit von nur wenig grösserem specifiquem Gewichte als das Wasser, — welche viele Soda sowohl in reinem als kohlensaurem, kochsalzsaurem und phosphorsaurem Zustand, und etwas phosphorsaure Kalkerde enthält. Bey vielen ophthalmien, bey denen ein sehr scharfer Thränenfluſs statt findet, ist nicht nur die Quantität der abgesonderten Thränenfeuchtigkeit vermehrt, sondern auch ihre Qualität beträchtlich verändert, und wahrscheinlich die Menge der darin aufgelösten ätzenden Soda um vieles vergrössert. Ueberhaupt ist die Secretion der Thränen der Quantität nach sehr inconstant und veränderlich. Der leiseste Affekt hat besonders bey sehr sensibeln Subjekten Einfluſs auf dieselbe. Da die Mündungen der Ausführungsgän-

ge der Thränendrüſen ſich an der innern Oberfläche des obern Augenliedes in der Nähe des äuſſern Augenwinkels befinden, ſo gelangen die Thränen in den Zwiſchenraum zwiſchen dem Bulbus, und den Augenliedern. Indem nämlich der Rand der beyden Augenlieder etwas wulſtig hervorragt, ſo liegt bloſs er allein, und nicht die ganze innere Oberfläche des Augenliedes ſelbſt dem Bulbus an. Es bleibt daher zwiſchen ihnen ein freyer, dreyeckiger Zwiſchenraum übrig, in welchem die Thränen durch die abwechſelnden Bewegungen der Augenlieder gegen den innern Augenwinckel hin bewegt werden. So verbreiten ſich die Thränen über die vordere Fläche des Augapfels. — Gewiſs iſt die Wirkung der Thränen nicht bloſs darauf beſchränkt, daſs ſie den Augapfel gegen den rauhen Eindruck der atmoſphäriſchen Luft, ſo wie gegen die Berührung der Augenlieder ſchützen, ſondern ſie ſtehen noch in einer innigern dynamiſchen Verknüpfung mit der Function des Geſichtes. — Die Thränen ſammeln ſich allmählich im innern Augenwinkel im Thränenſee an. Hier befindet ſich die Thränenkarunkel, ein drüſigter Körper, ganz den übrigen Maibomiſchen Drüſen gleich gebildet, welche reihenweiſe an der innern Oberfläche der Augenliederknorpel in eigenen Furchen liegen. Die Thränenkarunkel, die nur eine paquetweiſe Anſammlung von Maibomiſchen Drüſen mit einer Faltung der allgemeinen Bedeckungen überzogen darſtellt, ſecernirt ſo wie die übrigen Maibomiſchen Drüſen eine ſchmierige, talgähnliche Feuchtigkeit, womit der Rand, und der innere Winkel der Augenlieder überklei-

ſtert wird, ſo daſs die Thränen, welche ſich nicht mit ihm vermiſchen, nicht über die Wangen herabflieſsen können. Die Thränen werden im innern Augenwinkel von den Thränenpunkten eingeſogen. Dieſe ſind die abſorbirenden Mündungen der Thränenröhrchen, zweyer gefäſsartiger Kanäle, welche die Thränen in den Thränenſack führen. Im Zuſtande von vermehrter Thätigkeit gerathen die Papillen der Thränenpunkte in eine Art von Erection, ſie erheben ſich, und ziehen ſich wechſelweiſe wieder in ſich zurück, ſo daſs ihr Längendurchmeſſer hiebey ſehr verändert wird; die Contractilität der Thränenpunkte iſt ſehr groſs, wie man ſich durch das Einſchrumpfen ihrer Papillen bey der Berührung mit einer Sonde überzeugen kann.

Die beiden Thränenröhrchen vereinigen ſich in einen gemeinſchaftlichen Kanal, und dieſer inſerirt ſich in den Thränenſack, einige Linien unterhalb der obern Extremität deſſelben, ſo daſs ſein Grund als blinder Sack zurück bleibt. Die Thränen gelangen auf dieſe Weiſe allmählig in den Thränenſack, ſchon vorher mit dem Talge der Maibomſchen Drüſen gemengt, und durch die Einwirkung des atmoſpäriſchen Sauerſtoffgaſses im geringern Grade oxydirt, werden ſie als eine ſchon urſprünglich etwas mucöſe Flüſſigkeit durch die Zumiſchung des von der Schleimhaut des Thränenſackes abgeſonderten Schleimes, dem Naſenſchleime verähnlicht, und nicht periodiſch, ſondern ſtetig, und in kleiner Quantität, durch den häutigen Naſenkanal in der Naſenhöhle entleert. Dieſe Fort-

leitung wird sehr durch die Richtung der schief von oben nach unten herabsteigenden untern Portion des Thränensackes, und des häutigen Nasencanals, durch dessen progressive Verengerung, durch die eigne Schwere der mit Schleim gemischten Thränenfeuchtigkeit, und durch die mitgetheilte Bewegung des Schliefsmuskels der Augenlieder, der bey seiner Zusammenziehung auf das obere blinde Ende des Thränensackes aufdrückt, befördert. Sie steht übrigens unter dem allgemeinen Gesetze der Gefäsebewegung, nach welchem die Fortleitung jeder Flüssigkeit in einem organischen Canale geschieht. Gewiss ist es, dass es in den Wandungen des Thränensackes keine Muskelfasern, keine peristaltische Bewegung, an seinem Ausgangsloche keinen Schliefsmuskel giebt; Annahmen, die lediglich dazu dienten, um die richtige Ansicht von den Krankheiten dieser Parthie des Thränenorganes zu verwirren. —

§. 591.

Der Augapfel selbst ist eine konkrete Darstellung des höchst - potenzirten Gegensatzes zwischen der Nerven - und Gefäsbildung in der Unterordnung der letzten unter die erste, — und da beyde der vollkommenste Ausdruck, die Nervenbildung der unendlichen Einheit der Dinge, und die Gefäsbildung der selbstischen Einheit sind, — so ist im Auge die höchste Entzweyung des Irdischen und des Sonnigen, und die vollkommenste Unterordnung des ersten unter das zweyte. — Unter den Augenhäuten bildet die Nervenhaut die innerste, über die andern herrschende Schichtung. Sie wird

von der gefäſshäutigen Schichtung umgeben, welche in Oppoſition gegen die erſte iſt. Auf dieſe folgt die ſibröshäutige, — zuletzt geht mittelſt der Bindehaut (ein Gebilde, welches zwiſchen der ſchleimhäutigen und der ſeröshäutigen Formation mitten inne ſteht) die Bildung des Augapfels wieder in die allgemeine Hautbildung über.

Die äuſſere, oder erſte Schichtung enthält offenbar Häute, welche nur von den Nerven losgetrennt ſind, ſo daſs nun die Gefäſshaut zwiſchen die Nervenhaut und die Scheidenhaut der Nerven aufgenommen wird. Indem aber die ganze individuelle Bildung des Augapfels zunächſt von dem Sehnerven beherrſcht wird, iſt auch die Scheidenhaut des Sehnerven zunächſt Scheidenhaut des Augapfels. Je weniger vollkommen die Bildung des Auges iſt, um ſo unabhängiger, und verſchiedener iſt die Bildung der Sclerotica von jener der Scheidenhaut des Sehnerven. So iſt ſie bey den Fiſchen knorplich. Bey den Vögeln entfernen ſich nach vorne ihre beyden Lamellen von einander, und nehmen einen Knochenring zwiſchen ſich auf. In dem vollkommnen Auge aber iſt ſie immer mehr jener Scheidenhaut aſſimilirt. Es iſt unnöthig, auf den Unterſchied der Behauptung, die Sclerotica ſey jener tunica vaginalis gleichgebildet, von einer frühern Behauptung, ſie ſey eine Fortſetzung derſelben, aufmerkſam zu machen, obgleich nicht geläugnet werden kann, daſs das innere Blatt jener Scheidenhaut ſich wirklich in die Sclerotica fortſetze, welche übrigens nach vorne auch durch die ſehnigen Ausbreitungen der Augenmuskeln verſtärkt wird, und in welcher alſo

verſchiedene, aber immer fibröshäutige Bildungen in einander flieſſen. Schon die Sclerotica iſt dem Lichte nicht ganz undurchſichtig, beſonders bey Kindern, bey welchen ſie ſehr dünne iſt, und daher die Chorioidea blaulich hindurch ſcheinen läſst. Nach vornen aber iſt die Sclerotica zur vollkommenen Identität mit dem Lichte gebildet, und daher vollkommen durchſichtig; hier entſteht die Hornhaut, in der die Identität mit dem Lichte durch die Aufhebung der Cohäſion dieſer Membran, und durch das Zerfallen derſelben in eine lamellöſe Bildung, ausgedrückt iſt. Die Cohäſion der Hornhautlamellen unter ſich nimmt ab in directem Verhältniſs der Progreſſion von ihren Rändern zur gröſsten Convexität, und in der Progreſſion von den äuſſern Schichten gegen die innern. Die Cornea iſt zwar keine Fortſetzung der Sclerotica, ſondern ſie iſt in dieſe eingeſalzt und hat eine deutlich-unterſcheidbare Grenze gegen dieſelbe hin. Denn es iſt ein Bildungsgeſetz des Augapfels, welches in dem Gegenſatze ſeiner beyden Hemisphären der vordern und der hintern gegründet iſt, — daſs keine Haut, welche von der hintern Hemisphäre deſſelben entſtehet, auch ſeine vordere Fläche ſchlieſſe. So entſteht die Hornhaut an der Grenze der Sclerotica, — ſo die Iris an der Grenze der Chorioidea, — ſo die Zonula ciliaris an der Grenze der Retina. — Auch iſt die Hornhaut das Segment einer ganz andern, nämlich einer ungleich gröſſern Kugel als die Sclerotica, und folglich iſt die Convexität derſelben gröſſer. Aber die Hornhaut iſt doch nur die höchſte Metamorphoſe der fibröſen Haut, ihre Verklärung zur

Durchſichtigkeit. In den früheſten Bildungsperioden des Auges iſt ſie von der Sclerotica nicht unterſchieden: — bey dem annulus ſenilis am Rande der Hornhaut, und bey der Verwachſung ihrer Lamellen, welche zuweilen unaufhaltſam von ihrem Rande gegen die gröſste Convexität derſelben fortſchreitet, verwandelt ſie ſich wieder durch regreſſive Metamorphoſe in eine der Sclerotica ähnliche Bildung.

§. 592.

Die Chorioidea iſt das eigentlich irdiſche im Auge, das antithetiſche des Lichtes, das allein nicht klare, dem Lichte nicht aſſimilirte! Als Gefäſshaut iſt ſie ganz im Gegenſatze gebildet. Ihre äuſſere Oberfläche zeigt Polarität gegen die innere, und es giebt ſomit eine Ruiſchiana: nämlich die Gefäſshaut zerfällt überall mehr oder weniger deutlich in zwey Schichten. Ihre vordere Seite iſt im Gegenſatz der hintern gebildet, und unterſcheidet ſich von dieſer ſehr beſtimmt durch die dunklere, ſchwärzere Farbe. Beyde Seiten der Chorioidea, die vordere und die hintere, verhalten ſich wie venöſes und arterielles. Daſſelbe Verhältniſs waltet zwiſchen der äuſſern, noch mehr arteriellen, und der innern, mehr venöſen, Oberfläche ob. Denn an der innern Oberfläche geht die Verzweigung der Gefäſse ſo weit und in's Kleinſte fort, und gleichzeitig nimmt die Verkohlung des Blutes in dem Grade zu, daſs es hier zur Bildung des ſchwarzen Pigmentes kömmt. Denn dieſs iſt kein extravaſirter

ter

ter colorirender Stoff, ſondern die höchſte Entwicklung des Capillargefäſsſyſtems der Chorioidea, in welchem, ſo wie in jedem Capillargefäſsſyſtem, die venöſe Gefäſspolarität über die arterielle, bey der urſprünglichen Indifferenz beyder, relativ vorherrſchend iſt. Das ſchwarze Pigment, als die höchſte Metamorphoſe der Gefäſshaut des Auges, ſtrebt nun das Licht auszulöſchen, und ein groſser Theil der in die hintere Augenkammer einfallenden Lichtſtrahlen wird von ihm abſorbirt. Dagegen fehlt im Auge der minder irritabeln Thiere, der Wiederkäuer, das Pigment, die Metamorphoſe der Gefäſshaut iſt gehemmt, die Entwicklung ihres Capillargefäſsſyſtems und die Verkohlung des Blutes in dieſem iſt mehr beſchränkt; daher entſteht der ſchillernde Glanz, das Tapetum, welches in die verſchiedensten Farben ſpielt. Die Chorioidea iſt nicht bloſs Gefäſshaut, ſo wie die Retina nicht allein Nervenhaut iſt. In der Chorioidea wiederholt ſich der Gegenſatz zwiſchen Nervenbildung und Gefäſsbildung durch den Gegenſatz der Ciliarnerven und der Ciliargefäſse. An der vordern Seite der Iris erreicht dieſe Antitheſis einen höhern Grad von Spannung als an der hintern. Daher treten die meiſten Ciliarnerven und Ciliargefäſse erſt an der Grenze der vordern Hemiſphäre in den Bulbus ein. Das Ciliarnervenſyſtem bildet überhaupt einen Gegenſatz gegen den optiſchen Nerven. So wie in dieſem die Senſibilität als ſolche, als ſenſitive Kraft, hervortrit, ſo iſt ſie durch jene in das irritable Syſtem aufgenommen: und der optiſche Nerve ver-

hält ſich zu den Ciliarnerven wie ſenſitive zu den motiven Nerven. Das Verhältniſs beyder zu einander iſt aber das umgekehrte der Centralarterie und der Ciliargefäſse. Jene iſt, wenigſtens für ihren beträchtlichſten Theil, Arterie der Nervenhaut, und bildet in ihr die vaſculöſe Membran: — dieſe ſind die Nerven der Gefäſshaut. Die Identität der Ciliarnerven enthält der Ciliarknoten: aus dieſem ſtrahlen, als aus ihrem Gehirne, bey dem Säugthiere vielzählich die Ciliarnerven hervor. Im Vogelauge iſt es nur Ein Strang, gleichſam ein Rückenmark, in welchem die Ciliarnerven von dem Knoten an bis zu ihrem Eintrit in den Bulbus vereint liegen. Ueberall aber ſtrahlen ſie während ihres Verlaufes zwiſchen Chorioidea und Sclerotica in divergirender Richtung an der hintern Augenhemiſphäre, in convergirender an der vordern. Sie ſind gangliöſe Nerven, gehören mit allen andern zu Einem Syſteme: und durch ſie leiden die Gefäſshäute des Auges bey Unterleibskrankheiten, welche gangliöſe Nevralgien ſind. Die gangliöſen Nerven bilden ſonſt überall Plexus um die Gefäſse, ſind ſelbſt Gefäſsnerven, von den Gefäſsen übermächtiget. Aber im Ciliarſyſteme bleiben die Nerven in Oppoſition mit den Gefäſsen. Alſo bildet ſich der Ciliarkörper mit ſeinen Strahlenfortſätzen, welcher die höchſte Vollendung der Chorioidea als Gefäſshaut iſt. Nämlich die Gefäſse derſelben ſenken ſich nach vorne gegen die Achſe des Bulbus herein, indem ſie ſich von der Sclerotica entfernen: — ihre Verzweigung geht in das feinſte: und da hier die Chorioidea ihre höchſte Expanſion erreicht, und

dennoch in einen kleinern Raum zurückgedrängt ist, wird sie nothwendig gefaltet. Mittelst dieser Falten, der Ciliarfortsätze, liegt die Gefäßshaut der Linse, der eigentlichen Centralbildung im Auge, an, — und gelangt mit ihr zu organischer Gemeinschaft. Aber in dem Ciliarkörper liegt der Keim einer neuen Entfaltung. Das Strahlenband ist die Erhebung der Ciliarnerven und der Ciliargefäße in ihrer wechselseitigen Durchdringung — zu einer höhern Potenz. So kömmt es zur Bildung der Iris, in welcher, da die Farbe überhaupt die Verirdischung des Lichtes anzeigt, der größte Reichthum und das mannichfaltigste Farbenspiel ist. Die Farbe der Iris rührt, da sie ein durchsichtiges Häutchen ist, von dem an ihrer hintern Oberfläche aufgetragenen Pigmente her. Sie ist niemals blau und niemals schwarz, sondern ihr Farbenspiel fällt zwischen braun und grau. Die dunklere Färbung der Iris ist ein Zeichen der im Auge vorherrschenden Irritabilität, da das sanftere blaue Auge mehr sensibel ist. In der Iris reproduciren sich alle Gegensätze der Chorioidea durch die Verschiedenheit ihrer beyden Kreise, des äussern Ringes und des innern, durch den Gegensatz ihres Pupillarrandes, und ihres Randes am Strahlenbande, — zuletzt durch den Gegensatz ihrer beyden Oberflächen, der Traubenhaut und der eigentlichen Regenbogenhaut. Sie ist die höchste Metamorphose des irritabeln Gebildes im Auge, und daher bey den höchst irritabeln Thieren, den Vögeln, selbst willkürlich beweglich: — wenigstens treffen die Bewegungen derselben mit

jenen der Augenlieder zuſammen, ohne von der durch dieſe bewirkten gröſſern oder geringern Beſchattung des Auges abhängig zu ſeyn. Bey dem Menſchen und bey den Säugthieren ſind die Bewegungen der Iris von dem Lichte abhängig, welches in das Auge fällt. Aber die Iris wird nicht vom Licht gerührt, wenn dieſs unmittelbar ihre vordere Fläche und nicht zugleich die Netzhaut trift. Daher iſt die Iris in der Regel ſteif und unbeweglich bey der Amauroſe; wenn dieſe nur auf Einem Auge ſtatt findet, und das andere geſund iſt, hängen die Bewegungen der Regenbogenhaut mehr von der Beleuchtung des geſunden als von jener des kranken Auges ab. Man kann bey jedem Menſchen, beſonders aber bey amblyopiſchen, das ſtärkere Auge von dem ſchwächern dadurch unterſcheiden, daſs die Beleuchtung oder Beſchattung des ſtärkern Auges die Bewegungen der Iris auf dem ſchwächern Auge mehr beſtimmt als umgekehrt. — Gewiſs alſo iſt die Verengerung der Pupille im heftigern Lichte nicht die Folge einer dadurch bewirkten Congeſtion und der Turgescenz der Blutgefäſse der Iris: — ſondern das Ciliarnervenſyſtem iſt das Mittelglied, wodurch das Licht auf die Regenbogenhaut einwirkt. Aber auch kein Theil jenes Nervenſyſtems, weder die Ciliarnerven ſelbſt, noch der Ciliarkörper, — noch der Ciliarknoten werden von den Lichtſtrahlen unmittelbar getroffen. Ohne alle Probabilität iſt die Hypotheſe, daſs die Lichtſtrahlen das Loch der Retina, als eine zweyte Pupille, durchgehen, und unmittelbar auf den linſenförmigen Knoten treffen. Auch das Ciliarner-

venſyſtem wird von den Lichtſtrahlen nur mittelbar, — vermöge ſeines Gegenſatzes gegen den Sehnerven und die Netzhaut — afficirt. Bey der Geſchwindigkeit der Leitung im Nervenſyſteme kann die raſche Aufeinanderfolge der Einwirkung der Lichtſtrahlen auf die Netzhaut und der beynahe ſimultanen Verengerung der Pupille — keine Schwierigkeit ſeyn.

§. 593.

Die Iris hat ein eigenes Leben, welches die Verklärung des eigenthümlichen Lebens der Gefäſshäute des Auges überhaupt iſt. Die Gefäſshaut aber iſt in dem Bulbus das dem Lichte widerſtreitende, ihm nicht aſſimilirbare, undurchſichtige, das Licht mittelſt des Pygmentes auszulöſchen beſtrebte. Die Regenbogenhaut iſt eine Oppoſition gegen das Licht: — und ſo wie die Pupille urſprünglich geſchloſſen, oder vielmehr gar nicht vorhanden iſt, bey dem menſchlichen Fötus und im Inſektenauge, ſo hat die Iris das Beſtreben, ſich wieder zu ergänzen, die Continuität herzuſtellen, und in den Zuſtand ihrer urſprünglichen Bildung zurück zu kehren; ſomit dem Lichte den Eingang in das innere Auge zu wehren. Daher verengert ſich die Pupille um ſo mehr, je heftiger das Licht iſt, welches nicht die vordere Fläche der Regenbogenhaut, ſondern welches den Pupillarrand der Iris trift. Sie erweitert ſich dagegen im Verhältniſs der Beſchattung des Auges. Das Licht fodert alſo nicht als ein äuſſerer Reitz weder mittelbar noch unmittelbar die Bewegungen der Iris; ſondern es iſt die Hetero-

genität und die Unbezwingbarkeit der Gefäſshäute des Auges durch das Licht, wodurch die Iris diesem die Pupille zu ſchlieſſen trachtet. Es iſt alſo die entgegengeſetzte Natur der Netzhaut und der Gefäſshäute des Auges, des Sehnerven und des Ciliarnervenſyſtems, wodurch die Bewegungen der Iris beſtimmt werden. Dieſe geſchehen in doppelter Richtung, — die Iris hat eine expanſive und eine contractive Thätigkeit, gleich den Sphincteren: allerdings trift der Verengerungszuſtand der Pupille mit der expanſiven Thätigkeit der Iris zuſammen, und der Erweiterungszuſtand der Pupille mit der contractiven Thätigkeit der Iris; nur iſt dieſe nicht minder thätig (nicht erſchlafft) im Expanſionszuſtande als im Contractionszuſtande. Was daher die Expanſion überwiegend hervorruft im Auge, das bringt eine Verengerung der Pupille, zuletzt Schlieſſung derſelben; was die Contraction hervorruft, das bringt Erweiterung der Pupille, zuletzt Mydriaſis hervor. Daher fordert das Licht, welches gleich iſt der unendlichen Expanſion der abſoluten Subſtanz, eine Verengerung der Pupille. Die äuſſern Influenzen, welche eine Veränderung der Dimenſionen der Pupille veranlaſſen, z. B. eine Erweiterung derſelben, thun dieſs mittelbar oder unmittelbar. Die Pupille erweitert ſich, wenn die Iris unmittelbar zur Contraction ſollicitirt wird, z. B. durch den Contact der austretenden Staarlinse. Aber ſie erweitert ſich auch in allen Zuſtänden von deprimirter Senſibilität bey der Apoplexie, Epilepſie, bey einigen Gattungen der Amauroſe, nach der Wirkung narcotiſcher Mittel, welche die Senſibilität herab-

ſtimmen. Denn ſie verengert ſich nur im Conflicte des äuſſern und des innern vom Sehnerven und der Netzhaut ausſtrahlenden Lichtes: und da wo jene Quelle des Lichtes im Auge verſiegt iſt, — da iſt es eben ſo viel, als wäre das äuſſere Licht hinweggenommen.

Aus dieſem eigenthümlichen, und in der Natur der Gefäſshäute des Auges gegründeten, ſpontanen Streben der Regenbogenhaut, die Pupille zu ſchlieſſen, — erklärt ſich bey den Säugthieren die horizontalovale Pupille der Wiederkäuer, der einhuſigen Thiere u. a., und die ſenkrechtſtehende Pupille im Katzengeſchlecht. Beyde Pupillen ſind ſchon zur Hälfte geſchloſſen, nur in ſich entgegengeſetzten Richtungen. Die Katzenpupille hat keine Breite mehr, und die Pupille der Wiederkäuer keine Länge. Eine Dimenſion iſt überall ſchon vernichtet. Die runde, oder der Rundung ſich annähernde Pupille des Menſchen und der Menſchen ähnlichen Thiere entſteht aus der Multiplication jener ſich entgegengeſetzten Formen durch einander. Unter den Säugthieren repräſentiren nicht, wie Kieſer will, die einhuſigen Thiere und die mit geſpaltenen Hufen, welche die horizontaloblonge Pupille beſitzen, das ſenſible Geſchlecht: nichts berechtigt zu einer ſolchen Annahme. Die Senſibilitätsthiere unter den Säugthieren ſind entſchieden die Quadrumanen, die am meiſten Menſchen ähnlichen: — die Reproductionsthiere ſind die Wiederkäuer und die an ſie zunächſt angereiheten; — die Irritabilitätsthiere unter ihnen aber ſind die Katzenartigen, die Raubthiere. Nur bey den Senſibilitätsthieren iſt die Pupille gerundet und kreiſig: aber da, wo eine der

niedern Dimenſionen, wenn auch nur comparativ, vorherrſchend wird, bey den irritabeln Katzenähnlichen, bey den animalibus nocturnis, — und von der andern Seite, bey den reproductiven Wiederkäuern, bey den animalibus diurnis, iſt das Gleichgewicht der Dimenſionen aufgehoben, und die Pupille ſtrebt ſich zu ſchlieſſen.

Bey den irritabeln Katzenähnlichen Säugthieren erſcheint auch wieder eine Spur von willkührlicher Bewegung der Iris: — ſo wie ſich umgekehrt bey einigen der irritabelſten Geſchlechter aus der Claſſe der Vögel die verticalovale Pupille wieder findet. Bey den Wiederkäuern und bey den Thieren mit ungeſpaltener Hufe ſind die Traubenfortsätze, welche ſich in die Pupille hereinſenken, nur Ausdruck des Strebens, die Pupille zu ſchlieſſen, und die Continuität der Iris wieder herzuſtellen; daher ſind ſie um ſo mehr entwickelt, je weniger der obere und der untere Rand der Iris in die Pupille hervorragt. Vergleichbar den Traubenfortsätzen iſt der Subſtanzenwucher am Pupillarrande der Iris im menſchlichen Auge, die fungöſen, oft condylomatöſen Auswüchſe, welche zuweilen bey der Entzündung der Regenbogenhaut entſtehen, und mittelſt derer die Pupille ſich ebenfalls zu ſchlieſſen ſtrebt.

Eben ſo liegt hierin die Bedeutung des Geſeſetzes: daſs im Säugthierauge die Iris früher iſt als die Pupille, und im Vogelauge die Pupille früher als die Iris. Denn im Vogelauge iſt die irritable oder Gefäſsbildung übermächtig: und die ganze Metamorphoſe deſſelben iſt ein Streben, eine Iris zu bil-

den und die Pupille zu ſchlieſſen. Im Auge des Säugthieres aber bricht die im gröſsten Expanſionszuſtande gebildete Iris in der Mitte auf, und athmet das hereindringende Licht.

§. 594.

Das eigentlich percipirende im Auge iſt der Sehnerve und ſeine häutige Entfaltung in der Netzhaut. — Indem die Richtung der beyden Sehnerven divergirend iſt, und dieſe von ihrer Vereinigungsſtelle nach auſſen ſtrahlen; ſo trit der Nervus opticus nicht in der Axe, ſondern dem innern Augenwinkel näher in den Bulbus ein; er vertheilt ſich in fein geſpaltene Faden, um die lamina cribroſa zu durchgehen, und ragt mit einem deutlich gewahrnehmbaren Tuberculum an ſeiner Eintritsſtelle in das Auge hervor. Von hieraus zerfahren ſeine Bündel in excentriſcher Metamorphoſe, die fadige Bildung erliſcht immer mehr in der pulpöſen, und es bildet ſich die Netzhaut, als die vollkommenſte Expanſion des Sehnerven. Nach Fontanas mikroſcopiſchen Unterſuchungen iſt auch die Netzhaut in Papillen aufgetrieben, und ihre Bildung, nur unendlich feiner, dem Corpus papillare der Haut vergleichbar. Im Mittelpunkte der Netzhaut, da wo ſie von der Axe des Augapfels durchſchnitten wird, befindet ſich ein Loch mit gelben Rändern beſäumt, und eine Falte erſtreckt ſich von dieſem Loche gegen den Eintrit des Sehnerven. Jenes Loch iſt mit einem Gefäſskranze aus Zweigen der Arteria centralis umgeben. Nur bey den Affen wird das Loch und der gelbe Fleck, bey den Makis aber

noch eine seichte Falte angetroffen; weiter hinab in der Thierreihe verschwindet alle Spur dieser Bildung; so wie der gelbe Fleck auch nicht bey dem neugebornen Kinde zugegen ist. Die Sinnesgewahrnehmung fodert die Expansion des Sinnesnerven in der Nervenhaut: denn nur eine solche expandirte Membran ist für die Eindrücke des äussern rührbar. An der Eintritsstelle des Sehnerven ist die Netzhaut noch in sich contrahirt und nicht zur Nervenhaut entfaltet. Daher kann auch von dieser Stelle, wenn sie vom Lichte getroffen wird, nicht der erste Moment der Vision ausgehen. Darum ist aber diese Stelle nicht gerade unempfindlich, und verloren für das Geschäft des Sehens: — in sie fällt der Moment der Vereinheitung des Wahrgenommenen. Hieraus erklärt sich das Verschwinden gegebener Gegenstände innerhalb des Gesichtskreises. Bernoulli's Versuche hierüber lehren, daſs die umschriebene Stelle, innerhalb welcher ein im Gesichtskreise befindlicher Gegenstand bey der Lateralentfernung unsichtbar wird, eine Ellypse sey, so wie auch die Eintritsstelle des Sehnerven ellyptisch ist.

So wie das Maximum der Expansion des Sehnerven in die ora serrata der Netzhaut fällt, so ist auch hier die Receptivität für den ersten Moment der Gewahrnehmung in der Vision die gröſste, und bey verschiedenen Gattungen der Amaurose sind die dem gezähnten Rande am meisten benachbarten Stellen der Retina öfters noch lange Zeit für das Licht empfindlich, indeſs die dem Eintrite des Sehnerven näher liegenden schon lange Zeit erblindet sind. Von allen Physiologen ist die Netzhaut als das ei-

gentliche Sehorgan betrachtet worden. Nur Mariotte schrieb diese Function der Gefäßhaut zu, und Troxler erklärt das Sehen aus dem Conflicte der Netzhaut, und der Gefäßhaut, obgleich im allgemeinen ein solcher Gegensatz zwischen der Gefäßpolarität, und der Nervenpolarität angenommen werden muss, und obgleich eben diese Antithese in der Bildung des Auges auf den höchsten Potenzgrad gebracht ist, so ist doch das eigentlich Apercipirende in der Function des Gesichts die Netzhaut allein, und die Gefäßhaut vermittelt hier lediglich den negativen Factor.

§. 595.

In der Mitte des Auges und sphärisch von den Augenhäuten umschlossen befinden sich die durchsichtigen Medien desselben, welche, ganz dem Lichte assimilirt, die edelste Bildung im Auge, und das Element jeder anderen darstellen. Ursprünglich ist aber das ganze Auge Crystall: bey dem ersten Erscheinen des Auges ist ausser dem Nerven nur die Crystalllinse vorhanden, welche zuerst zur vollkommensten Identität mit dem Lichte verklärt zwischen dem Flüssigen und Starren mitten inne steht, und weder dem Einen noch dem Anderen ausschliesslich angehört. Jede künftige Metamorphose des Auges ist nur eine Zerlegung der Crystalllinse nach sich entgegengesetzten Richtungen: von der einen Seite entwickeln sich die Gefäßhäute des Auges, und von der anderen werden aus dem Crystall die Flüssigkeiten des Bulbus ausgeschieden, und in demselben Verhältnisse nimmt die Crystalllinse am Volu-

men ab, aber an Dichtigkeit und cryſtalliniſcher Beſchaffenheit zu. Je gröſſer daher die Cryſtalllinſe in einem Thierauge iſt, deſto weniger iſt ſie von den übrigen Medien des Auges unterſchieden, und die Gröſse der Cryſtalllinſe ſteht überall im umgekehrten Verhältniſſe der Quantität der wäſſerigen Feuchtigkeit. Die Wichtigkeit der Linſe und die innige Gemeinſchaft, in welcher ſie mit dem Sehenerven ſteht, erhellet auch daraus, daſs die Centralarterie des Sehenerven das Ernährungsgefäſs ihrer Kapſel wird: die Enfaltung der Centralarterie zu einer Gefäſshaut bey ihrem Durchgange durch die Glasfeuchtigkeit erscheint im Vogelauge als der gefaltete Kamm. Die Cryſtalllinſe iſt urſprünglich ſphäriſch geſtaltet: wie bey der Sepia und bey den Fiſchen. Bey ihrer Metamorphoſe durch die Thierreihe hindurch entſteht aber eine bedeutende Verſchiedenheit zwiſchen der vordern und der hintern Hälfte: beyde ſind Segmente zweyer im Durchmeſſer ſehr verſchiedener Kugeln. In dem Menſchenauge iſt die Convexität der hintern Hemisphäre der Linſe weit gröſſer als jene der vordern. Die Hornhaut iſt gewiſſermaſſen hier als die Ergänzung der vorderen Hemisphäre zur Herſtellung der vollkommnen Kugelgeſtalt zu betrachten. Die Cryſtalllinſe iſt auch eine in ihrer Textur mit der Hornhaut übereinſtimmende Bildung. Sie beſteht gleich jener aus einzelnen Lamellen, zwiſchen welchen ein der Morgagniſchen Flüſſigkeit ähnlicher Dunſthauch enthalten iſt. Sie beſitzt in der Mitte einen feſten Kern, um welchen ſich die Lamellen in concentriſchen Schichten anlegen. So wie die Cohäſion der Hornhaut-

lamellen von auſſen nach innen abnimmt, ſo jene der Lamellen der Cryſtalllinſe von innen nach auſſen. Im Mittelpunkte des Bulbus gelagert, iſt ſie mit einer eignen Kapſel und mit einer beſondern Flüſſigkeit umgeben, von welchen ſie an Pelluciditāt noch übertroffen wird. Der Stoffwechſel geſchieht äuſſerſt langſam in ihr, und daher ſind einmal entſtandene Trübungen derſelben äuſſerſt ſelten oder niemals wieder auflöslich. Sie bricht die Lichtſtrahlen zur convergirenden Richtung im Verhältniſſe der Convexität ihrer Oberfläche, im Verhältniſſe ihrer Dichtigkeit, welche nicht nur abſolut, ſondern auch relativ zu jener der wäſſerigen Feuchtigkeit zu betrachten iſt, zuletzt im Verhältniſſe ihrer Combuſtibilität. Die Cryſtalllinſe läſst die Lichtſtrahlen nicht bloſs mechaniſch durch ſich hindurchgehen: ſondern die Leitung iſt als eine dynamiſche zu betrachten: ſie erleidet ſelbſt hiebey eine progreſſive Entmiſchung: ihre Verhärtung und die Verwachſung ihrer Lamellen bey der Cataracta ſenilis iſt die Folge ihrer endlichen totalen Combuſtion durch das Licht, ihre letzte Metamorphoſe. Die vordere Augenhemisphäre iſt mit der wäſſerigen, die hintere mit der gläſernen Feuchtigkeit erfüllt. Beyde ſind von einerley Natur und qualitativen Beſchaffenheit. Ihr ſpecifiques Gewicht iſt nur wenig von jenem des deſtillirten Waſſers unterſchieden, ſie enthalten nur wenige Salze, die wäſſerige eine ſehr geringe, die gläſerne eine etwas gröſſere Quantität von Eyweiſsſtoff. Die Wäſſerige iſt die am meiſten indifferente unter allen thieriſchen Flüſſigkeiten. Die Glasfeuchtigkeit iſt in einer beſon-

dern Haut eingeſchloſſen, welche ſie nicht nur als Kapſel von auſſen umgiebt, ſondern auch vermöge ihrer ſchwammigen Beſchaffenheit Zellen bildet, in denen ſie enthalten iſt. Aber auch die wäſſerige Feuchtigkeit iſt in einer beſonderen Haut enthalten, die an der inneren Oberfläche der Hornhaut, beſonders im Auge des Pferdes, am leichteſten zu erkennen, und von den Hornhautlamellen zu unterſcheiden iſt. Die wäſſerige Feuchtigkeit iſt in den beyden Augenkammern, der vordern und der hintern enthalten, in ihr ſchwimmt die Regenbogenhaut, welche im geſunden Zuſtande eine beynahe ſenkrecht herabhängende nur mit einer ſehr geringen Convexität nach vorne prominirende Membran darſtellt. In der vordern Augenkammer beträgt das Gewicht der wäſſerigen Feuchtigkeit fünf, in der hintern zwey Gran. Das Verhältniſs der wäſſerigen Feuchtigkeit, der Cryſtalllinſe und der Glasfeuchtigkeit unter ſich iſt in den beſondern Thierclaſſen ein verſchiedenes. Fiſche und Vögel bilden darin einen Gegenſatz unter ſich. Das Aug der Fiſche beſitzt eine beynah ſphäriſche durch die Pupille in die vordere Augenkammer hervorragende Cryſtalllinſe; die Hornhaut iſt abgeplattet; denn die Convexität der Hornhaut, und ſomit die Convexität der vordern Augenhemiſphäre ſteht überall im umgekehrten Verhältniſſe der Convexität der Cryſtalllinſe. Im Vogelauge iſt die Cryſtalllinſe beynahe abgeplattet: dagegen iſt die vordere und hintere Augenkammer ſehr groſs, daher die Quantität der wäſſerigen Feuchtigkeit ſehr beträchtlich. Das menſchliche Auge, und das Auge der Säugthiere

steht auch hierin in der Mitte zwischen den beyden extremen Bildungen.

§. 596.

Das phänomenologische in der Function des Gesichtes ist das folgende: — Das Licht bildet das Medium zwischen dem gewahrenden Sinn, und dem zu gewahrenden Objekte. Es befindet sich zwischen beyden eine Strahlenpyramide, deren Basis an dem beleuchteten Gegenstande, deren kegelförmige Spitze aber an den Sehorgane befindlich ist. Die zu sehr divergirenden Strahlen werden von den Augenliedern, Augenliederhaaren, von der Sclerotica, und besonders von der Iris zurückgeworfen, diejenigen aber, welche gegen die gröſste Convexität der Hornhaut hintreffen, dringen durch die Pupille ein und gelangen zur Netzhaut. Diese Strahlen werden zuerst durch die Hornhaut im Verhältnisse des Grades ihrer Dichtigkeit, Combustibilität, und Convexität gebrochen, und zur convergirenden Richtung bestimmt. Von dieser deflectiren sie etwas, indem sie die wässerige Feuchtigkeit durchgehen, und also aus dem dichtern Medium in das weniger Dichte gelangen. Besonders aber ist die Refraktionskraft der Crystalllinse sehr groſs, die Strahlen werden hiedurch beynahe ganz zur parallelen Richtung bestimmt, und durchgehen, ohne bedeutend gebrochen zu werden, den Glaskörper, als die letzte centrirende Potenz im Auge. Sie treffen zuletzt in einem Punkte an der Retina zusammen, welcher den Gipfel des Strahlenkegels bildet.

Bey dem Sehen treffen die durch die Medien des Auges gebrochenen Lichtſtrahlen an der Netzhaut auf ſolche Weiſe zuſammen, daſs dort das Bild des beleuchteten Objektes entſteht. Im Auge der Nachteule, deren Sclerotica nach hinten durchſichtig iſt, in einem künſtlich-nachgebildeten Auge, und in einem friſchen Augapfel, von welchem man nach hinten ein Stück der Sclerotica und der Chorioidea lospräparirt, ohne die Glasfeuchtigkeit ausflieſsen zu laſſen, kann man bey gehöriger Stellung gegen das Licht das Bild des beleuchteten Gegenſtandes mit Augen ſehen. Dieſes Bild iſt umgekehrt: denn da die Lichtſtrahlen ſich nicht in paralleler Richtung, ſondern divergirend fortpflanzen, ſo müſſen nothwendig diejenigen, welche von den ſich entgegengeſetzten Endpunkten eines beleuchteten Objektes herkommen, ehe ſie auf die Netzhaut treffen, ſich kreutzen. Dieſe Umkehrung des geſehenen Gegenſtandes aber bringt keine Verwirrung unſerer Vorſtellung von demſelben hervor, weil ſie nicht einen Gegenſtand allein, ſondern alle ſeine Umgebungen zugleich trifft, und folglich alles wieder an ſeinen natürlichen Platz geſtellt wird.

§. 597.

Die Sinnesorgane ſind nicht doppelt vorhanden, — der Menſch hat wohl zwey Augen und zwey Ohren, aber er beſitzt nur Ein Sehorgan und Ein Gehörorgan. Die Frage, warum der Menſch mit zweyen Augen irgend einen Gegenſtand nur Einmal ſehe, hat keinen richtigen Sinn. Denn ſie iſt

ist gleichbedeutend mit der Frage: warum der Mensch mit Einem Sehorgan nicht doppelt sehe? Die Dyplopie ist eine Krankheit, im gesunden Zustande ist sie nicht vorhanden, und sie hat folglich nicht nöthig, durch was immer für eine Künsteley der Erklärung aufgehoben zu werden. Der Mensch nimmt mit zwey Augen einen Gegenstand nur Einmal gewahr. Wenn aber beyde Sehaxen sich nicht entsprechen, entsteht allerdings eine doppelte Perception. Von dieser Dyplopie ist diejenige zu unterscheiden, welche auf Einem und demselben Auge statt findet, z. B. bey facettirter Beschaffenheit der exulcerirten Hornhaut. — Gewiss ist es natürlich, mit beyden Augen zugleich zu sehen, und weder ist das Eine andauernd blind, noch die Blindheit abwechselnd. Aber eben so gewiss ist es auch, dass die Vernachlässigung des Einen Auges bey dem Sehen ein sehr gewöhnlicher Fehler, und daher bey den meisten Menschen Ein Auge ohne allen Vergleich sehkräftiger als das andere ist. Diese Vernachlässigung bringt zuletzt den höchsten Grad der Amblyopie, manchmal sogar Amaurose hervor. Der von Haller angeführte Fall, in welchem ein Mann mehrere Jahre, ohne es zu wissen, eine Cataract auf dem Einen Auge hatte, und als er zufällig einmal das gesunde Auge schloss, mit Schröcken die Blindheit des andern wahrnahm, ist eine nicht ungewöhnliche Erscheinung, und wird häufig beobachtet.

Der Gesichtspunkt bezeichnet diejenige Entfernung, in der ein Mensch deutlich lesen, und

kleine Gegenſtände unterſcheiden kann. Der Geſichtspunkt iſt nicht nur bei verſchiedenen Menſchen verſchieden, ſondern auch der nämliche Menſch kann in ſehr verſchiednen Entfernungen gleich gut ſehen, gewöhnlich in der von 6 - 7 Zollen bis zu einer 6 mal gröſſern Entfernung. Die Verlängerung derjenigen Linie, deren Ende der Geſichtspunkt iſt, wird bewirkt durch die Abplattung des Augapfels mittelſt der gleichzeitigen Wirkung der geraden Augenmuskeln durch die Erweiterung der Augenliederſpalte, und die der Pupille vermöge der geringen Quantität vou Lichtſtrahlen, welche von einem entfernten Gegenſtande in das Auge fallen, indem die meiſten hier divergiren, und folglich das Aug nicht treffen. Gerade das Gegentheil geſchieht, wenn ein nicht kurzſichtiger Menſch einen Gegenſtand in der Nähe betrachtet. Gewiſs iſt es, daſs hiebey die Pupille um vieles verengert wird, im Verhältniſs der gröſſern Menge von convergirenden Strahlen, welche von dem beleuchteten Gegenſtande ausgehen. u. ſ. f.

Gattung 3.

Seelenverrichtungen.

XXVIII. Kapitel.

§. 598.

Das Phyſiſche iſt nirgends in ſich vollendet: es bedarf überall, damit es ein Ganzes werde, des

Pſychiſchen, und da, wo es einen Mittelpunkt des Seyns in ſich gefunden, und ſich zu einer wahrhaften Totalität vollendet hat, geht in ihm die Seele auf, welche, obgleich im Körper erſcheinend, dennoch frei, und unkörperlich, ohne Vermiſchung mit ſinnlichen Dingen, und wahrhaft unſterblich iſt, gleich der Idee, deren reines Durchwirken durch die Endlichkeit eben die Seele iſt. Die Seele iſt daher ſchlechthin Urbildliches, und hat nichts gemein mit der Materie; aber ſie iſt Urbildliches im Gegenſatzte des Endlichen, in das materielle Seyn Gebohrnen; d. h. die Seele iſt an dem Urbildlichen gerade diejenige Seite, wodurch daſſelbe ſich in dem Sinnlichen zu manifeſtiren, und dieſes als das Werkzeug ſeiner Offenbarung ſich zu unterwerfen trachtet. Daher iſt die Seele jedes Menſchen ewig, inſofern ſie der urbildlichen Welt angehört: — aber inſofern ſie ein Durchwirken des Urbildlichen durch das Sinnliche, d. h. inſofern ſie die Seele gerade dieſes Menſchen iſt, wird ſie mit ihm erzeugt, und hat eine beſtimmte Lebenszeit. Denn die Seele iſt nicht bloſs das Princip der Individualität, etwa der Schluſsſtein der Beſonderheit eines Dinges; ſondern ſie iſt an jedem Beſondern gerade die unendliche Liebe des Ganzen, — dasjenige, wodurch daſſelbe ſeine Beſonderheit aufzugeben, und nur geiſtig im Ganzen fortzuleben trachtet. Nicht damit das Sinnliche als ſolches in ſich geſchloſſen, und vollendet ſey, muſste die Seele erſchaffen werden, ſondern damit jenem das Urbildliche als Wahrheit, Güte, und Schönheit ein-

wohne, und von ihm erkannt werde. Die Seele iſt nicht das Vermögen, ſolches zu erkennen, ſondern ſie iſt deſſen lebenbige Erkenntniſs.

Alle phyſiologiſche Probleme haben nur Eine Löſung: — die Frage iſt überall dieſe: wie die Seele auf den Körper wirke, und wie dieſer auf die Seele wirke. Denn iſt keine Harmonie zwiſchen beyden präſtabilirt, ſo iſt es unmöglich, einzuſehen, wie die Affection des Sinnesnerven zur Anſchauung, wie der Gedanke zum Wort, und wie die Vorſtellung zur Bewegung werde. Denn dem Wort iſt ſein Geiſt, ſeine Bedeutung nicht etwa äuſſerlich beygegeben, jenes iſt nicht das Vehikel des Gedankens, ſondern es iſt der ausgeſprochene Gedanke ſelbſt: ſo wie in dem plaſtiſchen Kunſtwerk die Idee nicht etwa über den Stein ausgegoſſen iſt, ſondern ihn durchdringt, und eine Einheit mit ihm erzeugt, welche ſich als Schönheit der Form darſtellt. — Das eigentlich Menſchliche in dem Leben iſt nun gerade dieſes, daſs ein beſtändiger Umtauſch zwiſchen phyſiſchen und pſychiſchen geſchehe; daſs in jedem Augenblick das Eine das Andere werde; wodurch ſich die Einheit der Subſtanz und des durchaus gleichen Grundes in beyden offenbart.

§. 599.

Nämlich die Art und Weiſe, wie die Seele mit dem Gehirn verbunden iſt, und deſſelben als des Organes ihrer Manifeſtation ſich bedient, iſt die nämliche, auf welche die Idee in dem Kunſtwerke lebt, und dieſem verbunden iſt. So wie das ganze

Wesen der Idee in das Material des Kunstwerkes aufgenommen, und in diesem durch die Schönheit der Form abgedrückt ist, so wie die Form an und für sich todt, nur durch die Idee, deren Ausdruck sie ist, Leben und Schönheit hat; auf solche Weise ist das vollkommenste und edelste Gebilde des Leibes, das Gehirn, — die Basis, mit welcher sich die Seele als begeistendes Princip verbindet, d. h. in welchem sie sich selbst erschafft, und ihr Streben hervorbringt. Das Gehirn ist daher Organ der Seele, nur wie das Niedere überhaupt Bedingung der Manifestation des Höhern ist, nicht indem es als solches besteht, und dieses aufnimmt, sondern indem es von ihm überwältigt, und, in seiner Unwesentlichkeit aufgehoben, zur Identität mit ihm selbst gebildet, und erhoben wird. Daher ist das Gehirn ein Plasma der Seele, ganz ihre Schöpfung, ihr Werk; und jede Form des Hirns und seiner Theile ist ein plastischer Ausdruck einer besondern Seelenthätigkeit.

§. 600.

Die Seele ist Nichts als Wahrheit, Güte und Schönheit. Diese sind die Elemente ihres Lebens. Sie erkennt nicht das Wahre, sie will nicht das Gute: — sie ist selbst eine lebendige Erkenntniss des Wahren, ein Wollen des Guten; sie ist nicht schön gleich den körperlichen Dingen, sondern sie ist die Schönheit selbst. Es giebt daher nicht nur eine Erkenntniss, in welcher das Erkennende und das Erkannte Einig und ewig verbunden sind, sondern jede wahre Erkenntniss ist eine solche. Es

giebt nicht allein angebohrne Begriffe; ſondern jede Erkenntniſs iſt angebohren, und vom Anbeginn her ſtumm in der Seele vorhanden: Niemanden kann man etwas lehren, was er nicht ſchon wiſſe, und alles Wiſſen iſt nur ein Erinnern an das längſt Erkannte.

Wird die Seele im erſten Momente als Wahrheit vorgeſtellt, ſo iſt ſie nicht ein Vermögen der Erkenntniſs, ſondern die Erkenntniſs ſelbſt. Dieſes ſagt das Wort Intelligenz, welches nicht ein Vermögen zur Erkenntniſs, ſondern die zugleich mit dem Vermögen vorhandene lebendige Erkenntniſs ſelbſt bezeichnet. — Nur inſofern die Erkenntniſs in ihre einzelne Momente auseinander geht, iſt ſie eine verſchiedene, und alsdann entweder eine sinnliche, verständige, oder einbilderische.

Denn auch der Sinn (der Sinn in den Sinnen) wurzelt in der Seele, und wird erſt körperlich in den Sinnesorganen. Es giebt ſomit ein Senſorium, und dieſs iſt das eigentliche und wahre Sinnesorgan.

Die Verſtandeserkenntniſs iſt entweder Begriff, Urtheil oder Schluſs. Dieſe drey Verſtandesfunctionen ſind dem Weſen nach ſich gleich, nur der Form nach verſchieden: jede Verſtandesfunction iſt ein Streben, das Mannichfaltige zur Einheit zu bringen: der Begriff iſt die Einheit des ſinnlich gegebenen, inſofern er nämlich empiriſch, collectiv gebildet iſt. Die ſogenannten Begriffe a priori aber enthalten nur das Eine Element der Idee, deren Nachbild ſie ſind, — die Einheit, ohne die Unendlichkeit in ſich zu faſſen: — das Urtheil iſt

die Einheit der Begriffe. der Schluſs die Einheit der Urtheile. Die Function des Verſtandes bey der Bildung der Begriffe, iſt die Abſtraction, — bey der Bildung der Urtheile die Reflexion, — bey der Bildung der Schlüſſe die Subſumtion. Der Verſtand, als das Vermögen, Begriffe zu bilden, iſt die Aufmerkſamkeit — als das Vermögen, Urtheile zu bilden, wird er Urtheilskraft, — und im dritten Momente ſeiner Thätigkeit Schluſsvermögen genannt.

Die Sinneserkenntniſs in ihrem Uebergange zur Verſtandeserkenntniſs — iſt das Gedächtniſs. Dieſes ſteht mit doppeltem unentſchiedenem Character zwiſchen beyden Potenzen mitten inne. Daher ſeine räthſelhafte, und in ſich verſchloſſene Natur. Da, wo es mehr die bloſs reproductive Natur des Sinnes annimmt, heiſst es Erinnerungsvermögen: — das eigentliche Gedächtniſs iſt ſchon mehr verſtändlich. Die Einbildungskraft iſt das Vermögen der Totalität der Erkenntniſs. Sie iſt der Stachel der beyden andern Erkenntniſsvermögen, und die Erinnerung ihrer Unvollſtändigkeit. Sie iſt reines Streben nach Totalität, und wo ſie fehlt, da iſt bey der tiefſten Sinnigkeit, oder bey dem klarſten Verſtande nur Plattheit, Verworrenheit, und Selbſtvernichtung aller Erkenntniſs. Das Anſich aller Erkenntniſs, welches keiner Potenz insbeſondere angehört, ſondern die Identität aller darſtellt, — iſt die Vernunfterkenntniſs. Die Vernunft, inſofern ſie des Sinnes als ihres Organes ſich bedient, ſchauet an (Vernunftanſchauung). Da, wo ſie des Verſtandes als ihres Organes ſich bedient, erzeugt ſie, als Göttliches das Göttliche, den

ewigen Begriff, die Idee, — da, wo ſie der Einbildungskraft als ihres Organes ſich bedient, erſchaft ſie die Urbilder der Dinge.

§. 601.

So wie die Vernunft das Anſich des Erkennens iſt, ſo iſt der Willen das Anſich alles Begehrens.

Daher ſind beyde weder frey, noch der Naturnothwendigkeit untergeben; ſondern ſie ſind das Anſich aller Freyheit und Naturnothwendigkeit. Oder die Vernunft iſt Vernunft, inſofern ſie ſich als das Anſich alles Erkennens affirmirt, ſie iſt Willen, inſofern ſie ſich als das Anſich alles Begehrens affirmirt. — So wie die Vernunft aber weder Sinn, oder Verſtand, noch Einbildungskraft insbeſondere iſt, ſondern die ſich in allen wiederholende, ewig ſich ſelbſt gleiche Wurzel, ſo iſt auch der Willen weder Trieb, Begierde, Affekt noch Leidenſchaft, ſondern er iſt das Anſich aller dieſer Dinge; und ſo wie der Sinneerkenntniſs und der Verſtandeserkenntniſs ihre Wahrheit nur von der Vernunft kömmt, die in ihnen iſt, ſo iſt auch die Begierde und der Affekt nur gerecht und edel, wenn der reine Willen ſich in ihnen manifeſtirt, und wenn nicht das Zufällige, die Form, für das Weſentliche geſetzt wird.

Die Leidenſchaft insbeſondere, die reine und heilige, iſt eine Offenbarung des kräftigſten, herrlichſten Lebens der Seele, ein wahrhaft unbedingtes, und urbildliches Seyn, von daher aber auch verzehrend für das irdiſche und vergängliche Seyn, eine allzu raſche Conſumption, wenn nicht der Wille in

seiner Freyheit hervortrit, und die Glut der Leidenschaft mässigt.

§. 602.

Wird die Seele im dritten Moment als Schönheit vorgestellt, so ist sie reines Kunstvermögen, aber eben daher auch sich selbst künstlerisch zu bilden, und gleichsam als ein Kunstwerk darzustellen bestrebt. Was als Schönheit an der Seele erkannt wird, das ist eine bleibende Gestaltung, ein Plasma derselben, was niemals vergeht, und herrlich im Thun und Wirken sich abdrückt.

§. 603.

Dieselben Potenzen, welche die Seele als Intelligenz u. s. f. ewig vereint in sich trägt, aber in successiver Entfaltung als Besonderheiten hervortreten läſst, — durchläuft in plastischer Gestaltung das Gehirn, welches auf nachbildliche Weise, was die Seele auf urbildliche Weise, darstellt. Die erste Bedeutung des Gehirns ist diese, daſs es das Centrum der Position aller übrigen Organe in sich enthalte. — Daher wohnt das Leben ursprünglich im Gehirne, und alle Belebung kömmt den übrigen Organen vom Gehirne. Die Abhängigkeit jedes Organs vom Gehirne in Rücksicht seiner Lebensäusserung ist um so grösser, je höher dieſs Organ selbst in der Scale der Organe steht. Am innigsten verbunden lebt und stirbt mit ihm das Auge. Eben so ist die Abhängigkeit der Theile vom Gehirne grösser bey den edleren Thieren; manche Amphibien leben nach der Zerstöhrung des Gehirns noch fort: Insecten

bewegen ſich nach abgeſchnittenem Kopfe. — Alsdann iſt das Gehirn Senſorium: oder die Sinnenerven verlaufen in convergirender Richtung gegen das Gehirn; — den erſten Anſatz zum Gehirne ſelbſt bilden die Sinneshügel, oder die Totalität der Ganglien, welche den Sinnenerven vorſtehen. Aus dieſen wächſt das ganze groſse Gehirn, beſonders mit ſeinen vordern Lappen hervor.

Wie die Sinneerkenntniſs in ihrem Uebergange zur Verſtandeserkenntniſs Gedächtniſs iſt, ſo liegen zu unterſt und unmittelbar auf der obern Augenhöhlenplatte die Organe der Gedächtniſſe, und zwar ſo, daſs immer die gegen die Mitte hin zurückgedrängten die Einheit deſſen enthalten, was die nach auſſen und zur Seite gelagerten in der Differenz darſtellen. So wie jene Gehirntheile ſich in die höhere Stirngegend erheben, werden ſie Abbilder der Potenz des Verſtandes; je mehr aber der Verſtand eines Menſchen noch auffaſſend und Begriffe bildend iſt, deſto mehr drängt ſich auch das Gehirn gegen die Seitentheile der Stirngegend hin; je mehr er aber als Vermögen die Einheit des Mannichfaltigen hervorzubringen in ſich beſteht, deſto mehr iſt auch die ganze Maſſe der vordern Gehirnlappen gegen einen Punkt ihrer gröſsten Hervorragung zuſammengezogen, und macht dort die Stirne kugelich hervorſtehend. Iſt der Verſtand eines Menſchen mehr Witz, d. h. ein Vermögen, in dem Getrennten eine fingirte Einheit, aber nur als Symbol der wahren verborgenen Einheit, zu erkennen, ſo zieht ſich auch die Gehirnmaſſe nicht gegen die Stirnnähe hin, ſondern gegen die Seitentheile der Stirne

in zwey hügeliche Hervorragungen zusammen. Bis dahin der vertical - aufsteigende Theil des Stirnbeines: — niemals ist bey verständigen Menschen diese Schädelgegend ohne bedeutende Hervorragung: — bey jeder Thiergattung ist die Verständigkeit derselben nach der Entwicklung der vordern Gehirnlappen in dieser Gegend zu ermessen. — Je mehr sich aber die Gehirnmasse eines Menschen in die höchste Stirngegend erhebt, und dort den vordern Theil des Schädeldaches in die Höhe treibt, desto thätiger ist in der Seele desselben die Einbildungskraft. So wie alle Schwärmerey nur das Werk der einzeln für sich und ungezügelt vom Verstande hervortretenden, gleichsam entwurzelten Einbildungskraft ist; so ist auch die Stirne des Schwärmers durch die kühnste Aufdachung des Stirnbeines in jener Gegend, und durch das gleichzeitige Zurückweichen desselben in der Region des Verstandes ausgezeichnet. So wie die Vernunft ewig ober allen Potenzen der Erkenntniss und keine insbesondere ist, so ist auch die ebenmässige, gleichsam volltönnige, kräftige und dennoch milde Entwicklung aller dieser Regionen insgesammt, ohne Härte und Vorsprung einer einzelnen der Ausdruck der Vernünftigkeit. So wie die Religion ober aller Erkenntniss, und überhaupt ober allen menschlichen Dingen steht, und nur der Kunst, und der dichterischen Begeisterung zugängig ist, so ist auch die höchste Erhebung der Stirne, und das beständige Aufsteigen derselben bis zur Kranznäthe Ausdruck der Religiosität.

Je mehr an den Seitentheilen der Stirngegend die Gehirnmasse auseinander geht, je mehr sie, von

oben und vorne zurückgedrängt, am Schläfetheil des Stirnbeines noch hervorragt, desto mehr verschwindet auch aus der Seele der Trieb zur Erforschung der letzten Ursachen der Dinge, die Erkenntniss des Ansich Wahren und Schönen. Dagegen entwickelt sich immer mehr das Talent der Nützlichkeit, das sçavoir faire, was in seinem individuellesten Ausdrucke das Vermögen technischer Anordnung, und Erfindung (nur nicht Kunstsinn) ist.

§. 604.

Das kleine Gehirn bildet sich überall früher als das Grosse zu einem bedeutenden Grade von Vollkommenheit; es stehet überall im Gegensatze gegen das grosse Gehirn, auch im umgekehrten Verhältniss der Grösse, und insbesondere nimmt die Grösse des kleinen Gehirns im Verhältniss zu jener des grossen in dem Maasse ab, als die Thiere verständiger werden. Das kleine Gehirn ist von daher als das Organ der thierischen Triebe zu betrachten, unter welchen der Geschlechtstrieb der mächtigste ist; das kleine Gehirn ist das noch thierische im Gehirn. Die dem Zelte des kleinen Gehirns aufliegenden hintern Lappen des grossen Gehirns, nehmen noch am meisten an der Natur desselben Antheil, und enthalten die Abbilder der gemüthlichen Eigenschaften der Seele: — es ist durchaus die Liebe — Geschlechtsliebe, freundschaftliche, elterliche u. s. f., welche die Entwicklung des Hinterkopfes bestimmt. Je mehr Gemüth und Liebe ein Mensch hat, desto mehr sind die hintern Lappen des grossen Gehirns entwickelt, und auch in der Hinterhauptsge-

gend ist jede bestimmte Hervorragung besonderer Gehirntheile ein physiognomischer Ausdruck besonderer gemüthlicher Eigenschaften.

§. 605.

Was in der Seele des Menschen plastisch und künstlerisch gebildet ist, das setzt sich als eine bestimmte Gestalt, als eine Propension, Neigung im Character fest: und beherrschet eben so wohl die Erkenntniss als den Willen. Diess sind die mächtigen Gewalten, welche dämonisch den Einzelnen besitzen, und das Ganze bewegen. Zuerst zieht sich an der Vereinigungsstelle des Stirnbeines und der Seitenwandbeine die Gehirnmasse in zwey aneinander liegenden Aufwölbungen zusammen, und diese sind der Ausdruck der Bestimmtheit, und der Festigkeit des Entschlusses. Je mehr hier die Mitte eingedrückt, und die Seitengegenden hervorragend sind, desto unbestimmter ist der Character des Menschen, desto zweifelsüchtiger, schwankender, scheu umhersehender, ungetreuer ist er. Dann folgt immer nach dem Verlaufe der Pfeilnäthe das Herrschertalent, welches Eines ist mit dem Streben nach Herrschaft. Sein Gegentheil ist die Ränkesucht, die Schlauigkeit, und das Diebstalent, welches daher auch hier wieder in den Seitengegenden hervortrit, und sich oft wie ein aufgerollter Wulst bis in die Stirngegend fortsetzt. Unter diesem nach hinten trit die Ruhmbegierde hervor, die, je mehr sie Eitelkeit wird, desto mehr auch in die Breite geht, u. s. f.

§. 606.

Von dem Gehirne kann aber nicht behauptet werden: weder, daſs es aus einzelnen Organen (Hirnorganen) zuſammengeſetzt ſey, noch daſs es bey den einzelnen Seelenverrichtungen in Maſſe wirke. Gewiſs iſt das Gehirn nicht alſo aus Hirnorganen zuſammengeſetzt, wie das Muskelſyſtem aus Muskeln, und die Organe laſſen ſich in jenem nicht ſo präpariren, und iſolirt darſtellen, wie die einzelnen Muskeln. Das Verhältniſs der einzelnen Gehirntheile unter ſich iſt ein lediglich durch die Senſibilität vermitteltes. Wer das Weſen der Senſibilität erkannt hat, dem iſt auch der Bau des Gehirns klar. — Wenn es bis zur Lehre vom Gehirne gekommen iſt, dann geht die gewöhnliche Phyſiologie zum Ende; da aber die ganze Phyſiologie nur Ein Problem hat, und dieſs gerade die Lehre von den Verrichtungen des Gehirns iſt; ſo hat ſie eigentlich, da ſie mit Scheue vor dieſem zurücktrit, gar nicht angefangen. Das Gehirn iſt zuerſt eine tuberculöſe, aus vereinzelten Knoten beſtehende Bildung. Durch die Knoten wird im Nervenſyſtem, welches nur der organiſch gewordene Ausdruck einer rein dynamiſchen Leitung iſt, die Continuität, ſo wie jener Leitung, ſo der Nerven ſelbſt unterbrochen. Wie alſo jeder Knoten eine Hemmung des urſprünglichen Expanſionsſtrebens darſtellt, von welchem das Nervenſyſtem beſeelt iſt, — ſo iſt das Gehirn zuerſt eine Juxtapoſition ſolcher Ganglien; nämlich das Haupt jedes nicht acephalen Thieres iſt da, wo ſich die meiſten Ganglien zu-

ſammen drängen. Da die Ganglien der Nerven, der edleren Sinne am meiſten nach organiſcher Gemeinſchaft und nach wechſelſeitiger Durchdringung ſtreben, ſo ſind ihre Organe auch immer am Haupte gelagert. Aber jene bloſse Juxtapoſition ſoll wieder aufgehoben werden, und in die innigſte dynamiſche Durchdringung übergehen: das Gehirn iſt ein lebendiger Inbegriff, eine organiſche Syntheſis von Ganglien. Es bleiben daher in den Gehirnen der höheren Thiere nur einzelne Knoten als ſolche zurück, wie die Vierhügel, die Sehnervenhügel, die geſtreiften Körper: und dieſe gehören meiſtens den Sinnenerven an: die Sinneshügel ſind daher am wenigſten in die Totalität der übrigen Ganglien in der Gehirnmaſſe verſchmolzen. Je weniger die Gehirnbildung in irgend einer Thierclaſſe vollendet iſt, deſto zahlreicher ſind jene noch unterſcheidbaren Ganglien vorhanden: am zahlreichſten in den Fiſchgehirnen, wo zuweilen ſogar noch aus dem verlängerten Marke ſolche Knoten hervorwachſen. Aber noch bey allen mit Wirbelbeinen verſehenen Thieren, welche nicht Säugthiere ſind, befindet ſich eine gröſſere oder kleinere Reihe ſolcher Ganglien zwiſchen den geſtreiften Körpern und den Sehhügeln. Bey Vögeln und Fiſchen ſind die Sehhügel ſelbſt noch am meiſten von der übrigen Gehirnmaſſe getrennt, und ſie liegen unter der Baſis des Gehirns; vor den Sehhügeln befinden ſich gewöhnlich vier Knoten. Bey den Amphibien liegen die Sehnervenhügel hinter den Hemiſphären: — nur bey den Säugthieren ſind ſie in die Gehirnhöhlen ſelbſt aufgenommen, und am innigſten mit

dem Mark der Hemiſphären, und mit den geſtreifſten Körpern, ohne dazwiſchen liegende Knoten, verbunden. — Die Tendenz der Gehirnbildung iſt nun diese, nach aufgehobener Vereinzelung der Ganglien ſich in eine gemeinſame Markmaſſe auszubreiten. Daher erhebt ſich aus dem geſtreiften Körper, als dem Hauptganglion jeder Hemiſphäre, die geſamte Markmaſſe derſelben, und ſie entfaltet ſich in den Windungen beſonders des vorderen Lappens. Bey allen mit Wirbelbeinen verſehenen Thieren ſind ſolche hemiſphäriſche Aufwölbungen zugegen. Je mehr aber die Theile des Gehirns zuſammengedrängt (je mehr ſie concentriſch - geſtellt) ſind, je mehr ſie einander verdecken, und je weniger ſie von einander abſtehen, deſto mehr wächſt die Verſtändigkeit eines Thieres. Beſonders aber richtet ſich dieſe nach dem Grade der Entfaltung der geſamten Markmaſſe der geſtreiften Körper in den Hemiſphären, nach dem Umfange derſelben, nach der Dichtigkeit des Markes in ihnen, und nach der Anzahl ihrer Windungen. Aus dieſer Zuſammendrängung und concentriſchen Stellung der einzelnen Gehirntheile geht bey dem Menſchen die Kugelgeſtalt dieſes Eingeweides hervor, welche bey ihm — bey der Ebenmäſſigkeit der verſchiedenen Durchmeſſer des Gehirns die vollkommenſte iſt, da bey andern Thieren dieſe Ebenmäſſigkeit der einzelnen Durchmeſſer immer mehr geſtöhrt, und das Gehirn bey den am wenigſten Menſchenähnlichen immer mehr in die Länge gezogen wird. Der gröſste Umkreis des Markes iſt in dem eyförmigen Mittelpunkt,

punkt, welcher ein wahres Centrum jeder Hemisphäre in sich selbst ist. Indem also die ganze Markmasse in eine durchaus gleiche Substanz ohne fernere Unterscheidbarkeit der Theile aufgelöst ist, bilden sich im Innern des Gehirns die verschiedenen Höhlen, die vordern paarigen, die dritte, vierte, die Wasserleitung des Sylvius, der Trichter, welche insgesamt in einander offen stehen, und in allen Thiergehirnen nur verschiedene Abtheilungen Einer grofsen Höhle darstellen. Diese innere Höhlung des Gehirns entsteht aus der Getrenntheit der beyden Hemisphären; denn auch die beyden Seitenventrickeln sind nur durch solche Zwischenbildungen von einander geschieden, welche eine Vereinigung des Markes beyder Hemisphären vermitteln. Die dynamische Gemeinschaft der einzelnen Gehirntheile unter sich ist nämlich besonders durch die verschiedenen Commissuren vermittelt, in welchen die Markmassen von sich entgegengesetzten Seiten zusammenlaufen. In allen Thiergehirnen aus den höhern Classen findet sich die vordere und die hintere Commissur. Die vollkommenste Durchdringung aller Markfasern aber findet statt im callösen Körper, in dem Gewölbe, zuletzt im Hirnknoten, welche Theile daher auch nur im Gehirne der Säugthiere vorkommen. Im schwieligen Körper durchdringen sich die Queerbündel der Markfasern aus den beyden Hemisphären: im Hirnknoten aber vermischen sich die Markbündel des grofsen Gehirns mit jenen des kleinen. Nämlich je weiter gegen das verlängerte Mark hin, desto mehr

trit auch in der Medulle des Gehirns die Nervenfaserige Bildung hervor, und die Gleichheit und Ununterscheidbarkeit der Substanz verschwindet. So besitzen die Markbündel des grossen Gehirns, oder die Schenkel des verlängerten Markes einen offenbar faserigen Bau: und nachdem sie sich in dem Hirnknoten mit den Markfasernbündeln des kleinen Gehirns verflochten haben, steigen sie in das verlängerte Mark herab. Daher ist hier der Vereinigungsort aller Hirnnerven: nämlich die eigentlich fibrös-nervige Bildung fängt im Gehirne erst hier an.

Das kleine Gehirn aber ist ganz dem grossen gleich- oder nachgebildet. Was die gestreiften Körper für jenes, das ist der gezähnte Körper für das kleine Gehirn. Was dort corpus callosum, Gewölbe u. s. f., ist hier der Lebensbaum. So wie nun der schwielige Körper nur im Gehirne der Säugthiere vorkömmt, so sind wenigstens die Gehirne der Fische und der Amphibien des Lebensbaumes beraubt. Auch hierin ist also die Bildung des kleinen Gehirns jener des grossen vorgeeilt.

§. 607.

Die Verschiedenheit der Gehirnsubstanz begründet in dieser einen Gegensatz der Medulle und der Rinde, welcher die Bildung des grossen und des kleinen Gehirns, jene des Rückenmarks u. s. f. bestimmt. Aber auch in andern Organen, wahrscheinlich in allen Eingeweiden, besteht ein solcher Gegensatz verschiedenartiger Substanzen: z. B. in den Nieren, in der Leber, im Milze. Diese innere

Verſchiedenheit der Gebildung eines Organs beruhet auf der Nothwendigkeit und Unvertilgbarkeit des Gegenſatzes in allem Konkreten. Im Gehirne iſt die Rinde mehr von gangliöſer, die Medulle von nerviger Art: — die gangliöſe Bildung beſteht daher in allen Gehirntheilen noch um ſo mehr und uneingeſchränkter, je mehr ſie graue Subſtanz enthalten. Die gewundene Bildung der Oberfläche des Gehirns iſt eine Folge ſeines urſprünglich unbegränzten, aber in der konkreten Geſtaltung gehemmten Expanſionsſtrebens, da es, auf einen beſtimmten Raum eingeſchränkt, ſich höchſt innerlich zu entfalten beſtrebt iſt. Daher nehmen die Windungen an Anzahl und Tiefe zu mit der Verſtändigkeit der Thiere: — ſie verſchwinden ſchon bey einigen Säugthieren, und am früheſten am hintern Lappen: — auſſer der Claſſe der Säugthiere fehlen ſie gänzlich. — Eine Folge, nicht aber die Urſache der gewundenen Beſchaffenheit des Gehirns iſt die Einſenkung der Gefäſshaut in die dadurch gebildeten Furchen. Indem dieſe Furchen nirgends auf die Medulle, ſondern immer noch auf Rinde treffen, iſt auch überall nur die Rinde von dieſer Seite in unmittelbarer Berührung mit der Gefäſshaut, von daher auch ſelbſt gefäſsreicher, als die mehr rein- nervige Medulle; ſo wie auch die Ganglien ſehr gefäſsreich ſind, und ſo wie die Blutgefäſse etwa auf dieſelbe Weiſe aus den ſie umſtrickenden gefäſshäutigen Netzen in jene gelangen, wie ſie ſich aus der Gefäſshaut des Gehirns in die Rindenſubſtanz ſenken.

§. 608.

Entſchieden bildet ſich der Schädel nach dem Gehirn, ſo wie überall das Niedere durch das Höhere beſtimmt, und gleichſam durch daſſelbe erſchaffen wird. So wie das Auge den beſtimmteſten Einfluſs auf die Bildung der Orbita, und die Lungen auf jene des Thorax haben, ſo ſind auch die beyden Knochenplatten des Schädels eigentlich nur die hart gewordene Haut des Gehirns. Nur iſt dieſs nicht alſo zu verſtehen, als ſey der Schädel ein Stereotyp des Gehirns, und jede Erhabenheit und Vertiefung der Gehirnoberfläche der Glasplatte mechaniſch eingedrückt. Das Gehirn beſtimmt dynamiſch die Bildung des Schädels, und zwar iſt *bey* jeder Thiergattung die Bildung des Schädels um ſo mehr ausſchlieſſend durch jene des Gehirns beſtimmt, je edler ſie iſt. Denn frühzeitig, ſchon in der Claſſe der Säugthiere, greifen die Anhangshöhlen der Sinnesorgane, Stirnhöhlen und andere, immer mehr in die Dyploe ein, und der Parallelismus der Gehirnoberfläche und der äuſſern Oberfläche des Schädels geht immer mehr verloren.

Sogar jeder Gehirnlappen bildet ſeinen eigenen Schädelknochen: der vordere das Stirnbein, der hintere das Hinterhauptsbein, der mittlere wenigſtens zum groſsen Theile das Seitenwandbein: — denn eigentlich ſind nur dieſe drey Schädelknochen; das Schläfebein iſt mehr Gehörknochen, das Keilbein gehört mehreren untergeordneten Organen zugleich an, u. ſ. f. Erſt nachdem jene drey Knochen ihre beſondere Bildung durch die

ihnen entsprechenden Gehirnlappen erhalten haben, vereinigen sie sich unter einander durch Suturen.

§. 609.

Sehr groſs ist die Macht des Einflusses, welchen das Herz mittelst des Impulses des arteriellen Kreislaufes auf das Gehirn ausübt. Von daher rühren die Bewegungen, welche man eben so wohl an dem blosgelegten, als an dem noch mit der harten Hirnhaut bedeckten Gehirne wahrnimmt: und welche nicht mit den Bewegungen der Inspiration und der Exspiration, sondern mit jenen der Systole und Diastole des Herzens zusammentreffen; so zwar, daſs das Gehirn sich erhebt im Momente, wo die Arterien desselben sich erweitern, und eine gröſsere Quantität Blutes aufnehmen, und im Momente, da sie sich verengern, wieder einsinkt. Daſs dessen ohngeachtet das Aufsteigen und das Wiedereinsinken des Gehirns sich scheinbar nach dem Wechsel von Einathmen und Ausathmen richtet, hat seinen Grund in der Uebereinstimmung der Zeitverhältnisse in der Wiederkehre von den Bewegungen des Herzens und jenen des Thorax bey dem Athemholen. Man kann an menschlichen Cadavern jene Bewegungen des Gehirns durch die Einspritzung der Carotiden mit was immer für einer Flüssigkeit nachahmen; man kann sie bey lebenden Thieren durch die Unterbindung beyder Carotiden in hohem Grade vermindern, und durch die Zusammendrückung der aufsteigenden Aorte gänzlich hemmen. Die Stoſserschütterung, welche der Impuls der arteriellen Bluteinströhmung im Gehirne hervorbringt, wird dadurch

möglich, daſs die gröſseren Arterienſtämme mit ihren nächſten Aeſten insgeſamt an der Baſis des Gehirns liegen, ſomit die Aufſchwellung derſelben eine Erhebung des Gehirns zur Folge hat.

XXIX. Kapitel.

Schlaf, Wachen, thieriſcher Magnetismus.

§. 610.

Nur aus dem Weſen der Senſibilität, aus der Eigenthümlichkeit des ſenſibeln Syſtems, und aus deſſen beſonderem Verhältniſſe zu den übrigen Syſtemen des Organismus iſt die Natur des Schlafes im Gegenſatze des Wachens zu erkennen. Auch hat eigentlich nur das Nervenſyſtem einen Schlaf, und die andern Syſteme des Organismus ſchlafen nicht: — oder umgekehrt; nur für das Nervenſyſtem giebt es ein Wachen, und die andern Syſteme liegen in beſtändigem Schlafe. Nicht das ganze Auge ſchläft, nur der Sehnerve, und die Netzhaut in ihm: — der Muskel ſchläft nicht, nur ſein Bewegungsnerve, und daher hört die willkührliche Bewegung auf. Im Schlafe dauert die Verdauung, der Blutumlauf, die Reſpiration, die Einſaugung, die Ernährung, die Abſonderung fort: — ja ſogar einige dieſer Functionen ſind verſtärkt: — die Verdauung geht unter gewiſſen Bedingungen beſſer von ſtatten, der Puls wird voller, langſamer, durch die Reſpiration wird von demſelben Menſchen im Schlafe eine verhältniſsmäſſig gröſsere Quantität von

Sauerſtoffgaſs verzehrt; die Einſaugung iſt an der innern Oberfläche der Schleimhäute, und an der äuſſern Hautoberfläche vermehrt; die Ernährung der Organe und der Stoffwechſel iſt raſcher, mehrere Abſonderungen ſind häufiger. — Auch im Nervenſyſteme iſt zur Zeit des Schlafes keineswegs verminderte Thätigkeit, was ſchon die Gegenwart der Träume beweiſst.

Eigentlich iſt das Pflanzenleben ein beſtändiger Schlaf. Auch in dem Thiere liegen die bloſs vegetirenden Organe, z. B. die Knochen, und andere, in einem beſtändigen Schlummer: nur daſs in manchen krankhaften Zuſtänden, z. B. bey Entzündungen, vorübergehend die Seele des Bewuſstſeyns in ihnen erwachet. — Nur dem Nervenſyſteme kömmt ein eigentliches Wachen zu: und im Zuſtande des Schlafes iſt ſeine Thätigkeit auf dieſelbe Stufe mit jener, die in andern Organen iſt, herabgeſetzt. — Auch iſt der Schlaf früher als das Wachen, z. B. im Leben des menſchlichen Fötus; er iſt noch immer überwiegend im Leben des Kindes; — daher iſt nicht der Schlaf aus dem Wachen, ſondere das Wachen aus dem Schlafe erklärbar. —

§. 611.

Das Verhältniſs zwiſchen Wachen und Schlaf iſt gleich dem Verhältniſs von Licht und Schwere. Nicht zufällig trifft in dem thieriſchen Leben das Wachen mit der Tagezeit zuſammen, und der Schlaf mit der dunkeln Nacht; ſondern was die Nacht iſt im Organismus des Ganzen, das iſt der Schlaf für den beſondern Organismus. Der Wechſel von Schlaf

möglich, daſs die gröſſeren Arterienſtämme mit ihren nächſten Aeſten insgeſamt an der Baſis des Gehirns liegen, ſomit die Auffchwellung derſelben eine Erhebung des Gehirns zur Folge hat.

XXIX. Kapitel.

Schlaf, Wachen, thieriſcher Magnetismus.

§. 610.

Nur aus dem Weſen der Senſibilität, aus der Eigenthümlichkeit des ſenſibeln Syſtems, und aus deſſen beſonderem Verhältniſſe zu den übrigen Syſtemen des Organismus iſt die Natur des Schlafes im Gegenſatze des Wachens zu erkennen. Auch hat eigentlich nur das Nervenſyſtem einen Schlaf, und die andern Syſteme des Organismus ſchlafen nicht: — oder umgekehrt; nur für das Nervenſyſtem giebt es ein Wachen, und die andern Syſteme liegen in beſtändigem Schlafe. Nicht das ganze Auge ſchläft, nur der Sehnerve, und die Netzhaut in ihm: — der Muskel ſchläft nicht, nur ſein Bewegungsnerve, und daher hört die willkührliche Bewegung auf. Im Schlafe dauert die Verdauung, der Blutumlauf, die Reſpiration, die Einſaugung, die Ernährung, die Abſonderung fort: — ja ſogar einige dieſer Functionen ſind verſtärkt: — die Verdauung geht unter gewiſſen Bedingungen beſſer von ſtatten, der Puls wird voller, langſamer, durch die Reſpiration wird von demſelben Menſchen im Schlafe eine verhältniſsmäſſig gröſſere Quantität von

Sauerstoffgaſs verzehrt; die Einſaugung iſt an der innern Oberfläche der Schleimhäute, und an der äuſſern Hautoberfläche vermehrt; die Ernährung der Organe und der Stoffwechſel iſt raſcher, mehrere Abſonderungen ſind häufiger. — Auch im Nervenſyſteme iſt zur Zeit des Schlafes keineswegs verminderte Thätigkeit, was ſchon die Gegenwart der Träume beweiſst.

Eigentlich iſt das Pflanzenleben ein beſtändiger Schlaf. Auch in dem Thiere liegen die bloſs vegetirenden Organe, z. B. die Knochen, und andere, in einem beſtändigen Schlummer: nur daſs in manchen krankhaften Zuſtänden, z. B. bey Entzündungen, vorübergehend die Seele des Bewuſstſeyns in ihnen erwachet. — Nur dem Nervenſyſteme kömmt ein eigentliches Wachen zu: und im Zuſtande des Schlafes iſt ſeine Thätigkeit auf dieſelbe Stufe mit jener, die in andern Organen iſt, herabgeſetzt. — Auch iſt der Schlaf früher als das Wachen, z. B. im Leben des menſchlichen Fötus; er iſt noch immer überwiegend im Leben des Kindes; — daher iſt nicht der Schlaf aus dem Wachen, ſondere das Wachen aus dem Schlafe erklärbar. —

§. 611.

Das Verhältniſs zwiſchen Wachen und Schlaf iſt gleich dem Verhältniſs von Licht und Schwere. Nicht zufällig trifft in dem thieriſchen Leben das Wachen mit der Tagezeit zuſammen, und der Schlaf mit der dunkeln Nacht; ſondern was die Nacht iſt im Organismus des Ganzen, das iſt der Schlaf für den beſondern Organismus. Der Wechſel von Schlaf

und Wachen hat darin seinen Grund, daſs der besondere Organismus gleiche Perioden mit dem Organismus des Ganzen durchläuft.

Die Sensibilität ist die Vollendung des Organismus, und die höchste Blüte des thierischen Lebens: — das Physische aber hat seine Vollendung nicht in sich selbst, sondern in dem Psychischen; — die Sensibilität und das sensible System ist daher nothwendig eine Vermittlung zwischen Physischen und Psychischen: Gehirn und Nervensystem sind für zwey Welten rührbar; sie pflanzen die Anklänge aus der Einen in die andere fort: — in den untern Thieren ist das Nervensystem selbst die Seele dieser Thiere, und von ihrer Naturseele nicht unterschieden. Bey den höheren Thieren, bey welchen sich die Seele über das Nervensystem erhebt, und sich mit Bewuſstseyn diesem entgegensetzt, bleibt das Nervensystem wenigstens das Mittel, wodurch die Seele mit dem Leibe Gemeinschaft pflegt. — Im Schlafe lebt das Nervensystem bloſs ein physisches Leben, gleich den andern Organen: — entweder die Seele ist in ihm noch nicht aufgegangen, oder sie ist von ihm wieder getrennt. Daher hört im Schlafe die Unterordnung der übrigen Organe unter den centrirenden Einfluſs des Gehirns bis zu einem gewissen Grade auf; jedes Organ trit mehr in seiner Eigenthümlichkeit und Besonderheit hervor, und entbehrt dessen, was durch den Nerveneinfluſs und durch die Einwirkung des Gehirns ihm gegeben wird.

Bey dem Einschlafen verläſst die Seele gleichsam theilweise das Nervensystem, und zieht sich nach

und nach in das Innerste zurück. Zuerst hört im Muskelsysteme das nur durch absichtliche Anstrengung erzwungene Gleichgewicht zwischen Flexoren und Extensoren auf, und der Körper fällt, bey dem natürlichen Uebergewichte von Thätigkeit auf der Seite der Flexoren, in einer halben Beugung aller Gelenke nieder. Alsdann schlafen die tieferen Sinne ein, das Gefühl, der Geschmack, der Geruch sind schon unempfindlich, indess die höheren Sinnesorgane, Auge und Ohr noch wachen. Daher ist jeder etwas lebhaftere Eindruck auf die untern Sinne, besonders auf das Gefühlorgan, ein Hinderniss des Einschlafens. Im leisen Schlummer dauert noch einige Afficirbarkeit der höheren Sinnesorgane, besonders des Gehörs, fort; — im tiefen Schlafe geht wenigstens im Gehirne das psychische Leben nicht gänzlich unter: das isolirte Hervortreten desselben im Gehirne ist eben der Traum: im tiefsten Schlafe erlischt alles Bewusstseyn, und mit ihm der Traum.

Der Schlaf ist eine Hingebung des egoistischen Seyns in das allgemeine Leben des Naturgeistes, ein Zusammenfliessen der besonderen Seele des Menschen mit der allgemeinen Naturseele: — in demselben Maasse aber, als jene mit dieser mehr Eines und inniger verbunden wird, in dem Maasse ist sie weniger innig mit dem Leibe verbunden, und dieser, minder beseelt, bleibt in einem todtähnlichen Zustande zurück. Aber von jener Vereinigung der Seele mit dem allgemeinen Naturgeiste kömmt die Erquickung, welche der Schlaf mit sich führt, und das frische kräftige Leben am Morgen.

Im Schlafe ist die Seele nicht vernichtet, nur mit dem Leibe ist sie weniger innig vereint; und die schwache Strahlung, mit welcher noch das psychische Leben das physische durchbricht und sich mit diesem vermischt, giebt den Traum. Jeder Traum ist schon eine Art des Somnambulismus, von dem vorzugsweise sogenannten Somnambulismus nur dem Grade nach verschieden. Es ist ganz falsch, dass die meisten Träume sich noch auf körperliche Affektionen beziehen. Es giebt zwar solche Beziehungen, z. B. in den wohllüstigen Träumen bey nächtlichen Saamenergiessungen; in den Träumen von Wasser, von Quellen, Fontainen bey Wassersüchtigen, von rothen Gegenständen bey den zur Apoplexie geneigten. Aber schon diese Träume beweisen eine Steigerung der Nerven des Gemeingefühles zu Sinnenerven, das Aufgehen eines neuen Sinnes in Nerven, welche sonst keine sensitive Nervenpolarität besitzen: z. B. der Ascitische sieht im Traume das in seiner Bauchhöhle stagnirende Wasser. — Aber es giebt entschieden auch divinatorische Träume, und die Entstehung mancher Traumbilder ist aus den gewöhnlichen Gesetzen der Ideenassociation nicht erklärbar.

§. 612.

Wachen und Schlaf sind nicht die einzigen Zustände des menschlichen Lebens. Es giebt einen dritten, welcher weder Schlaf noch Wachen, sondern das Ansich von beyden, und daher die unmittelbarste Erscheinung des urbildlichen Lebens selbst ist. Ein solcher ist der magnetische Schlaf, welcher

nur ſehr uneigentlich für eine Modification des gewöhnlichen Schlafs gehalten wird. Wenn der Schlaf eine innigere Gemeinſchaft der Seele mit dem allgemeinen Naturgeiſte iſt, eben darum aber eine gröſſere Zurückgezogenheit derſelben von dem Leibe; wenn dagegen im Zuſtande des Wachens die Seele dem Leibe näher und inniger verbunden iſt, aber in demſelben Verhältniſſe ſich auch mehr vereinzelt, und in gröſſerer Abgeſchiedenheit von dem allgemeinen Weltgeiſte fühlt, ſo daſs das Bewuſstſeyn ſelbſt auf ſolcher Trennung beruhet, ſo iſt dagegen im magnetiſchen Schlafe die Seele der Weltſeele und zugleich dem Leibe auf das innigſte verbunden, dem Leibe nicht mehr allein mittelſt des Nervenſyſtems, ſondern in allen Theilen und Gliedern durchaus unmittelbar; ſo daſs das Leben nicht mehr eine Beſonderheit, ſondern das urbildliche Leben ſelbſt iſt. Die Attribute des thieriſchen Magnetismus ſind daher vorzüglich folgende: zwey Individuen in Rapport geſetzt, d. h. in die innigſte Gemeinſchaft von Thätigkeit, ſo daſs Eine Seele in beyden iſt, und indem nur das Weſentliche beſteht, alles Zufällige, was ſie trennt und ſcheidet, aufgehoben wird. Hiebey zeigt ſich nun freylich auf der Einen Seite ein aktiver, und auf der andern ein paſſiver Rapport: der Magnetiſeur iſt gebend, die Magnetiſirte empfangend. Aber dieſs Verhältniſs kann auch ſogleich umgekehrt werden, und die Somnambüle den Magnetiſeur magnetiſiren. Eben ſo iſt der thieriſche Magnetismus nicht das Produkt der Einwirkung des Einen Individuums auf das andere, z. B. durch Manipulation; — ſon-

dern damit eine ſolche Einwirkung möglich ſey, muſs ſchon der Magnetismus beſtehen. — Die erſte Erſcheinung deſſelben iſt ein beſonderes Wohlbehagen, und Beruhigung der unangenehmen körperlichen Empfindungen: — nämlich die Anregung des wahrhaft poſitiven Gefühls der Exiſtenz, und Befreyung von (rein negativer) Affection. Im höhern Grade geht dieſe Beruhigung, d. h. das Auslöſchen des rein negativen im Bewuſstſeyn, und zuletzt des Bewuſstſeyns ſelbſt, — in Betäubung und tiefen Schlaf über. Magnetiſiren heiſst daher rein Poſitives an einen Andern übertragen, und Negatives in ihm vernichten. — Je vollſtändiger aber die Aufhebung des Negativen in der Magnetiſirten iſt, deſto eher erwacht das eigentlich poſitive in ihr, was in uns allen, indeſs wir zu wachen glauben, im tiefſten Schlafe liegt, und nur in der poetiſchen Begeiſterung, in wahrhaft philoſophiſcher Anſchauung eine ſchwache Lebensregung erhält. Das zweyte Attribut des thieriſchen Magnetismus iſt die Klarheit des Innern, und die totale Vermiſchung der Seele und des Leibes. Unmittelbar, nachdem dieſe Stuffe erreicht iſt, hören alle Gegenſätze, mit jenem der Seele und des Leibes, auf: — und zugleich jede Bedingung und Beengung der Erkenntniſs, welche nur von der beſtimmten Vereinigung unſerer Seele mit unſerem Leibe, und ſomit von der Anordnung der Sinne &c. herſtammt. Jede Erkenntniſs iſt nun ein unmittelbares Empfinden. Die Somnambüle ſchaut alle Theile ihres Leibes, wie mit leiblichen Augen; — eben ſo ſieht der Nachtwandler, bey welchem der Somnambulismus

nur auf andere Weiſe entſtanden iſt, mit geſchloſſenen Augen, und ſicher nicht durch die Augenlieder hindurch. — Auf dem höchſten Gipfel kömmt es zur Clairvoyence, und Zeit und Raum, welche nur Bedingungen unſerer Sinneerkenntniſs bey dieſer unſerer beſchränkten Sinnlichkeit ſind, engen die Erkenntniſs der Hellſehenden weiter nicht ein. Nun wird auch der Rapport mit dem Magnetiſeur inniger. Die Hellſehende ſieht in dieſem ſo gut als in ſich ſelbſt hinein; aber eben um der Unbeſtimmtheit und Schrankenloſigkeit des Zuſtandes willen, iſt es, wie Tardi bemerkt, nothwendig, durch öftere Fragen den Blick der Hellſehenden auf das Einzelne zu fixiren. — Der thieriſche Magnetismus hat nur dieſe zwey Stufen, die erſte der Beruhigung, die zweyte des Hellſehens, — und eine dritte, bey welcher alles Licht und Klarheit, und die Luſt der Magnetiſirten reine Seeligkeit iſt.

Es iſt für ſich ſelbſt einleuchtend, daſs aus dem magnetiſchen Schlafe in das Wachen herüber, in den bewuſsten Zuſtand aus jenem über alles Bewuſstſeyn erhabenen, auch nicht die leiſeſte Erinnerung ſich verbreiten könne: — eben ſo daſs der Uebergang vom Wachen in den magnetiſchen Schlaf, und das Erwachen aus dieſem nicht allmählich, ſondern plötzlich und ohne leiſen Uebergang ſeyn müſſe.

Anmerk. So viele Charletanerie und Betrügerei in Rückſicht des thieriſchen Magnetismus ehehin obwaltete, und auch wohl noch obwaltet; ſo gewiſs und hinreichend conſtatirt iſt doch das Phönomen ſelbſt, und von ſo wichtigem Einfluſſe iſt dieſer Gegenſtand für die geſamte Naturwiſſenſchaft.

Lebensfunctionen.

Classe II.

Lebensfunctionen der Gattung.

XXX. Kapitel.

Zeugung.

§. 613.

So herrlich die Besonderheit in den Dingen ist, wenn sie, durch die Urbilder derselben in ihnen gewirkt, als eine wahrhafte Individualität besteht; so fällt dennoch alles Besondere wieder dem Tode und der Verwandlung anheim; indem der in den Dingen allein thätige, lebendige Begriff sich als Gattung über sie erhebt, und, um seine Unsterblichkeit zu erhalten, sich von jenen, als vergänglichen, absondert. Ja den endlichen Dingen ist nicht bloss ein egoistischer Trieb der Selbsterhaltung, sondern auch ein Streben, sich in ihrer Besonderheit zu vernichten, eingebohren; und ihre Trefflichkeit ist eben diese, dass sie nichts für sich gelten, sondern nur Abbilder ihrer Ideen seyn wollen, und daher mit Lust und Sehnsucht dem Tode ihres vergänglichen Antheils entgegen gehen. Einer aber ist der herrlichste Lebensmoment jedes Dinges, da der in ihm wirksame unsterbliche Begriff sich ganz mit sei-

nem besondern Seyn vermischt; dieser ist, da in dem Individuum ganz und uneingeschränkt die Gattung lebendig wird, und jenes sich ein gleiches erschafft. Darauf aber folgt der Tod oder ein dem Tode ähnlicher Zustand von Entkräftung und Abstumpfung. — Die Welt ist noch nicht auserschaffen: jede Zeugung ist eine neue Schöpfung.

§. 614.

Wie aber das Erzeugende selbst wahrhaft erschaffend ist; so ist auch die Natur, als der lebendige Inbegriff alles Seyn's, in ihrer ewig schaffenden Urkraft, stets erzeugend, und alles aus sich gebährend. Diess ist die Bedeutung der alten Lehre von der Panspermie, nach welcher die erzeugende, hervorbringende und bildende Kraft als ein gemeinsames Eigenthum der ganzen Natur, nur nicht der todten, sondern der in sich selbst höchst lebenskräftigen, betrachtet wurde. Die lauterste und eben darum auch erste Offenbarung jener alles hervorbringenden Urkraft ist die freywillige Erzeugung (generatio aequivoca), welche von der Erzeugung durch die Concurrenz der Geschlechter im Wesentlichen nicht verschieden, und ihr nur der Art nach entgegengesetzt ist. Nichts Organisches kann untergehen. Mit welchem einmal das Leben sich vermischt hat, in solchem ist es unvertilgbar; und zerfällt die bestimmte Form seines Lebens, so ist jedes Element desselben ein neu Belebtes für sich. Diess ist das Gesetz der Entstehung der Infusorien aus faulenden animalischen und vegetabilischen Substan-

wohne, und von ihm erkannt werde. Die Seele ist nicht das Vermögen, solches zu erkennen, sondern sie ist dessen lebenbige Erkenntniss.

Alle physiologische Probleme haben nur Eine Lösung: — die Frage ist überall diese: wie die Seele auf den Körper wirke, und wie dieser auf die Seele wirke. Denn ist keine Harmonie zwischen beyden prästabilirt, so ist es unmöglich, einzusehen, wie die Affection des Sinnesnerven zur Anschauung, wie der Gedanke zum Wort, und wie die Vorstellung zur Bewegung werde. Denn dem Wort ist sein Geist, seine Bedeutung nicht etwa äusserlich beygegeben, jenes ist nicht das Vehikel des Gedankens, sondern es ist der ausgesprochene Gedanke selbst: so wie in dem plastischen Kunstwerk die Idee nicht etwa über den Stein ausgegossen ist, sondern ihn durchdringt, und eine Einheit mit ihm erzeugt, welche sich als Schönheit der Form darstellt. — Das eigentlich Menschliche in dem Leben ist nun gerade dieses, dass ein beständiger Umtausch zwischen physischen und psychischen geschehe; dass in jedem Augenblick das Eine das Andere werde; wodurch sich die Einheit der Substanz und des durchaus gleichen Grundes in beyden offenbart.

§. 599.

Nämlich die Art und Weise, wie die Seele mit dem Gehirn verbunden ist, und desselben als des Organes ihrer Manifestation sich bedient, ist die nämliche, auf welche die Idee in dem Kunstwerke lebt, und diesem verbunden ist. So wie das ganze

Weſen der Idee in das Material des Kunſtwerkes aufgenommen, und in dieſem durch die Schönheit der Form abgedrückt iſt, ſo wie die Form an und für ſich todt, nur durch die Idee, deren Ausdruck ſie iſt, Leben und Schönheit hat; auf ſolche Weiſe iſt das vollkommenſte und edelſte Gebilde des Leibes, das Gehirn, — die Baſis, mit welcher ſich die Seele als begeiſtendes Princip verbindet, d. h. in welchem ſie ſich ſelbſt erſchafft, und ihr Streben hervorbringt. Das Gehirn iſt daher Organ der Seele, nur wie das Niedere überhaupt Bedingung der Manifeſtation des Höhern iſt, nicht indem es als ſolches beſteht, und dieſes aufnimmt, ſondern indem es von ihm überwältigt, und, in ſeiner Unweſentlichkeit aufgehoben, zur Identität mit ihm ſelbſt gebildet, und erhoben wird. Daher iſt das Gehirn ein Plasma der Seele, ganz ihre Schöpfung, ihr Werk; und jede Form des Hirns und ſeiner Theile iſt ein plaſtiſcher Ausdruck einer beſondern Seelenthätigkeit.

§. 600.

Die Seele iſt Nichts als Wahrheit, Güte und Schönheit. Dieſe ſind die Elemente ihres Lebens. Sie erkennt nicht das Wahre, ſie will nicht das Gute: — ſie iſt ſelbſt eine lebendige Erkenntniſs des Wahren, ein Wollen des Guten; ſie iſt nicht ſchön gleich den körperlichen Dingen, ſondern ſie iſt die Schönheit ſelbſt. Es giebt daher nicht nur eine Erkenntniſs, in welcher das Erkennende und das Erkannte Einig und ewig verbunden ſind, ſondern jede wahre Erkenntniſs iſt eine ſolche. Es

wohne, und von ihm erkannt werde. Die Seele ist nicht das Vermögen, solches zu erkennen, sondern sie ist dessen lebenbige Erkenntniss.

Alle physiologische Probleme haben nur Eine Lösung: — die Frage ist überall diese: wie die Seele auf den Körper wirke, und wie dieser auf die Seele wirke. Denn ist keine Harmonie zwischen beyden prästabilirt, so ist es unmöglich, einzusehen, wie die Affection des Sinnesnerven zur Anschauung, wie der Gedanke zum Wort, und wie die Vorstellung zur Bewegung werde. Denn dem Wort ist sein Geist, seine Bedeutung nicht etwa äusserlich beygegeben, jenes ist nicht das Vehikel des Gedankens, sondern es ist der ausgesprochene Gedanke selbst: so wie in dem plastischen Kunstwerk die Idee nicht etwa über den Stein ausgegossen ist, sondern ihn durchdringt, und eine Einheit mit ihm erzeugt, welche sich als Schönheit der Form darstellt. — Das eigentlich Menschliche in dem Leben ist nun gerade dieses, dass ein beständiger Umtausch zwischen physischen und psychischen geschehe; dass in jedem Augenblick das Eine das Andere werde; wodurch sich die Einheit der Substanz und des durchaus gleichen Grundes in beyden offenbart.

§. 599.

Nämlich die Art und Weise, wie die Seele mit dem Gehirn verbunden ist, und desselben als des Organes ihrer Manifestation sich bedient, ist die nämliche, auf welche die Idee in dem Kunstwerke lebt, und diesem verbunden ist. So wie das ganze

Wesen der Idee in das Material des Kunstwerkes aufgenommen, und in diesem durch die Schönheit der Form abgedrückt ist, so wie die Form an und für sich todt, nur durch die Idee, deren Ausdruck sie ist, Leben und Schönheit hat; auf solche Weise ist das vollkommenste und edelste Gebilde des Leibes, das Gehirn, — die Basis, mit welcher sich die Seele als begeistendes Princip verbindet, d. h. in welchem sie sich selbst erschafft, und ihr Streben hervorbringt. Das Gehirn ist daher Organ der Seele, nur wie das Niedere überhaupt Bedingung der Manifestation des Höhern ist, nicht indem es als solches besteht, und dieses aufnimmt, sondern indem es von ihm überwältigt, und, in seiner Unwesentlichkeit aufgehoben, zur Identität mit ihm selbst gebildet, und erhoben wird. Daher ist das Gehirn ein Plasma der Seele, ganz ihre Schöpfung, ihr Werk; und jede Form des Hirns und seiner Theile ist ein plastischer Ausdruck einer besondern Seelenthätigkeit.

§. 600.

Die Seele ist Nichts als Wahrheit, Güte und Schönheit. Diese sind die Elemente ihres Lebens. Sie erkennt nicht das Wahre, sie will nicht das Gute: — sie ist selbst eine lebendige Erkenntniss des Wahren, ein Wollen des Guten; sie ist nicht schön gleich den körperlichen Dingen, sondern sie ist die Schönheit selbst. Es giebt daher nicht nur eine Erkenntniss, in welcher das Erkennende und das Erkannte Einig und ewig verbunden sind, sondern jede wahre Erkenntniss ist eine solche. Es

ſtert wird, ſo daſs die Thränen, welche ſich nicht mit ihm vermiſchen, nicht über die Wangen herabfließsen können. Die Thränen werden im innern Augenwinkel von den Thränenpunkten eingeſogen. Dieſe ſind die abſorbirenden Mündungen der Thränenröhrchen, zweyer gefäſsartiger Kanäle, welche die Thränen in den Thränenſack führen. Im Zuſtande von vermehrter Thätigkeit gerathen die Papillen der Thränenpunkte in eine Art von Erection, ſie erheben ſich, und ziehen ſich wechſelweiſe wieder in ſich zurück, ſo daſs ihr Längendurchmeſſer hiebey ſehr verändert wird; die Contractilität der Thränenpunkte iſt ſehr groſs, wie man ſich durch das Einſchrumpfen ihrer Papillen bey der Berührung mit einer Sonde überzeugen kann.

Die beiden Thränenröhrchen vereinigen ſich in einen gemeinſchaftlichen Kanal, und dieſer inſerirt ſich in den Thränenſack, einige Linien unterhalb der obern Extremität deſſelben, ſo daſs ſein Grund als blinder Sack zurück bleibt. Die Thränen gelangen auf dieſe Weiſe allmählig in den Thränenſack, ſchon vorher mit dem Talge der Maibomſchen Drüſen gemengt, und durch die Einwirkung des atmoſpäriſchen Sauerſtoffgaſses im geringern Grade oxydirt, werden ſie als eine ſchon urſprünglich etwas mucöſe Flüſſigkeit durch die Zumiſchung des von der Schleimhaut des Thränenſackes abgeſonderten Schleimes, dem Naſenſchleime verähnlicht, und nicht periodiſch, ſondern ſtetig, und in kleiner Quantität, durch den häutigen Naſenkanal in der Naſenhöhle entleert. Dieſe Fort-

leitung wird sehr durch die Richtung der schief von oben nach unten herabsteigenden untern Portion des Thränensackes, und des häutigen Nasencanals, durch dessen progressive Verengerung, durch die eigne Schwere der mit Schleim gemischten Thränenfeuchtigkeit, und durch die mitgetheilte Bewegung des Schliessmuskels der Augenlieder, der bey seiner Zusammenziehung auf das obere blinde Ende des Thränensackes aufdrückt, befördert. Sie steht übrigens unter dem allgemeinen Gesetze der Gefäsebewegung, nach welchem die Fortleitung jeder Flüssigkeit in einem organischen Canale geschieht. Gewiss ist es, dass es in den Wandungen des Thränensackes keine Muskelfasern, keine peristaltische Bewegung, an seinem Ausgangsloche keinen Schliessmuskel giebt; Annahmen, die lediglich dazu dienten, um die richtige Ansicht von den Krankheiten dieser Parthie des Thränenorganes zu verwirren. —

§. 591.

Der Augapfel selbst ist eine konkrete Darstellung des höchst - potenzirten Gegensatzes zwischen der Nerven - und Gefässbildung in der Unterordnung der letzten unter die erste, — und da beyde der vollkommenste Ausdruck, die Nervenbildung der unendlichen Einheit der Dinge, und die Gefässbildung der selbstischen Einheit sind, — so ist im Auge die höchste Entzweyung des Irdischen und des Sonnigen, und die vollkommenste Unterordnung des ersten unter das zweyte. — Unter den Augenhäuten bildet die Nervenhaut die innerste, über die andern herrschende Schichtung. Sie wird

von der gefäſshäutigen Schichtung umgeben, welche in Oppoſition gegen die erſte iſt. Auf dieſe folgt die ſibröshäutige, — zuletzt geht mittelſt der Bindehaut (ein Gebilde, welches zwiſchen der ſchleimhäutigen und der ſeröshäutigen Formation mitten inne ſteht) die Bildung des Augapfels wieder in die allgemeine Hautbildung über.

Die äuſſere, oder erſte Schichtung enthält offenbar Häute, welche nur von den Nerven losgetrennt ſind, ſo daſs nun die Gefäſshaut zwiſchen die Nervenhaut und die Scheidenhaut der Nerven aufgenommen wird. Indem aber die ganze individuelle Bildung des Augapfels zunächſt von dem Sehnerven beherrſcht wird, iſt auch die Scheidenhaut des Sehnerven zunächſt Scheidenhaut des Augapfels. Je weniger vollkommen die Bildung des Auges iſt, um ſo unabhängiger, und verſchiedener iſt die Bildung der Sclerotica von jener der Scheidenhaut des Sehnerven. So iſt ſie bey den Fiſchen knorplich. Bey den Vögeln entfernen ſich nach vorne ihre beyden Lamellen von einander, und nehmen einen Knochenring zwiſchen ſich auf. In dem vollkommnen Auge aber iſt ſie immer mehr jener Scheidenhaut aſſimilirt. Es iſt unnöthig, auf den Unterſchied der Behauptung, die Sclerotica ſey jener tunica vaginalis gleichgebildet, von einer frühern Behauptung, ſie ſey eine Fortſetzung derſelben, aufmerkſam zu machen, obgleich nicht geläugnet werden kann, daſs das innere Blatt jener Scheidenhaut ſich wirklich in die Sclerotica fortſetze, welche übrigens nach vorne auch durch die ſehnigen Ausbreitungen der Augenmuskeln verſtärkt wird, und in welcher alſo

verschiedene, aber immer fibröshäutige Bildungen in einander fliessen. Schon die Sclerotica ist dem Lichte nicht ganz undurchsichtig, besonders bey Kindern, bey welchen sie sehr dünne ist, und daher die Chorioidea blaulich hindurch scheinen läſst. Nach vornen aber ist die Sclerotica zur vollkommenen Identität mit dem Lichte gebildet, und daher vollkommen durchsichtig; hier entsteht die Hornhaut, in der die Identität mit dem Lichte durch die Aufhebung der Cohäsion dieser Membran, und durch das Zerfallen derselben in eine lamellöse Bildung, ausgedrückt ist. Die Cohäsion der Hornhautlamellen unter sich nimmt ab in directem Verhältniſs der Progression von ihren Rändern zur gröſsten Convexität, und in der Progression von den äussern Schichten gegen die innern. Die Cornea ist zwar keine Fortsetzung der Sclerotica, sondern sie ist in diese eingefalzt und hat eine deutlich - unterscheidbare Grenze gegen dieselbe hin. Denn es ist ein Bildungsgesetz des Augapfels, welches in dem Gegensatze seiner beyden Hemisphären der vordern und der hintern gegründet ist, — daſs keine Haut, welche von der hintern Hemisphäre desselben entstehet, auch seine vordere Fläche schliesse. So entsteht die Hornhaut an der Grenze der Sclerotica, — so die Iris an der Grenze der Chorioidea, — so die Zonula ciliaris an der Grenze der Retina. — Auch ist die Hornhaut das Segment einer ganz andern, nämlich einer ungleich gröſsern Kugel als die Sclerotica, und folglich ist die Convexität derselben gröſser. Aber die Hornhaut ist doch nur die höchste Metamorphose der fibrösen Haut, ihre Verklärung zur

Durchſichtigkeit. In den früheſten Bildungsperioden des Auges iſt ſie von der Sclerotica nicht unterſchieden: — bey dem annulus ſenilis am Rande der Hornhaut, und bey der Verwachſung ihrer Lamellen, welche zuweilen unaufhaltſam von ihrem Rande gegen die gröſste Convexität derſelben fortſchreitet, verwandelt ſie ſich wieder durch regreſſive Metamorphoſe in eine der Sclerotica ähnliche Bildung.

§. 592.

Die Chorioidea iſt das eigentlich irdiſche im Auge, das antithetiſche des Lichtes, das allein nicht klare, dem Lichte nicht aſſimilirte! Als Gefäſshaut iſt ſie ganz im Gegenſatze gebildet. Ihre äuſſere Oberfläche zeigt Polarität gegen die innere, und es giebt ſomit eine Ruiſchiana: nämlich die Gefäſshaut zerfällt überall mehr oder weniger deutlich in zwey Schichten. Ihre vordere Seite iſt im Gegenſatz der hintern gebildet, und unterſcheidet ſich von dieſer ſehr beſtimmt durch die dunklere, ſchwärzere Farbe. Beyde Seiten der Chorioidea, die vordere und die hintere, verhalten ſich wie venöſes und arterielles. Daſſelbe Verhältniſs waltet zwiſchen der äuſſern, noch mehr arteriellen, und der innern, mehr venöſen, Oberfläche ob. Denn an der innern Oberfläche geht die Verzweigung der Gefäſse ſo weit und in's Kleinſte fort, und gleichzeitig nimmt die Verkohlung des Blutes in dem Grade zu, daſs es hier zur Bildung des ſchwarzen Pigmentes kömmt. Denn dieſs iſt kein extravaſirter

ter

ter colorirender Stoff, sondern die höchste Entwicklung des Capillargefäſssystems der Chorioidea, in welchem, so wie in jedem Capillargefäſssystem, die venöse Gefäſspolarität über die arterielle, bey der ursprünglichen Indifferenz beyder, relativ vorherrschend ist. Das schwarze Pigment, als die höchste Metamorphose der Gefäſshaut des Auges, strebt nun das Licht auszulöschen, und ein groſser Theil der in die hintere Augenkammer einfallenden Lichtstrahlen wird von ihm absorbirt. Dagegen fehlt im Auge der minder irritabeln Thiere, der Wiederkäuer, das Pigment, die Metamorphose der Gefäſshaut ist gehemmt, die Entwicklung ihres Capillargefäſssystems und die Verkohlung des Blutes in diesem ist mehr beschränkt; daher entsteht der schillernde Glanz, das Tapetum, welches in die verschiedensten Farben spielt. Die Chorioidea ist nicht bloſs Gefäſshaut, so wie die Retina nicht allein Nervenhaut ist. In der Chorioidea wiederholt sich der Gegensatz zwischen Nervenbildung und Gefäſsbildung durch den Gegensatz der Ciliarnerven und der Ciliargefäſse. An der vordern Seite der Iris erreicht diese Antithesis einen höhern Grad von Spannung als an der hintern. Daher treten die meisten Ciliarnerven und Ciliargefäſse erst an der Grenze der vordern Hemisphäre in den Bulbus ein. Das Ciliarnervensystem bildet überhaupt einen Gegensatz gegen den optischen Nerven. So wie in diesem die Sensibilität als solche, als sensitive Kraft, hervortrit, so ist sie durch jene in das irritable System aufgenommen: und der optische Nerve ver-

hält ſich zu den Ciliarnerven wie ſenſitive zu den motiven Nerven. Das Verhältniſs beyder zu einander iſt aber das umgekehrte der Centralarterie und der Ciliargefäſse. Jene iſt, wenigſtens für ihren beträchtlichſten Theil, Arterie der Nervenhaut, und bildet in ihr die vaſculöſe Membran: — dieſe ſind die Nerven der Gefäſshaut. Die Identität der Ciliarnerven enthält der Ciliarknoten: aus dieſem ſtrahlen, als aus ihrem Gehirne, bey dem Säugthiere vielzählich die Ciliarnerven hervor. Im Vogelauge iſt es nur Ein Strang, gleichſam ein Rückenmark, in welchem die Ciliarnerven von dem Knoten an bis zu ihrem Eintrit in den Bulbus vereint liegen. Ueberall aber ſtrahlen ſie während ihres Verlaufes zwiſchen Chorioidea und Sclerotica in divergirender Richtung an der hintern Augenhemiſphäre, in convergirender an der vordern. Sie ſind gangliöſe Nerven, gehören mit allen andern zu Einem Syſteme: und durch ſie leiden die Gefäſshäute des Auges bey Unterleibskrankheiten, welche gangliöſe Nevralgien ſind. Die gangliöſen Nerven bilden ſonſt überall Plexus um die Gefäſse, ſind ſelbſt Gefäſsnerven, von den Gefäſsen übermächtiget. Aber im Ciliarſyſteme bleiben die Nerven in Oppoſition mit den Gefäſsen. Alſo bildet ſich der Ciliarkörper mit ſeinen Strahlenfortſätzen, welcher die höchſte Vollendung der Chorioidea als Gefäſshaut iſt. Nämlich die Gefäſse derſelben ſenken ſich nach vorne gegen die Achſe des Bulbus herein, indem ſie ſich von der Sclerotica entfernen: — ihre Verzweigung geht in das feinſte: und da hier die Chorioidea ihre höchſte Expanſion erreicht, und

dennoch in einen kleinern Raum zurückgedrängt ist, wird sie nothwendig gefaltet. Mittelst dieser Falten, der Ciliarfortsätze, liegt die Gefäſshaut der Linse, der eigentlichen Centralbildung im Auge, an, — und gelangt mit ihr zu organischer Gemeinschaft. Aber in dem Ciliarkörper liegt der Keim einer neuen Entfaltung. Das Strahlenband ist die Erhebung der Ciliarnerven und der Ciliargefäſse in ihrer wechselseitigen Durchdringung — zu einer höhern Potenz. So kömmt es zur Bildung der Iris, in welcher, da die Farbe überhaupt die Verirdischung des Lichtes anzeigt, der gröſste Reichthum und das mannichfaltigste Farbenspiel ist. Die Farbe der Iris rührt, da sie ein durchsichtiges Häutchen ist, von dem an ihrer hintern Oberfläche aufgetragenen Pigmente her. Sie ist niemals blau und niemals schwarz, sondern ihr Farbenspiel fällt zwischen braun und grau. Die dunklere Färbung der Iris ist ein Zeichen der im Auge vorherrschenden Irritabilität, da das sanftere blaue Auge mehr sensibel ist. In der Iris reproduciren sich alle Gegensätze der Chorioidea durch die Verschiedenheit ihrer beyden Kreise, des äussern Ringes und des innern, durch den Gegensatz ihres Pupillarrandes, und ihres Randes am Strahlenbande, — zuletzt durch den Gegensatz ihrer beyden Oberflächen, der Traubenhaut und der eigentlichen Regenbogenhaut. Sie ist die höchste Metamorphose des irritabeln Gebildes im Auge, und daher bey den höchst irritabeln Thieren, den Vögeln, selbst willkürlich beweglich: — wenigstens treffen die Bewegungen derselben mit

jenen der Augenlieder zusammen, ohne von der durch diese bewirkten grössern oder geringern Beschattung des Auges abhängig zu seyn. Bey dem Menschen und bey den Säugthieren sind die Bewegungen der Iris von dem Lichte abhängig, welches in das Auge fällt. Aber die Iris wird nicht vom Licht gerührt, wenn diess unmittelbar ihre vordere Fläche und nicht zugleich die Netzhaut trift. Daher ist die Iris in der Regel steif und unbeweglich bey der Amaurose; wenn diese nur auf Einem Auge statt findet, und das andere gesund ist, hängen die Bewegungen der Regenbogenhaut mehr von der Beleuchtung des gesunden als von jener des kranken Auges ab. Man kann bey jedem Menschen, besonders aber bey amblyopischen, das stärkere Auge von dem schwächern dadurch unterscheiden, dass die Beleuchtung oder Beschattung des stärkern Auges die Bewegungen der Iris auf dem schwächern Auge mehr bestimmt als umgekehrt. — Gewiss also ist die Verengerung der Pupille im heftigern Lichte nicht die Folge einer dadurch bewirkten Congestion und der Turgescenz der Blutgefäfse der Iris: — sondern das Ciliarnervensystem ist das Mittelglied, wodurch das Licht auf die Regenbogenhaut einwirkt. Aber auch kein Theil jenes Nervensystems, weder die Ciliarnerven selbst, noch der Ciliarkörper, — noch der Ciliarknoten werden von den Lichtstrahlen unmittelbar getroffen. Ohne alle Probabilität ist die Hypothese, dass die Lichtstrahlen das Loch der Retina, als eine zweyte Pupille, durchgehen, und unmittelbar auf den linsenförmigen Knoten treffen. Auch das Ciliarner-

venſyſtem wird von den Lichtſtrahlen nur mittelbar, — vermöge ſeines Gegenſatzes gegen den Sehnerven und die Netzhaut — afficirt. Bey der Geſchwindigkeit der Leitung im Nervenſyſteme kann die raſche Aufeinanderfolge der Einwirkung der Lichtſtrahlen auf die Netzhaut und der beynahe ſimultanen Verengerung der Pupille — keine Schwierigkeit ſeyn.

§. 593.

Die Iris hat ein eigenes Leben, welches die Verklärung des eigenthümlichen Lebens der Gefäſshäute des Auges überhaupt iſt. Die Gefäſshaut aber iſt in dem Bulbus das dem Lichte widerſtreitende, ihm nicht aſſimilirbare, undurchſichtige, das Licht mittelſt des Pygmentes auszulöſchen beſtrebte. Die Regenbogenhaut iſt eine Oppoſition gegen das Licht: — und ſo wie die Pupille urſprünglich geſchloſſen, oder vielmehr gar nicht vorhanden iſt, bey dem menſchlichen Fötus und im Inſektenauge, ſo hat die Iris das Beſtreben, ſich wieder zu ergänzen, die Continuität herzuſtellen, und in den Zuſtand ihrer urſprünglichen Bildung zurück zu kehren; ſomit dem Lichte den Eingang in das innere Auge zu wehren. Daher verengert ſich die Pupille um ſo mehr, je heftiger das Licht iſt, welches nicht die vordere Fläche der Regenbogenhaut, ſondern welches den Pupillarrand der Iris trift. Sie erweitert ſich dagegen im Verhältniſs der Beſchattung des Auges. Das Licht fodert alſo nicht als ein äuſſerer Reitz weder mittelbar noch unmittelbar die Bewegungen der Iris; ſondern es iſt die Hetero-

genität und die Unbezwingbarkeit der Gefäſshäute des Auges durch das Licht, wodurch die Iris diesem die Pupille zu ſchlieſſen trachtet. Es iſt alſo die entgegengeſetzte Natur der Netzhaut und der Gefäſshäute des Auges, des Sehnerven und des Ciliarnervenſyſtems, wodurch die Bewegungen der Iris beſtimmt werden. Dieſe geſchehen in doppelter Richtung, — die Iris hat eine expanſive und eine contractive Thätigkeit, gleich den Sphincteren: allerdings trift der Verengerungszuſtand der Pupille mit der expanſiven Thätigkeit der Iris zuſammen, und der Erweiterungszuſtand der Pupille mit der contractiven Thätigkeit der Iris; nur iſt dieſe nicht minder thätig (nicht erſchlafft) im Expanſionszuſtande als im Contractionszuſtande. Was daher die Expanſion überwiegend hervorruft im Auge, das bringt eine Verengerung der Pupille, zuletzt Schlieſſung derſelben; was die Contraction hervorruft, das bringt Erweiterung der Pupille, zuletzt Mydriaſis hervor. Daher fordert das Licht, welches gleich iſt der unendlichen Expanſion der abſoluten Subſtanz, eine Verengerung der Pupille. Die äuſſern Influenzen, welche eine Veränderung der Dimenſionen der Pupille veranlaſſen, z. B. eine Erweiterung derſelben, thun dieſs mittelbar oder unmittelbar. Die Pupille erweitert ſich, wenn die Iris unmittelbar zur Contraction ſollicitirt wird, z. B. durch den Contact der austretenden Staarlinse. Aber ſie erweitert ſich auch in allen Zuſtänden von deprimirter Senſibilität bey der Apoplexie, Epilepſie, bey einigen Gattungen der Amauroſe, nach der Wirkung narcotiſcher Mittel, welche die Senſibilität herab-

ſtimmen. Denn ſie verengert ſich nur im Conflicte des äuſſern und des innern vom Sehnerven und der Netzhaut ausſtrahlenden Lichtes: und da wo jene Quelle des Lichtes im Auge verſiegt iſt, — da iſt es eben ſo viel, als wäre das äuſſere Licht hinweggenommen.

Aus dieſem eigenthümlichen, und in der Natur der Gefäſshäute des Auges gegründeten, ſpontanen Streben der Regenbogenhaut, die Pupille zu ſchlieſſen, — erklärt ſich bey den Säugthieren die horizontalovale Pupille der Wiederkäuer, der einhufigen Thiere u. a., und die ſenkrechtſtehende Pupille im Katzengeſchlecht. Beyde Pupillen ſind ſchon zur Hälfte geſchloſſen, nur in ſich entgegengeſetzten Richtungen. Die Katzenpupille hat keine Breite mehr, und die Pupille der Wiederkäuer keine Länge. Eine Dimenſion iſt überall ſchon vernichtet. Die runde, oder der Rundung ſich annähernde Pupille des Menſchen und der Menſchen ähnlichen Thiere entſteht aus der Multiplication jener ſich entgegengeſetzten Formen durch einander. Unter den Säugthieren repräſentiren nicht, wie Kieſer will, die einhufigen Thiere und die mit geſpaltenen Hufen, welche die horizontaloblonge Pupille beſitzen, das ſenſible Geſchlecht: nichts berechtigt zu einer ſolchen Annahme. Die Senſibilitätsthiere unter den Säugthieren ſind entſchieden die Quadrumanen, die am meiſten Menſchen ähnlichen: — die Reproductionsthiere ſind die Wiederkäuer und die an ſie zunächſt angereiheten; — die Irritabilitätsthiere unter ihnen aber ſind die Katzenartigen, die Raubthiere. Nur bey den Senſibilitätsthieren iſt die Pupille gerundet und kreiſig: aber da, wo eine der

niedern Dimensionen, wenn auch nur comparativ, vorherrschend wird, bey den irritabeln Katzenähnlichen, bey den animalibus nocturnis, — und von der andern Seite, bey den reproductiven Wiederkäuern, bey den animalibus diurnis, ist das Gleichgewicht der Dimensionen aufgehoben, und die Pupille strebt sich zu schliessen.

Bey den irritabeln Katzenähnlichen Säugthieren erscheint auch wieder eine Spur von willkührlicher Bewegung der Iris: — so wie sich umgekehrt bey einigen der irritabelsten Geschlechter aus der Classe der Vögel die verticalovale Pupille wiederfindet. Bey den Wiederkäuern und bey den Thieren mit ungespaltener Hufe sind die Traubenfortsätze, welche sich in die Pupille hereinsenken, nur Ausdruck des Strebens, die Pupille zu schliessen, und die Continuität der Iris wieder herzustellen; daher sind sie um so mehr entwickelt, je weniger der obere und der untere Rand der Iris in die Pupille hervorragt. Vergleichbar den Traubenfortsätzen ist der Substanzenwucher am Pupillarrande der Iris im menschlichen Auge, die fungösen, oft condylomatösen Auswüchse, welche zuweilen bey der Entzündung der Regenbogenhaut entstehen, und mittelst derer die Pupille sich ebenfalls zu schliessen strebt.

Eben so liegt hierin die Bedeutung des Gesetzes: dass im Säugthierauge die Iris früher ist als die Pupille, und im Vogelauge die Pupille früher als die Iris. Denn im Vogelauge ist die irritable oder Gefässbildung übermächtig: und die ganze Metamorphose desselben ist ein Streben, eine Iris zu bil-

den und die Pupille zu ſchlieſſen. Im Auge des Säugthieres aber bricht die im gröſsten Expanſionszuſtande gebildete Iris in der Mitte auf, und athmet das hereindringende Licht.

§. 594.

Das eigentlich percipirende im Auge iſt der Sehnerve und ſeine häutige Entfaltung in der Netzhaut. — Indem die Richtung der beyden Sehnerven divergirend iſt, und dieſe von ihrer Vereinigungsſtelle nach auſſen ſtrahlen; ſo trit der Nervus opticus nicht in der Axe, ſondern dem innern Augenwinkel näher in den Bulbus ein; er vertheilt ſich in fein geſpaltene Faden, um die lamina cribroſa zu durchgehen, und ragt mit einem deutlich gewahrnehmbaren Tuberculum an ſeiner Eintritsſtelle in das Auge hervor. Von hieraus zerfahren ſeine Bündel in excentriſcher Metamorphoſe, die fadige Bildung erliſcht immer mehr in der pulpöſen, und es bildet ſich die Netzhaut, als die vollkommenſte Expanſion des Sehnerven. Nach Fontanas mikroſcopiſchen Unterſuchungen iſt auch die Netzhaut in Papillen aufgetrieben, und ihre Bildung, nur unendlich feiner, dem Corpus papillare der Haut vergleichbar. Im Mittelpunkte der Netzhaut, da wo ſie von der Axe des Augapfels durchſchnitten wird, befindet ſich ein Loch mit gelben Rändern beſäumt, und eine Falte erſtreckt ſich von dieſem Loche gegen den Eintrit des Sehnerven. Jenes Loch iſt mit einem Gefäſskranze aus Zweigen der Arteria centralis umgeben. Nur bey den Affen wird das Loch und der gelbe Fleck, bey den Makis aber

noch eine ſeichte Falte angetroffen; weiter hinab in der Thierreihe verſchwindet alle Spur dieſer Bildung; ſo wie der gelbe Fleck auch nicht bey dem neugebornen Kinde zugegen iſt. Die Sinnesgewahrnehmung fodert die Expanſion des Sinnesnerven in der Nervenhaut: denn nur eine ſolche expandirte Membran iſt für die Eindrücke des äuſſern rührbar. An der Eintritsſtelle des Sehnerven iſt die Netzhaut noch in ſich contrahirt und nicht zur Nervenhaut entfaltet. Daher kann auch von dieſer Stelle, wenn ſie vom Lichte getroffen wird, nicht der erſte Moment der Viſion ausgehen. Darum iſt aber dieſe Stelle nicht gerade unempfindlich, und verloren für das Geſchäft des Sehens: — in ſie fällt der Moment der Vereinheitung des Wahrgenommenen. Hieraus erklärt ſich das Verſchwinden gegebener Gegenſtände innerhalb des Geſichtskreiſes. Bernoulli's Verſuche hierüber lehren, daſs die umſchriebene Stelle, innerhalb welcher ein im Geſichtskreiſe befindlicher Gegenſtand bey der Lateralentfernung unſichtbar wird, eine Ellypſe ſey, ſo wie auch die Eintritsſtelle des Sehnerven ellyptiſch iſt.

So wie das Maximum der Expanſion des Sehnerven in die ora ſerrata der Netzhaut fällt, ſo iſt auch hier die Receptivität für den erſten Moment der Gewahrnehmung in der Viſion die gröſste, und bey verſchiedenen Gattungen der Amauroſe ſind die dem gezähnten Rande am meiſten benachbarten Stellen der Retina öfters noch lange Zeit für das Licht empfindlich, indeſs die dem Eintrite des Sehnerven näher liegenden ſchon lange Zeit erblindet ſind. Von allen Phyſiologen iſt die Netzhaut als das ei-

gentliche Sehorgan betrachtet worden. Nur Mariotte schrieb diese Function der Gefäßhaut zu, und Troxler erklärt das Sehen aus dem Conflicte der Netzhaut, und der Gefäßhaut, obgleich im allgemeinen ein solcher Gegensatz zwischen der Gefäßpolarität, und der Nervenpolarität angenommen werden muſs, und obgleich eben diese Antithese in der Bildung des Auges auf den höchsten Potenzgrad gebracht ist, so ist doch das eigentlich Apercipirende in der Function des Gesichts die Netzhaut allein, und die Gefäßhaut vermittelt hier lediglich den negativen Factor.

§. 595.

In der Mitte des Auges und sphärisch von den Augenhäuten umschlossen befinden sich die durchsichtigen Medien desselben, welche, ganz dem Lichte assimilirt, die edelste Bildung im Auge, und das Element jeder anderen darstellen. Ursprünglich ist aber das ganze Auge Crystall: bey dem ersten Erscheinen des Auges ist ausser dem Nerven nur die Crystalllinse vorhanden, welche zuerst zur vollkommensten Identität mit dem Lichte verklärt zwischen dem Flüssigen und Starren mitten inne steht, und weder dem Einen noch dem Anderen ausschliesslich angehört. Jede künftige Metamorphose des Auges ist nur eine Zerlegung der Crystalllinse nach sich entgegengesetzten Richtungen: von der einen Seite entwickeln sich die Gefäßhäute des Auges, und von der anderen werden aus dem Crystall die Flüssigkeiten des Bulbus ausgeschieden, und in demselben Verhältnisse nimmt die Crystalllinse am Volu-

men ab, aber an Dichtigkeit und cryſtalliniſcher Beſchaffenheit zu. Je gröſſer daher die Cryſtalllinſe in einem Thierauge iſt, deſto weniger iſt ſie von den übrigen Medien des Auges unterſchieden, und die Gröſse der Cryſtalllinſe ſteht überall im umgekehrten Verhältniſſe der Quantität der wäſſerigen Feuchtigkeit. Die Wichtigkeit der Linſe und die innige Gemeinſchaft, in welcher ſie mit dem Sehenerven ſteht, erhellet auch daraus, daſs die Centralarterie des Sehenerven das Ernährungsgefäſs ihrer Kapſel wird: die Enfaltung der Centralarterie zu einer Gefäſshaut bey ihrem Durchgange durch die Glasfeuchtigkeit erscheint im Vogelauge als der gefaltete Kamm. Die Cryſtalllinſe iſt urſprünglich ſphäriſch geſtaltet: wie bey der Sepia und bey den Fiſchen. Bey ihrer Metamorphoſe durch die Thierreihe hindurch entſteht aber eine bedeutende Verſchiedenheit zwiſchen der vordern und der hintern Hälfte: beyde ſind Segmente zweyer im Durchmeſſer ſehr verſchiedener Kugeln. In dem Menſchenauge iſt die Convexität der hintern Hemisphäre der Linſe weit gröſſer als jene der vordern. Die Hornhaut iſt gewiſſermaſſen hier als die Ergänzung der vorderen Hemisphäre zur Herſtellung der vollkommnen Kugelgeſtalt zu betrachten. Die Cryſtalllinſe iſt auch eine in ihrer Textur mit der Hornhaut übereinſtimmende Bildung. Sie beſteht gleich jener aus einzelnen Lamellen, zwiſchen welchen ein der Morgagniſchen Flüſſigkeit ähnlicher Dunſthauch enthalten iſt. Sie beſitzt in der Mitte einen feſten Kern, um welchen ſich die Lamellen in concentriſchen Schichten anlegen. So wie die Cohäſion der Hornhaut-

lamellen von auſſen nach innen abnimmt, ſo jene der Lamellen der Cryſtalllinſe von innen nach auſſen. Im Mittelpunkte des Bulbus gelagert, iſt ſie mit einer eignen Kapſel und mit einer beſondern Flüſſigkeit umgeben, von welchen ſie an Pellucidität noch übertroffen wird. Der Stoffwechſel geſchieht äuſſerſt langſam in ihr, und daher ſind einmal entſtandene Trübungen derſelben äuſſerſt ſelten oder niemals wieder auflöslich. Sie bricht die Lichtſtrahlen zur convergirenden Richtung im Verhältniſſe der Convexität ihrer Oberfläche, im Verhältniſſe ihrer Dichtigkeit, welche nicht nur abſolut, ſondern auch relativ zu jener der wäſſerigen Feuchtigkeit zu betrachten iſt, zuletzt im Verhältniſſe ihrer Combuſtibilität. Die Cryſtalllinſe läſst die Lichtſtrahlen nicht bloſs mechaniſch durch ſich hindurchgehen: ſondern die Leitung iſt als eine dynamiſche zu betrachten: ſie erleidet ſelbſt hiebey eine progreſſive Entmiſchung: ihre Verhärtung und die Verwachſung ihrer Lamellen bey der Cataracta ſenilis iſt die Folge ihrer endlichen totalen Combuſtion durch das Licht, ihre letzte Metamorphoſe. Die vordere Augenhemisphäre iſt mit der wäſſerigen, die hintere mit der gläſernen Feuchtigkeit erfüllt. Beyde ſind von einerley Natur und qualitativen Beſchaffenheit. Ihr ſpecifiques Gewicht iſt nur wenig von jenem des deſtillirten Waſſers unterſchieden, ſie enthalten nur wenige Salze, die wäſſerige eine ſehr geringe, die gläſerne eine etwas gröſſere Quantität von Eyweiſsſtoff. Die Wäſſerige iſt die am meiſten indifferente unter allen thieriſchen Flüſſigkeiten. Die Glasfeuchtigkeit iſt in einer beſon-

dern Haut eingeſchloſſen, welche ſie nicht nur als Kapſel von auſſen umgiebt, ſondern auch vermöge ihrer ſchwammigen Beſchaffenheit Zellen bildet, in denen ſie enthalten iſt. Aber auch die wäſſerige Feuchtigkeit iſt in einer beſonderen Haut enthalten, die an der inneren Oberfläche der Hornhaut, beſonders im Auge des Pferdes, am leichteſten zu erkennen, und von den Hornhautlamellen zu unterſcheiden iſt. Die wäſſerige Feuchtigkeit iſt in den beyden Augenkammern, der vordern und der hintern enthalten, in ihr ſchwimmt die Regenbogenhaut, welche im geſunden Zuſtande eine beynahe ſenkrecht herabhängende nur mit einer ſehr geringen Convexität nach vorne prominirende Membran darſtellt. In der vordern Augenkammer beträgt das Gewicht der wäſſerigen Feuchtigkeit fünf, in der hintern zwey Gran. Das Verhältniſs der wäſſerigen Feuchtigkeit, der Cryſtalllinſe und der Glasfeuchtigkeit unter ſich iſt in den beſondern Thierclaſſen ein verſchiedenes. Fiſche und Vögel bilden darin einen Gegenſatz unter ſich. Das Aug der Fiſche beſitzt eine beynah ſphäriſche durch die Pupille in die vordere Augenkammer hervorragende Cryſtalllinſe; die Hornhaut iſt abgeplattet; denn die Convexität der Hornhaut, und ſomit die Convexität der vordern Augenhemiſphäre ſteht überall im umgekehrten Verhältniſſe der Convexität der Cryſtalllinſe. Im Vogelauge iſt die Cryſtalllinſe beynahe abgeplattet: dagegen iſt die vordere und hintere Augenkammer ſehr groſs, daher die Quantität der wäſſerigen Feuchtigkeit ſehr beträchtlich. Das menſchliche Auge, und das Auge der Säugthiere

ſteht auch hierin in der Mitte zwiſchen den beyden extremen Bildungen.

§. 596.

Das phänomenologiſche in der Function des Geſichtes iſt das folgende: — Das Licht bildet das Medium zwiſchen dem gewahrenden Sinn, und dem zu gewahrenden Objekte. Es befindet ſich zwiſchen beyden eine Strahlenpyramide, deren Baſis an dem beleuchteten Gegenſtande, deren kegelförmige Spitze aber an den Sehorgane befindlich iſt. Die zu ſehr divergirenden Strahlen werden von den Augenliedern, Augenliederhaaren, von der Sclerotica, und beſonders von der Iris zurückgeworfen, diejenigen aber, welche gegen die gröſste Convexität der Hornhaut hintreffen, dringen durch die Pupille ein und gelangen zur Netzhaut. Dieſe Strahlen werden zuerſt durch die Hornhaut im Verhältniſſe des Grades ihrer Dichtigkeit, Combuſtibilität, und Convexität gebrochen, und zur convergirenden Richtung beſtimmt. Von dieſer deflectiren ſie etwas, indem ſie die wäſſerige Feuchtigkeit durchgehen, und alſo aus dem dichtern Medium in das weniger Dichte gelangen. Beſonders aber iſt die Refraktionskraft der Cryſtalllinse ſehr groſs, die Strahlen werden hiedurch beynahe ganz zur parallelen Richtung beſtimmt, und durchgehen, ohne bedeutend gebrochen zu werden, den Glaskörper, als die letzte centrirende Potenz im Auge. Sie treffen zuletzt in einem Punkte an der Retina zuſammen, welcher den Gipfel des Strahlenkegels bildet.

Bey dem Sehen treffen die durch die Medien des Auges gebrochenen Lichtſtrahlen an der Netzhaut auf ſolche Weiſe zuſammen, daſs dort das Bild des beleuchteten Objektes entſteht. Im Auge der Nachteule, deren Sclerotica nach hinten durchſichtig iſt, in einem künſtlich-nachgebildeten Auge, und in einem friſchen Augapfel, von welchem man nach hinten ein Stück der Sclerotica und der Chorioidea lospräparirt, ohne die Glasfeuchtigkeit ausflieſsen zu laſſen, kann man bey gehöriger Stellung gegen das Licht das Bild des beleuchteten Gegenſtandes mit Augen ſehen. Dieſes Bild iſt umgekehrt: denn da die Lichtſtrahlen ſich nicht in paralleler Richtung, ſondern divergirend fortpflanzen, ſo müſſen nothwendig diejenigen, welche von den ſich entgegengeſetzten Endpunkten eines beleuchteten Objektes herkommen, ehe ſie auf die Netzhaut treffen, ſich kreutzen. Dieſe Umkehrung des geſehenen Gegenſtandes aber bringt keine Verwirrung unſerer Vorſtellung von demſelben hervor, weil ſie nicht einen Gegenſtand allein, ſondern alle ſeine Umgebungen zugleich trifft, und folglich alles wieder an ſeinen natürlichen Platz geſtellt wird.

§. 597.

Die Sinnesorgane ſind nicht doppelt vorhanden, — der Menſch hat wohl zwey Augen und zwey Ohren, aber er beſitzt nur Ein Sehorgan und Ein Gehörorgan. Die Frage, warum der Menſch mit zweyen Augen irgend einen Gegenſtand nur Einmal ſehe, hat keinen richtigen Sinn. Denn ſie

iſt

ist gleichbedeutend mit der Frage: warum der Mensch mit Einem Sehorgan nicht doppelt sehe? Die Dyplopie ist eine Krankheit, im gesunden Zustande ist sie nicht vorhanden, und sie hat folglich nicht nöthig, durch was immer für eine Künsteley der Erklärung aufgehoben zu werden. Der Mensch nimmt mit zwey Augen einen Gegenstand nur Einmal gewahr. Wenn aber beyde Sehaxen sich nicht entsprechen, entsteht allerdings eine doppelte Perception. Von dieser Dyplopie ist diejenige zu unterscheiden, welche auf Einem und demselben Auge statt findet, z. B. bey facettirter Beschaffenheit der exulcerirten Hornhaut. — Gewiss ist es natürlich, mit beyden Augen zugleich zu sehen, und weder ist das Eine andauernd blind, noch die Blindheit abwechselnd. Aber eben so gewiss ist es auch, dass die Vernachlässigung des Einen Auges bey dem Sehen ein sehr gewöhnlicher Fehler, und daher bey den meisten Menschen Ein Auge ohne allen Vergleich sehkräftiger als das andere ist. Diese Vernachlässigung bringt zuletzt den höchsten Grad der Amblyopie, manchmal sogar Amaurose hervor. Der von Haller angeführte Fall, in welchem ein Mann mehrere Jahre, ohne es zu wissen, eine Cataract auf dem Einen Auge hatte, und als er zufällig einmal das gesunde Auge schloss, mit Schröcken die Blindheit des andern wahrnahm, ist eine nicht ungewöhnliche Erscheinung, und wird häufig beobachtet.

Der Gesichtspunkt bezeichnet diejenige Entfernung, in der ein Mensch deutlich lesen, und

kleine Gegenſtände unterſcheiden kann. Der Geſichtspunkt iſt nicht nur bei verſchiedenen Menſchen verſchieden, ſondern auch der nämliche Menſch kann in ſehr verſchiednen Entfernungen gleich gut ſehen, gewöhnlich in der von 6 - 7 Zollen bis zu einer 6 mal gröſſern Entfernung. Die Verlängerung derjenigen Linie, deren Ende der Geſichtspunkt iſt, wird bewirkt durch die Abplattung des Augapfels mittelſt der gleichzeitigen Wirkung der geraden Augenmuskeln durch die Erweiterung der Augenliederſpalte, und die der Pupille vermöge der geringen Quantität vou Lichtſtrahlen, welche von einem entfernten Gegenſtande in das Auge fallen, indem die meiſten hier divergiren, und folglich das Aug nicht treffen. Gerade das Gegentheil geſchieht, wenn ein nicht kurzſichtiger Menſch einen Gegenſtand in der Nähe betrachtet. Gewiſs iſt es, daſs hiebey die Pupille um vieles verengert wird, im Verhältniſs der gröſſern Menge von convergirenden Strahlen, welche von dem beleuchteten Gegenſtande ausgehen. u. ſ. f.

Gattung 3.

Seelenverrichtungen.

XXVIII. Kapitel.

§. 598.

Das Phyſiſche iſt nirgends in ſich vollendet: es bedarf überall, damit es ein Ganzes werde, des

Pſychiſchen, und da, wo es einen Mittelpunkt des Seyns in ſich gefunden, und ſich zu einer wahrhaften Totalität vollendet hat, geht in ihm die Seele auf, welche, obgleich im Körper erſcheinend, dendoch frei, und unkörperlich, ohne Vermiſchung mit ſinnlichen Dingen, und wahrhaft unſterblich iſt, gleich der Idee, deren reines Durchwirken durch die Endlichkeit eben die Seele iſt. Die Seele iſt daher ſchlechthin Urbildliches, und hat nichts gemein mit der Materie; aber ſie iſt Urbildliches im Gegenſatzte des Endlichen, in das materielle Seyn Gebohrnen; d. h. die Seele iſt an dem Urbildlichen gerade diejenige Seite, wodurch daſſelbe ſich in dem Sinnlichen zu manifeſtiren, und dieſes als das Werkzeug ſeiner Offenbarung ſich zu unterwerfen trachtet. Daher iſt die Seele jedes Menſchen ewig, inſofern ſie der urbildlichen Welt angehört: — aber inſofern ſie ein Durchwirken des Urbildlichen durch das Sinnliche, d. h. inſofern ſie die Seele gerade dieſes Menſchen iſt, wird ſie mit ihm erzeugt, und hat eine beſtimmte Lebenszeit. Denn die Seele iſt nicht bloſs das Princip der Individualität, etwa der Schluſsſtein der Beſonderheit eines Dinges; ſondern ſie iſt an jedem Beſondern gerade die unendliche Liebe des Ganzen, — dasjenige, wodurch daſſelbe ſeine Beſonderheit aufzugeben, und nur geiſtig im Ganzen fortzuleben trachtet. Nicht damit das Sinnliche als ſolches in ſich geſchloſſen, und vollendet ſey, muſste die Seele erſchaffen werden, ſondern damit jenem das Urbildliche als Wahrheit, Güte, und Schönheit ein-

wohne, und von ihm erkannt werde. Die Seele ist nicht das Vermögen, solches zu erkennen, sondern sie ist dessen lebendige Erkenntniss.

Alle physiologische Probleme haben nur Eine Lösung: — die Frage ist überall diese: wie die Seele auf den Körper wirke, und wie dieser auf die Seele wirke. Denn ist keine Harmonie zwischen beyden prästabilirt, so ist es unmöglich, einzusehen, wie die Affection des Sinnesnerven zur Anschauung, wie der Gedanke zum Wort, und wie die Vorstellung zur Bewegung werde. Denn dem Wort ist sein Geist, seine Bedeutung nicht etwa äusserlich beygegeben, jenes ist nicht das Vehikel des Gedankens, sondern es ist der ausgesprochene Gedanke selbst: so wie in dem plastischen Kunstwerk die Idee nicht etwa über den Stein ausgegossen ist, sondern ihn durchdringt, und eine Einheit mit ihm erzeugt, welche sich als Schönheit der Form darstellt. — Das eigentlich Menschliche in dem Leben ist nun gerade dieses, dass ein beständiger Umtausch zwischen physischen und psychischen geschehe; dass in jedem Augenblick das Eine das Andere werde; wodurch sich die Einheit der Substanz und des durchaus gleichen Grundes in beyden offenbart.

§. 599.

Nämlich die Art und Weise, wie die Seele mit dem Gehirn verbunden ist, und desselben als des Organes ihrer Manifestation sich bedient, ist die nämliche, auf welche die Idee in dem Kunstwerke lebt, und diesem verbunden ist. So wie das ganze

Wesen der Idee in das Material des Kunstwerkes aufgenommen, und in diesem durch die Schönheit der Form abgedrückt ist, so wie die Form an und für sich todt, nur durch die Idee, deren Ausdruck sie ist, Leben und Schönheit hat; auf solche Weise ist das vollkommenste und edelste Gebilde des Leibes, das Gehirn, — die Basis, mit welcher sich die Seele als begeistendes Princip verbindet, d. h. in welchem sie sich selbst erschafft, und ihr Streben hervorbringt. Das Gehirn ist daher Organ der Seele, nur wie das Niedere überhaupt Bedingung der Manifestation des Höhern ist, nicht indem es als solches besteht, und dieses aufnimmt, sondern indem es von ihm überwältigt, und, in seiner Unwesentlichkeit aufgehoben, zur Identität mit ihm selbst gebildet, und erhoben wird. Daher ist das Gehirn ein Plasma der Seele, ganz ihre Schöpfung, ihr Werk; und jede Form des Hirns und seiner Theile ist ein plastischer Ausdruck einer besondern Seelenthätigkeit.

§. 600.

Die Seele ist Nichts als Wahrheit, Güte und Schönheit. Diese sind die Elemente ihres Lebens. Sie erkennt nicht das Wahre, sie will nicht das Gute: — sie ist selbst eine lebendige Erkenntniss des Wahren, ein Wollen des Guten; sie ist nicht schön gleich den körperlichen Dingen, sondern sie ist die Schönheit selbst. Es giebt daher nicht nur eine Erkenntniss, in welcher das Erkennende und das Erkannte Einig und ewig verbunden sind, sondern jede wahre Erkenntniss ist eine solche. Es

giebt nicht allein angebohrne Begriffe; ſondern jede Erkenntniſs iſt angebohren, und vom Anbeginn her ſtumm in der Seele vorhanden: Niemanden kann man etwas lehren, was er nicht ſchon wiſſe, und alles Wiſſen iſt nur ein Erinnern an das längſt Erkannte.

Wird die Seele im erſten Momente als Wahrheit vorgeſtellt, ſo iſt ſie nicht ein Vermögen der Erkenntniſs, ſondern die Erkenntniſs ſelbſt. Dieſes ſagt das Wort Intelligenz, welches nicht ein Vermögen zur Erkenntniſs, ſondern die zugleich mit dem Vermögen vorhandene lebendige Erkenntniſs ſelbſt bezeichnet. — Nur inſofern die Erkenntniſs in ihre einzelne Momente auseinander geht, iſt ſie eine verſchiedene, und alsdann entweder eine sinnliche, verständige, oder einbilderische.

Denn auch der Sinn (der Sinn in den Sinnen) wurzelt in der Seele, und wird erſt körperlich in den Sinnesorganen. Es giebt ſomit ein Senſorium, und dieſs iſt das eigentliche und wahre Sinnesorgan.

Die Verſtandeserkenntniſs iſt entweder Begriff, Urtheil oder Schluſs. Dieſe drey Verſtandesfunctionen ſind dem Weſen nach ſich gleich, nur der Form nach verſchieden: jede Verſtandesfunction iſt ein Streben, das Mannichfaltige zur Einheit zu bringen: der Begriff iſt die Einheit des ſinnlich gegebenen, inſofern er nämlich empiriſch, collectiv gebildet iſt. Die ſogenannten Begriffe a priori aber enthalten nur das Eine Element der Idee, deren Nachbild ſie ſind, — die Einheit, ohne die Unendlichkeit in ſich zu faſſen: — das Urtheil iſt

die Einheit der Begriffe. der Schluſs die Einheit der Urtheile. Die Function des Verſtandes bey der Bildung der Begriffe, iſt die Abſtraction, — bey der Bildung der Urtheile die Reflexion, — bey der Bildung der Schlüſſe die Subſumtion. Der Verſtand, als das Vermögen, Begriffe zu bilden, iſt die Aufmerkſamkeit — als das Vermögen, Urtheile zu bilden, wird er Urtheilskraft, — und im dritten Momente ſeiner Thätigkeit Schluſsvermögen genannt.

Die Sinneserkenntniſs in ihrem Uebergange zur Verſtandeserkenntniſs — iſt das Gedächtniſs. Dieſes ſteht mit doppeltem unentſchiedenem Character zwiſchen beyden Potenzen mitten inne. Daher ſeine räthſelhafte, und in ſich verſchloſſene Natur. Da, wo es mehr die bloſs reproductive Natur des Sinnes annimmt, heiſst es Erinnerungsvermögen: — das eigentliche Gedächtniſs iſt ſchon mehr verſtändlich. Die Einbildungskraft iſt das Vermögen der Totalität der Erkenntniſs. Sie iſt der Stachel der beyden andern Erkenntniſsvermögen, und die Erinnerung ihrer Unvollſtändigkeit. Sie iſt reines Streben nach Totalität, und wo ſie fehlt, da iſt bey der tiefſten Sinnigkeit, oder bey dem klarſten Verſtande nur Plattheit, Verworrenheit, und Selbſtvernichtung aller Erkenntniſs. Das Anſich aller Erkenntniſs, welches keiner Potenz insbeſondere angehört, ſondern die Identität aller darſtellt, — iſt die Vernunfterkenntniſs. Die Vernunft, inſofern ſie des Sinnes als ihres Organes ſich bedient, ſchauet an (Vernunftanſchauung). Da, wo ſie des Verſtandes als ihres Organes ſich bedient, erzeugt ſie, als Göttliches das Göttliche, den

ewigen Begriff, die Idee, — da, wo ſie der Einbildungskraft als ihres Organes ſich bedient, erſchaft ſie die Urbilder der Dinge.

§. 601.

So wie die Vernunft das Anſich des Erkennens iſt, ſo iſt der Willen das Anſich alles Begehrens.

Daher ſind beyde weder frey, noch der Naturnothwendigkeit untergeben; ſondern ſie ſind das Anſich aller Freyheit und Naturnothwendigkeit. Oder die Vernunft iſt Vernunft, inſofern ſie ſich als das Anſich alles Erkennens affirmirt, ſie iſt Willen, inſofern ſie ſich als das Anſich alles Begehrens affirmirt. — So wie die Vernunft aber weder Sinn, oder Verſtand, noch Einbildungskraft insbeſondere iſt, ſondern die ſich in allen wiederholende, ewig ſich ſelbſt gleiche Wurzel, ſo iſt auch der Willen weder Trieb, Begierde, Affekt noch Leidenſchaft, ſondern er iſt das Anſich aller dieſer Dinge; und ſo wie der Sinneerkenntniſs und der Verſtandeserkenntniſs ihre Wahrheit nur von der Vernunft kömmt, die in ihnen iſt, ſo iſt auch die Begierde und der Affekt nur gerecht und edel, wenn der reine Willen ſich in ihnen manifeſtirt, und wenn nicht das Zufällige, die Form, für das Weſentliche geſetzt wird.

Die Leidenſchaft insbeſondere, die reine und heilige, iſt eine Offenbarung des kräftigſten, herrlichſten Lebens der Seele, ein wahrhaft unbedingtes, und urbildliches Seyn, von daher aber auch verzehrend für das irdiſche und vergängliche Seyn, eine allzu raſche Conſumption, wenn nicht der Wille in

ſeiner Freyheit hervortrit, und die Glut der Leidenſchaft mäſſigt.

§. 602.

Wird die Seele im dritten Moment als Schönheit vorgeſtellt, ſo iſt ſie reines Kunſtvermögen, aber eben daher auch ſich ſelbſt künſtleriſch zu bilden, und gleichſam als ein Kunſtwerk darzuſtellen beſtrebt. Was als Schönheit an der Seele erkannt wird, das iſt eine bleibende Geſtaltung, ein Plasma derſelben, was niemals vergeht, und herrlich im Thun und Wirken ſich abdrückt.

§. 603.

Dieſelben Potenzen, welche die Seele als Intelligenz u. ſ. f. ewig vereint in ſich trägt, aber in ſucceſſiver Entfaltung als Beſonderheiten hervortreten läſst, — durchläuft in plaſtiſcher Geſtaltung das Gehirn, welches auf nachbildliche Weiſe, was die Seele auf urbildliche Weiſe, darſtellt. Die erſte Bedeutung des Gehirns iſt dieſe, daſs es das Centrum der Poſition aller übrigen Organe in ſich enthalte. — Daher wohnt das Leben urſprünglich im Gehirne, und alle Belebung kömmt den übrigen Organen vom Gehirne. Die Abhängigkeit jedes Organs vom Gehirne in Rückſicht ſeiner Lebensäuſſerung iſt um ſo gröſſer, je höher dieſs Organ ſelbſt in der Scale der Organe ſteht. Am innigſten verbunden lebt und ſtirbt mit ihm das Auge. Eben ſo iſt die Abhängigkeit der Theile vom Gehirne gröſſer bey den edleren Thieren; manche Amphibien leben nach der Zerſtöhrung des Gehirns noch fort: Inſecten

bewegen ſich nach abgeſchnittenem Kopfe. — Alsdann iſt das Gehirn Senſorium: oder die Sinnenerven verlaufen in convergirender Richtung gegen das Gehirn; — den erſten Anſatz zum Gehirne ſelbſt bilden die Sinneshügel, oder die Totalität der Ganglien, welche den Sinnenerven vorſtehen. Aus dieſen wächſt das ganze groſse Gehirn, beſonders mit ſeinen vordern Lappen hervor.

Wie die Sinneerkenntniſs in ihrem Uebergange zur Verſtandeserkenntniſs Gedächtniſs iſt, ſo liegen zu unterſt und unmittelbar auf der obern Augenhöhlenplatte die Organe der Gedächtniſſe, und zwar ſo, daſs immer die gegen die Mitte hin zurückgedrängten die Einheit deſſen enthalten, was die nach auſſen und zur Seite gelagerten in der Differenz darſtellen. So wie jene Gehirntheile ſich in die höhere Stirngegend erheben, werden ſie Abbilder der Potenz des Verſtandes; je mehr aber der Verſtand eines Menſchen noch auffaſſend und Begriffe bildend iſt, deſto mehr drängt ſich auch das Gehirn gegen die Seitentheile der Stirngegend hin; je mehr er aber als Vermögen die Einheit des Mannichfaltigen hervorzubringen in ſich beſteht, deſto mehr iſt auch die ganze Maſſe der vordern Gehirnlappen gegen einen Punkt ihrer gröſsten Hervorragung zuſammengezogen, und macht dort die Stirne kugelich hervorſtehend. Iſt der Verſtand eines Menſchen mehr Witz, d. h. ein Vermögen, in dem Getrennten eine fingirte Einheit, aber nur als Symbol der wahren verborgenen Einheit, zu erkennen, ſo zieht ſich auch die Gehirnmaſſe nicht gegen die Stirnnähe hin, ſondern gegen die Seitentheile der Stirne

in zwey hügeliche Hervorragungen zuſammen. Bis dahin der vertical - aufſteigende Theil des Stirnbeines: — niemals iſt bey verſtändigen Menſchen dieſe Schädelgegend ohne bedeutende Hervorragung: — bey jeder Thiergattung iſt die Verſtändigkeit derſelben nach der Entwicklung der vordern Gehirnlappen in dieſer Gegend zu ermeſſen. — Je mehr ſich aber die Gehirnmaſſe eines Menſchen in die höchſte Stirngegend erhebt, und dort den vordern Theil des Schädeldaches in die Höhe treibt, deſto thätiger iſt in der Seele deſſelben die Einbildungskraft. So wie alle Schwärmerey nur das Werk der einzeln für ſich und ungezügelt vom Verſtande hervortretenden, gleichſam entwurzelten Einbildungskraft iſt; ſo iſt auch die Stirne des Schwärmers durch die kühnſte Aufdachung des Stirnbeines in jener Gegend, und durch das gleichzeitige Zurückweichen deſſelben in der Region des Verſtandes ausgezeichnet. So wie die Vernunft ewig ober allen Potenzen der Erkenntniſs und keine insbeſondere iſt, ſo iſt auch die ebenmäſſige, gleichſam volltönnige, kräftige und dennoch milde Entwicklung aller dieſer Regionen insgeſammt, ohne Härte und Vorſprung einer einzelnen der Ausdruck der Vernünftigkeit. So wie die Religion ober aller Erkenntniſs, und überhaupt ober allen menſchlichen Dingen ſteht, und nur der Kunſt, und der dichteriſchen Begeiſterung zugängig iſt, ſo iſt auch die höchſte Erhebung der Stirne, und das beſtändige Aufſteigen derſelben bis zur Kranznäthe Ausdruck der Religioſität.

Je mehr an den Seitentheilen der Stirngegend die Gehirnmaſſe auseinander geht, je mehr ſie, von

oben und vorne zurückgedrängt, am Schläfetheil des Stirnbeines noch hervorragt, desto mehr verschwindet auch aus der Seele der Trieb zur Erforschung der letzten Ursachen der Dinge, die Erkenntniss des Ansich Wahren und Schönen. Dagegen entwickelt sich immer mehr das Talent der Nützlichkeit, das sçavoir faire, was in seinem individuellesten Ausdrucke das Vermögen technischer Anordnung, und Erfindung (nur nicht Kunstsinn) ist.

§. 604.

Das kleine Gehirn bildet sich überall früher als das Grosse zu einem bedeutenden Grade von Vollkommenheit; es stehet überall im Gegensatze gegen das grosse Gehirn, auch im umgekehrten Verhältniss der Grösse, und insbesondere nimmt die Grösse des kleinen Gehirns im Verhältniss zu jener des grossen in dem Maasse ab, als die Thiere verständiger werden. Das kleine Gehirn ist von daher als das Organ der thierischen Triebe zu betrachten, unter welchen der Geschlechtstrieb der mächtigste ist; das kleine Gehirn ist das noch thierische im Gehirn. Die dem Zelte des kleinen Gehirns aufliegenden hintern Lappen des grossen Gehirns, nehmen noch am meisten an der Natur desselben Antheil, und enthalten die Abbilder der gemüthlichen Eigenschaften der Seele: — es ist durchaus die Liebe — Geschlechtsliebe, freundschaftliche, elterliche u. s. f., welche die Entwicklung des Hinterkopfes bestimmt. Je mehr Gemüth und Liebe ein Mensch hat, desto mehr sind die hintern Lappen des grossen Gehirns entwickelt, und auch in der Hinterhauptsge-

gend ist jede bestimmte Hervorragung besonderer Gehirntheile ein physiognomischer Ausdruck besonderer gemüthlicher Eigenschaften.

§. 605.

Was in der Seele des Menschen plastisch und künstlerisch gebildet ist, das setzt sich als eine bestimmte Gestalt, als eine Propension, Neigung im Character fest: und beherrschet eben so wohl die Erkenntniss als den Willen. Diess sind die mächtigen Gewalten, welche dämonisch den Einzelnen besitzen, und das Ganze bewegen. Zuerst zieht sich an der Vereinigungsstelle des Stirnbeines und der Seitenwandbeine die Gehirnmasse in zwey aneinander liegenden Aufwölbungen zusammen, und diese sind der Ausdruck der Bestimmtheit, und der Festigkeit des Entschlusses. Je mehr hier die Mitte eingedrückt, und die Seitengegenden hervorragend sind, desto unbestimmter ist der Character des Menschen, desto zweifelsüchtiger, schwankender, scheu umhersehender, ungetreuer ist er. Dann folgt immer nach dem Verlaufe der Pfeilnäthe das Herrschertalent, welches Eines ist mit dem Streben nach Herrschaft. Sein Gegentheil ist die Ränkesucht, die Schlauigkeit, und das Diebstalent, welches daher auch hier wieder in den Seitengegenden hervortrit, und sich oft wie ein aufgerollter Wulst bis in die Stirngegend fortsetzt. Unter diesem nach hinten trit die Ruhmbegierde hervor, die, je mehr sie Eitelkeit wird, desto mehr auch in die Breite geht, u. s. f.

§. 606.

Von dem Gehirne kann aber nicht behauptet werden: weder, daſs es aus einzelnen Organen (Hirnorganen) zuſammengeſetzt ſey, noch daſs es bey den einzelnen Seelenverrichtungen in Maſſe wirke. Gewiſs iſt das Gehirn nicht alſo aus Hirnorganen zuſammengeſetzt, wie das Muskelſyſtem aus Muskeln, und die Organe laſſen ſich in jenem nicht ſo präpariren, und iſolirt darſtellen, wie die einzelnen Muskeln. Das Verhältniſs der einzelnen Gehirntheile unter ſich iſt ein lediglich durch die Senſibilität vermitteltes. Wer das Weſen der Senſibilität erkannt hat, dem iſt auch der Bau des Gehirns klar. — Wenn es bis zur Lehre vom Gehirne gekommen iſt, dann geht die gewöhnliche Phyſiologie zum Ende; da aber die ganze Phyſiologie nur Ein Problem hat, und dieſs gerade die Lehre von den Verrichtungen des Gehirns iſt; ſo hat ſie eigentlich, da ſie mit Scheue vor dieſem zurücktrit, gar nicht angefangen. Das Gehirn iſt zuerſt eine tuberculöſe, aus vereinzelten Knoten beſtehende Bildung. Durch die Knoten wird im Nervenſyſtem, welches nur der organiſch gewordene Ausdruck einer rein dynamiſchen Leitung iſt, die Continuität, ſo wie jener Leitung, ſo der Nerven ſelbſt unterbrochen. Wie alſo jeder Knoten eine Hemmung des urſprünglichen Expanſionsſtrebens darſtellt, von welchem das Nervenſyſtem beſeelt iſt, — ſo iſt das Gehirn zuerſt eine Juxtapoſition ſolcher Ganglien; nämlich das Haupt jedes nicht acephalen Thieres iſt da, wo ſich die meiſten Ganglien zu-

ſammen drängen. Da die Ganglien der Nerven, der edleren Sinne am meiſten nach organiſcher Gemeinſchaft und nach wechſelſeitiger Durchdringung ſtreben, ſo ſind ihre Organe auch immer am Haupte gelagert. Aber jene bloſse Juxtapoſition ſoll wieder aufgehoben werden, und in die innigſte dynamiſche Durchdringung übergehen: das Gehirn iſt ein lebendiger Inbegriff, eine organiſche Syntheſis von Ganglien. Es bleiben daher in den Gehirnen der höheren Thiere nur einzelne Knoten als ſolche zurück, wie die Vierhügel, die Sehnervenhügel, die geſtreiften Körper: und dieſe gehören meiſtens den Sinnenerven an: die Sinneshügel ſind daher am wenigſten in die Totalität der übrigen Ganglien in der Gehirnmaſſe verſchmolzen. Je weniger die Gehirnbildung in irgend einer Thierclaſſe vollendet iſt, deſto zahlreicher ſind jene noch unterſcheidbaren Ganglien vorhanden: am zahlreichſten in den Fiſchgehirnen, wo zuweilen ſogar noch aus dem verlängerten Marke ſolche Knoten hervorwachſen. Aber noch bey allen mit Wirbelbeinen verſehenen Thieren, welche nicht Säugthiere ſind, befindet ſich eine gröſſere oder kleinere Reihe ſolcher Ganglien zwiſchen den geſtreiften Körpern und den Sehhügeln. Bey Vögeln und Fiſchen ſind die Sehhügel ſelbſt noch am meiſten von der übrigen Gehirnmaſſe getrennt, und ſie liegen unter der Baſis des Gehirns; vor den Sehhügeln befinden ſich gewöhnlich vier Knoten. Bey den Amphibien liegen die Sehnervenhügel hinter den Hemiſphären: — nur bey den Säugthieren ſind ſie in die Gehirnhöhlen ſelbſt aufgenommen, und am innigſten mit

dem Mark der Hemiſphären, und mit den geſtreiften Körpern, ohne dazwiſchen liegende Knoten, verbunden. — Die Tendenz der Gehirnbildung iſt nun diefe, nach aufgehobener Vereinzelung der Ganglien ſich in eine gemeinſame Markmaſſe auszubreiten. Daher erhebt ſich aus dem geſtreiften Körper, als dem Hauptganglion jeder Hemiſphäre, die geſamte Markmaſſe derſelben, und ſie entfaltet ſich in den Windungen beſonders des vorderen Lappens. Bey allen mit Wirbelbeinen verſehenen Thieren ſind ſolche hemiſphäriſche Aufwölbungen zugegen. Je mehr aber die Theile des Gehirns zuſammengedrängt (je mehr ſie concentriſch-geſtellt) ſind, je mehr ſie einander verdecken, und je weniger ſie von einander abſtehen, deſto mehr wächſt die Verſtändigkeit eines Thieres. Beſonders aber richtet ſich dieſe nach dem Grade der Entfaltung der geſamten Markmaſſe der geſtreiften Körper in den Hemiſphären, nach dem Umfange derſelben, nach der Dichtigkeit des Markes in ihnen, und nach der Anzahl ihrer Windungen. Aus dieſer Zuſammendrängung und concentriſchen Stellung der einzelnen Gehirntheile geht bey dem Menſchen die Kugelgeſtalt dieſes Eingeweides hervor, welche bey ihm — bey der Ebenmäſſigkeit der verſchiedenen Durchmeſſer des Gehirns die vollkommenſte iſt, da bey andern Thieren dieſe Ebenmäſſigkeit der einzelnen Durchmeſſer immer mehr geſtöhrt, und das Gehirn bey den am wenigſten Menſchenähnlichen immer mehr in die Länge gezogen wird. Der gröſste Umkreis des Markes iſt in dem eyförmigen Mittel-

punkt,

punkt, welcher ein wahres Centrum jeder Hemisphäre in sich selbst ist. Indem also die ganze Markmasse in eine durchaus gleiche Substanz ohne fernere Unterscheidbarkeit der Theile aufgelöst ist, bilden sich im Innern des Gehirns die verschiedenen Höhlen, die vordern paarigen, die dritte, vierte, die Wasserleitung des Sylvius, der Trichter, welche insgesamt in einander offen stehen, und in allen Thiergehirnen nur verschiedene Abtheilungen Einer grossen Höhle darstellen. Diese innere Höhlung des Gehirns entsteht aus der Getrenntheit der beyden Hemisphären; denn auch die beyden Seitenventrickeln sind nur durch solche Zwischenbildungen von einander geschieden, welche eine Vereinigung des Markes beyder Hemisphären vermitteln. Die dynamische Gemeinschaft der einzelnen Gehirntheile unter sich ist nämlich besonders durch die verschiedenen Commissuren vermittelt, in welchen die Markmassen von sich entgegengesetzten Seiten zusammenlaufen. In allen Thiergehirnen aus den höhern Classen findet sich die vordere und die hintere Commissur. Die vollkommenste Durchdringung aller Markfasern aber findet statt im callösen Körper, in dem Gewölbe, zuletzt im Hirnknoten, welche Theile daher auch nur im Gehirne der Säugthiere vorkommen. Im schwieligen Körper durchdringen sich die Queerbündel der Markfasern aus den beyden Hemisphären: im Hirnknoten aber vermischen sich die Markbündel des grossen Gehirns mit jenen des kleinen. Nämlich je weiter gegen das verlängerte Mark hin, desto mehr

trit auch in der Medulle des Gehirns die Nerven-faserige Bildung hervor, und die Gleichheit und Ununterscheidbarkeit der Substanz verschwindet. So besitzen die Markbündel des grossen Gehirns, oder die Schenkel des verlängerten Markes einen offenbar faserigen Bau: und nachdem sie sich in dem Hirnknoten mit den Markfasernbündeln des kleinen Gehirns verflochten haben, steigen sie in das verlängerte Mark herab. Daher ist hier der Vereinigungsort aller Hirnnerven: nämlich die eigentlich fibrös-nervige Bildung fängt im Gehirne erst hier an.

Das kleine Gehirn aber ist ganz dem grossen gleich- oder nachgebildet. Was die gestreiften Körper für jenes, das ist der gezähnte Körper für das kleine Gehirn. Was dort corpus callosum, Gewölbe u. s. f., ist hier der Lebensbaum. So wie nun der schwielige Körper nur im Gehirne der Säugthiere vorkömmt, so sind wenigstens die Gehirne der Fische und der Amphibien des Lebensbaumes beraubt. Auch hierin ist also die Bildung des kleinen Gehirns jener des grossen vorgeeilt.

§. 607.

Die Verschiedenheit der Gehirnsubstanz begründet in dieser einen Gegensatz der Medulle und der Rinde, welcher die Bildung des grossen und des kleinen Gehirns, jene des Rückenmarks u. s. f. bestimmt. Aber auch in andern Organen, wahrscheinlich in allen Eingeweiden, besteht ein solcher Gegensatz verschiedenartiger Substanzen: z. B. in den Nieren, in der Leber, im Milze. Diese innere

Verſchiedenheit der Gebildung eines Organs beruhet auf der Nothwendigkeit und Unvertilgbarkeit des Gegenſatzes in allem Konkreten. Im Gehirne iſt die Rinde mehr von gangliöſer, die Medulle von nerviger Art: — die gangliöſe Bildung beſteht daher in allen Gehirntheilen noch um ſo mehr und uneingeſchränkter, je mehr ſie graue Subſtanz enthalten. Die gewundene Bildung der Oberfläche des Gehirns iſt eine Folge ſeines urſprünglich unbegränzten, aber in der konkreten Geſtaltung gehemmten Expanſionsſtrebens, da es, auf einen beſtimmten Raum eingeſchränkt, ſich höchſt innerlich zu entfalten beſtrebt iſt. Daher nehmen die Windungen an Anzahl und Tiefe zu mit der Verſtändigkeit der Thiere: — ſie verſchwinden ſchon bey einigen Säugthieren, und am früheſten am hintern Lappen: — auſſer der Claſſe der Säugthiere fehlen ſie gänzlich. — Eine Folge, nicht aber die Urſache der gewundenen Beſchaffenheit des Gehirns iſt die Einſenkung der Gefäſshaut in die dadurch gebildeten Furchen. Indem dieſe Furchen nirgends auf die Medulle, ſondern immer noch auf Rinde treffen, iſt auch überall nur die Rinde von dieſer Seite in unmittelbarer Berührung mit der Gefäſshaut, von daher auch ſelbſt gefäſsreicher, als die mehr rein-nervige Medulle; ſo wie auch die Ganglien ſehr gefäſsreich ſind, und ſo wie die Blutgefäſse etwa auf dieſelbe Weiſe aus den ſie umſtrickenden gefäſshäutigen Netzen in jene gelangen, wie ſie ſich aus der Gefäſshaut des Gehirns in die Rindenſubſtanz ſenken.

§. 608.

Entſchieden bildet ſich der Schädel nach dem Gehirn, ſo wie überall das Niedere durch das Höhere beſtimmt, und gleichſam durch daſſelbe erſchaffen wird. So wie das Auge den beſtimmteſten Einfluſs auf die Bildung der Orbita, und die Lungen auf jene des Thorax haben, ſo ſind auch die beyden Knochenplatten des Schädels eigentlich nur die hart gewordene Haut des Gehirns. Nur iſt dieſs nicht alſo zu verſtehen, als ſey der Schädel ein Stereotyp des Gehirns, und jede Erhabenheit und Vertiefung der Gehirnoberfläche der Glasplatte mechaniſch eingedrückt. Das Gehirn beſtimmt dynamiſch die Bildung des Schädels, und zwar iſt bey jeder Thiergattung die Bildung des Schädels um ſo mehr ausſchlieſſend durch jene des Gehirns beſtimmt, je edler ſie iſt. Denn frühzeitig, ſchon in der Claſſe der Säugthiere, greifen die Anhangshöhlen der Sinnesorgane, Stirnhöhlen und andere, immer mehr in die Dyploe ein, und der Parallelismus der Gehirnoberfläche und der äuſſern Oberfläche des Schädels geht immer mehr verloren.

Sogar jeder Gehirnlappen bildet ſeinen eigenen Schädelknochen: der vordere das Stirnbein, der hintere das Hinterhauptsbein, der mittlere wenigſtens zum groſsen Theile das Seitenwandbein: — denn eigentlich ſind nur dieſe drey Schädelknochen; das Schläfebein iſt mehr Gehörknochen, das Keilbein gehört mehreren untergeordneten Organen zugleich an, u. ſ. f. Erſt nachdem jene drey Knochen ihre beſondere Bildung durch die

ihnen entſprechenden Gehirnlappen erhalten haben, vereinigen ſie ſich unter einander durch Suturen.

§. 609.

Sehr groſs iſt die Macht des Einfluſſes, welchen das Herz mittelſt des Impulſes des arteriellen Kreislaufes auf das Gehirn ausübt. Von daher rühren die Bewegungen, welche man eben ſo wohl an dem blosgelegten, als an dem noch mit der harten Hirnhaut bedeckten Gehirne wahrnimmt: und welche nicht mit den Bewegungen der Inſpiration und der Exſpiration, ſondern mit jenen der Syſtole und Diaſtole des Herzens zuſammentreffen; ſo zwar, daſs das Gehirn ſich erhebt im Momente, wo die Arterien deſſelben ſich erweitern, und eine gröſſere Quantität Blutes aufnehmen, und im Momente, da ſie ſich verengern, wieder einſinkt. Daſs deſſen ohngeachtet das Aufſteigen und das Wiedereinſinken des Gehirns ſich ſcheinbar nach dem Wechſel von Einathmen und Ausathmen richtet, hat ſeinen Grund in der Uebereinſtimmung der Zeitverhältniſſe in der Wiederkehre von den Bewegungen des Herzens und jenen des Thorax bey dem Athemholen. Man kann an menſchlichen Cadavern jene Bewegungen des Gehirns durch die Einſpritzung der Carotiden mit was immer für einer Flüſſigkeit nachahmen; man kann ſie bey lebenden Thieren durch die Unterbindung beyder Carotiden in hohem Grade vermindern, und durch die Zuſammendrückung der aufſteigenden Aorte gänzlich hemmen. Die Stoſserſchütterung, welche der Impuls der arteriellen Bluteinſtröhmung im Gehirne hervorbringt, wird dadurch

möglich, dass die grösseren Arterienstämme mit ihren nächsten Aesten insgesamt an der Basis des Gehirns liegen, somit die Auffschwellung derselben eine Erhebung des Gehirns zur Folge hat.

XXIX. Kapitel.

Schlaf, Wachen, thierischer Magnetismus.

§. 610.

Nur aus dem Wesen der Sensibilität, aus der Eigenthümlichkeit des sensibeln Systems, und aus dessen besonderem Verhältnisse zu den übrigen Systemen des Organismus ist die Natur des Schlafes im Gegensatze des Wachens zu erkennen. Auch hat eigentlich nur das Nervensystem einen Schlaf, und die andern Systeme des Organismus schlafen nicht: — oder umgekehrt; nur für das Nervensystem giebt es ein Wachen, und die andern Systeme liegen in beständigem Schlafe. Nicht das ganze Auge schläft, nur der Sehnerve, und die Netzhaut in ihm: — der Muskel schläft nicht, nur sein Bewegungsnerve, und daher hört die willkührliche Bewegung auf. Im Schlafe dauert die Verdauung, der Blutumlauf, die Respiration, die Einsaugung, die Ernährung, die Absonderung fort: — ja sogar einige dieser Functionen sind verstärkt: — die Verdauung geht unter gewissen Bedingungen besser von statten, der Puls wird voller, langsamer, durch die Respiration wird von demselben Menschen im Schlafe eine verhältnissmässig grössere Quantität von

Sauerstoffgaſs verzehrt; die Einſaugung iſt an der innern Oberfläche der Schleimhäute, und an der äuſſern Hautoberfläche vermehrt; die Ernährung der Organe und der Stoffwechſel iſt raſcher, mehrere Abſonderungen ſind häufiger. — Auch im Nervenſyſteme iſt zur Zeit des Schlafes keineswegs verminderte Thätigkeit, was ſchon die Gegenwart der Träume beweiſst.

Eigentlich iſt das Pflanzenleben ein beſtändiger Schlaf. Auch in dem Thiere liegen die bloſs vegetirenden Organe, z. B. die Knochen, und andere, in einem beſtändigen Schlummer: nur daſs in manchen krankhaften Zuſtänden, z. B. bey Entzündungen, vorübergehend die Seele des Bewuſstſeyns in ihnen erwachet. — Nur dem Nervenſyſteme kömmt ein eigentliches Wachen zu: und im Zuſtande des Schlafes iſt ſeine Thätigkeit auf dieſelbe Stufe mit jener, die in andern Organen iſt, herabgeſetzt. — Auch iſt der Schlaf früher als das Wachen, z. B. im Leben des menſchlichen Fötus; er iſt noch immer überwiegend im Leben des Kindes; — daher iſt nicht der Schlaf aus dem Wachen, ſondere das Wachen aus dem Schlafe erklärbar. —

§. 611.

Das Verhältniſs zwiſchen Wachen und Schlaf iſt gleich dem Verhältniſs von Licht und Schwere. Nicht zufällig trifft in dem thieriſchen Leben das Wachen mit der Tagezeit zuſammen, und der Schlaf mit der dunkeln Nacht; ſondern was die Nacht iſt im Organismus des Ganzen, das iſt der Schlaf für den beſondern Organismus. Der Wechſel von Schlaf

und Wachen hat darin ſeinen Grund, daſs der beſondere Organismus gleiche Perioden mit dem Organismus des Ganzen durchläuft.

Die Senſibilität iſt die Vollendung des Organismus, und die höchſte Blüte des thieriſchen Lebens: — das Phyſiſche aber hat ſeine Vollendung nicht in ſich ſelbſt, ſondern in dem Pſychiſchen; — die Senſibilität und das ſenſible Syſtem iſt daher nothwendig eine Vermittlung zwiſchen Phyſiſchen und Pſychiſchen: Gehirn und Nervenſyſtem ſind für zwey Welten rührbar; ſie pflanzen die Anklänge aus der Einen in die andere fort: — in den untern Thieren iſt das Nervenſyſtem ſelbſt die Seele dieſer Thiere, und von ihrer Naturſeele nicht unterſchieden. Bey den höheren Thieren, bey welchen ſich die Seele über das Nervenſyſtem erhebt, und ſich mit Bewuſstſeyn dieſem entgegenſetzt, bleibt das Nervenſyſtem wenigſtens das Mittel, wodurch die Seele mit dem Leibe Gemeinſchaft pflegt. — Im Schlafe lebt das Nervenſyſtem bloſs ein phyſiſches Leben, gleich den andern Organen: — entweder die Seele iſt in ihm noch nicht aufgegangen, oder ſie iſt von ihm wieder getrennt. Daher hört im Schlafe die Unterordnung der übrigen Organe unter den centrirenden Einfluſs des Gehirns bis zu einem gewiſſen Grade auf; jedes Organ trit mehr in ſeiner Eigenthümlichkeit und Beſonderheit hervor, und entbehrt deſſen, was durch den Nerveneinfluſs und durch die Einwirkung des Gehirns ihm gegeben wird.

Bey dem Einſchlafen verläſst die Seele gleichſam theilweiſe das Nervenſyſtem, und zieht ſich nach

und nach in das Innerſte zurück. Zuerſt hört im Muskelſyſteme das nur durch abſichtliche Anſtrengung erzwungene Gleichgewicht zwiſchen Flexoren und Extenſoren auf, und der Körper fällt, bey dem natürlichen Uebergewichte von Thätigkeit auf der Seite der Flexoren, in einer halben Beugung aller Gelenke nieder. Alsdann ſchlafen die tieferen Sinne ein, das Gefühl, der Geſchmack, der Geruch ſind ſchon unempfindlich, indeſs die höheren Sinnesorgane, Auge und Ohr noch wachen. Daher iſt jeder etwas lebhaftere Eindruck auf die untern Sinne, beſonders auf das Gefühlorgan, ein Hinderniſs des Einſchlafens. Im leiſen Schlummer dauert noch einige Afficirbarkeit der höheren Sinnesorgane, beſonders des Gehörs, fort; — im tiefen Schlafe geht wenigſtens im Gehirne das pſychiſche Leben nicht gänzlich unter: das iſolirte Hervortreten deſſelben im Gehirne iſt eben der Traum: im tiefſten Schlafe erliſcht alles Bewuſstſeyn, und mit ihm der Traum.

Der Schlaf iſt eine Hingebung des egoiſtiſchen Seyns in das allgemeine Leben des Naturgeiſtes, ein Zuſammenflieſſen der beſonderen Seele des Menſchen mit der allgemeinen Naturſeele: — in demſelben Maaſse aber, als jene mit dieſer mehr Eines und inniger verbunden wird, in dem Maaſse iſt ſie weniger innig mit dem Leibe verbunden, und dieſer, minder beſeelt, bleibt in einem todtähnlichen Zuſtande zurück. Aber von jener Vereinigung der Seele mit dem allgemeinen Naturgeiſte kömmt die Erquickung, welche der Schlaf mit ſich führt, und das friſche kräftige Leben am Morgen.

Im Schlafe ist die Seele nicht vernichtet, nur mit dem Leibe ist sie weniger innig vereint; und die schwache Strahlung, mit welcher noch das psychische Leben das physische durchbricht und sich mit diesem vermischt, giebt den Traum. Jeder Traum ist schon eine Art des Somnambulismus, von dem vorzugsweise sogenannten Somnambulismus nur dem Grade nach verschieden. Es ist ganz falsch, dass die meisten Träume sich noch auf körperliche Affektionen beziehen. Es giebt zwar solche Beziehungen, z. B. in den wohllüstigen Träumen bey nächtlichen Saamenergiessungen; in den Träumen von Wasser, von Quellen, Fontainen bey Wassersüchtigen, von rothen Gegenständen bey den zur Apoplexie geneigten. Aber schon diese Träume beweisen eine Steigerung der Nerven des Gemeingefühles zu Sinnenerven, das Aufgehen eines neuen Sinnes in Nerven, welche sonst keine sensitive Nervenpolarität besitzen: z. B. der Ascitische sieht im Traume das in seiner Bauchhöhle stagnirende Wasser. — Aber es giebt entschieden auch divinatorische Träume, und die Entstehung mancher Traumbilder ist aus den gewöhnlichen Gesetzen der Ideenassociation nicht erklärbar.

§. 612.

Wachen und Schlaf sind nicht die einzigen Zustände des menschlichen Lebens. Es giebt einen dritten, welcher weder Schlaf noch Wachen, sondern das Ansich von beyden, und daher die unmittelbarste Erscheinung des urbildlichen Lebens selbst ist. Ein solcher ist der magnetische Schlaf, welcher

nur sehr uneigentlich für eine Modification des gewöhnlichen Schlafs gehalten wird. Wenn der Schlaf eine innigere Gemeinschaft der Seele mit dem allgemeinen Naturgeiste ist, eben darum aber eine grössere Zurückgezogenheit derselben von dem Leibe; wenn dagegen im Zustande des Wachens die Seele dem Leibe näher und inniger verbunden ist, aber in demselben Verhältnisse sich auch mehr vereinzelt, und in grösserer Abgeschiedenheit von dem allgemeinen Weltgeiste fühlt, so dass das Bewusstseyn selbst auf solcher Trennung beruhet, so ist dagegen im magnetischen Schlafe die Seele der Weltseele und zugleich dem Leibe auf das innigste verbunden, dem Leibe nicht mehr allein mittelst des Nervensystems, sondern in allen Theilen und Gliedern durchaus unmittelbar; so dass das Leben nicht mehr eine Besonderheit, sondern das urbildliche Leben selbst ist. Die Attribute des thierischen Magnetismus sind daher vorzüglich folgende: zwey Individuen in Rapport gesetzt, d. h. in die innigste Gemeinschaft von Thätigkeit, so dass Eine Seele in beyden ist, und indem nur das Wesentliche besteht, alles Zufällige, was sie trennt und scheidet, aufgehoben wird. Hiebey zeigt sich nun freylich auf der Einen Seite ein aktiver, und auf der andern ein passiver Rapport: der Magnetiseur ist gebend, die Magnetisirte empfangend. Aber diess Verhältniss kann auch sogleich umgekehrt werden, und die Somnambüle den Magnetiseur magnetisiren. Eben so ist der thierische Magnetismus nicht das Produkt der Einwirkung des Einen Individuums auf das andere, z. B. durch Manipulation; — son-

dern damit eine ſolche Einwirkung möglich ſey, muſs ſchon der Magnetismus beſtehen. — Die erſte Erſcheinung deſſelben iſt ein beſonderes Wohlbehagen, und Beruhigung der unangenehmen körperlichen Empfindungen: — nämlich die Anregung des wahrhaft poſitiven Gefühls der Exiſtenz, und Befreyung von (rein negativer) Affection. Im höhern Grade geht dieſe Beruhigung, d. h. das Auslöſchen des rein negativen im Bewuſstſeyn, und zuletzt des Bewuſstſeyns ſelbſt, — in Betäubung und tiefen Schlaf über. Magnetiſiren heiſst daher rein Poſitives an einen Andern übertragen, und Negatives in ihm vernichten. — Je vollſtändiger aber die Aufhebung des Negativen in der Magnetiſirten iſt, deſto eher erwacht das eigentlich poſitive in ihr, was in uns allen, indeſs wir zu wachen glauben, im tiefſten Schlafe liegt, und nur in der poetiſchen Begeiſterung, in wahrhaft philoſophiſcher Anſchauung eine ſchwache Lebensregung erhält. Das zweyte Attribut des thieriſchen Magnetismus iſt die Klarheit des Innern, und die totale Vermiſchung der Seele und des Leibes. Unmittelbar, nachdem dieſe Stuffe erreicht iſt, hören alle Gegenſätze, mit jenem der Seele und des Leibes, auf: — und zugleich jede Bedingung und Beengung der Erkenntniſs, welche nur von der beſtimmten Vereinigung unſerer Seele mit unſerem Leibe, und ſomit von der Anordnung der Sinne &c. herſtammt. Jede Erkenntniſs iſt nun ein unmittelbares Empfinden. Die Somnambüle ſchaut alle Theile ihres Leibes, wie mit leiblichen Augen; — eben ſo ſieht der Nachtwandler, bey welchem der Somnambulismus

nur auf andere Weiſe entſtanden iſt, mit geſchloſſenen Augen, und ſicher nicht durch die Augenlieder hindurch. — Auf dem höchſten Gipfel kömmt es zur Clairvoyence, und Zeit und Raum, welche nur Bedingungen unſerer Sinneerkenntniſs bey dieſer unſerer beſchränkten Sinnlichkeit ſind, engen die Erkenntniſs der Hellſehenden weiter nicht ein. Nun wird auch der Rapport mit dem Magnetiſeur inniger. Die Hellſehende ſieht in dieſem ſo gut als in ſich ſelbſt hinein; aber eben um der Unbeſtimmtheit und Schrankenloſigkeit des Zuſtandes willen, iſt es, wie Tardi bemerkt, nothwendig, durch öftere Fragen den Blick der Hellſehenden auf das Einzelne zu fixiren. — Der thieriſche Magnetismus hat nur dieſe zwey Stufen, die erſte der Beruhigung, die zweyte des Hellſehens, — und eine dritte, bey welcher alles Licht und Klarheit, und die Luſt der Magnetiſirten reine Seeligkeit iſt.

Es iſt für ſich ſelbſt einleuchtend, daſs aus dem magnetiſchen Schlafe in das Wachen herüber, in den bewuſsten Zuſtand aus jenem über alles Bewuſstſeyn erhabenen, auch nicht die leiſeſte Erinnerung ſich verbreiten könne: — eben ſo daſs der Uebergang vom Wachen in den magnetiſchen Schlaf, und das Erwachen aus dieſem nicht allmählich, ſondern plötzlich und ohne leiſen Uebergang ſeyn müſſe.

Anmerk. So viele Charletanerie und Betrügerei in Rückſicht des thieriſchen Magnetismus ehehin obwaltete, und auch wohl noch obwaltet; ſo gewiſs und hinreichend conſtatirt iſt doch das Phänomen ſelbſt, und von ſo wichtigem Einfluſſe iſt dieſer Gegenſtand für die geſamte Naturwiſſenſchaft.

Lebensfunctionen.

Classe II.

Lebensfunctionen der Gattung.

XXX. Kapitel.

Zeugung.

§. 613.

So herrlich die Besonderheit in den Dingen ist, wenn sie, durch die Urbilder derselben in ihnen gewirkt, als eine wahrhafte Individualität besteht; so fällt dennoch alles Besondere wieder dem Tode und der Verwandlung anheim; indem der in den Dingen allein thätige, lebendige Begriff sich als Gattung über sie erhebt, und, um seine Unsterblichkeit zu erhalten, sich von jenen, als vergänglichen, absondert. Ja den endlichen Dingen ist nicht bloss ein egoistischer Trieb der Selbsterhaltung, sondern auch ein Streben, sich in ihrer Besonderheit zu vernichten, eingebohren; und ihre Trefflichkeit ist eben diese, dass sie nichts für sich gelten, sondern nur Abbilder ihrer Ideen seyn wollen, und daher mit Lust und Sehnsucht dem Tode ihres vergänglichen Antheils entgegen gehen. Einer aber ist der herrlichste Lebensmoment jedes Dinges, da der in ihm wirksame unsterbliche Begriff sich ganz mit sei-

nem besondern Seyn vermischt; dieser ist, da in dem Individuum ganz und uneingeschränkt die Gattung lebendig wird, und jenes sich ein gleiches erschafft. Darauf aber folgt der Tod oder ein dem Tode ähnlicher Zustand von Entkräftung und Abstumpfung. — Die Welt ist noch nicht auserschaffen: jede Zeugung ist eine neue Schöpfung.

§. 614.

Wie aber das Erzeugende selbst wahrhaft erschaffend ist; so ist auch die Natur, als der lebendige Inbegriff alles Seyn's, in ihrer ewig schaffenden Urkraft, stets erzeugend, und alles aus sich gebährend. Dieſs ist die Bedeutung der alten Lehre von der Panspermie, nach welcher die erzeugende, hervorbringende und bildende Kraft als ein gemeinsames Eigenthum der ganzen Natur, nur nicht der todten, sondern der in sich selbst höchst lebenskräftigen, betrachtet wurde. Die lauterste und eben darum auch erste Offenbarung jener alles hervorbringenden Urkraft ist die freywillige Erzeugung (generatio aequivoca), welche von der Erzeugung durch die Concurrenz der Geschlechter im Wesentlichen nicht verschieden, und ihr nur der Art nach entgegengesetzt ist. Nichts Organisches kann untergehen. Mit welchem einmal das Leben sich vermischt hat, in solchem ist es unvertilgbar; und zerfällt die bestimmte Form seines Lebens, so ist jedes Element desselben ein neu Belebtes für sich. Dieſs ist das Gesetz der Entstehung der Infusorien aus faulenden animalischen und vegetabilischen Substan-

zen: ſie geben Zeugniſs von der Ewigkeit des Lebens auch in ſeinem Produkte.

§. 615.

Die Infuſorien bewohnen alle thieriſche Flüſſigkeiten, nicht bloſs den männlichen Saamen nach den Jahren der Pubertät, ſondern auch das Blut, die Galle, den Speichel u. ſ. f. Jede thieriſche Flüſſigkeit hat ihre Infuſorien von eigenthümlicher Art und Form. Alle weichen Theile des Leibes aber zerfallen in Infuſorien, wenn ſie infundirt, der Luft und einer beſtimmten Temperatur ausgeſetzt werden. Die Infuſorien entwickeln ſich nicht in den Zwiſchenräumen der Faſern des thieriſchen Fleiſches aus dort befindlichen Eyern; ſondern ſie ſind das in ſeine Elemente zerfallene Fleiſch ſelbſt. — Es iſt undenkbar, daſs das bey ihrer Entſtehung verſchwindende Fleiſch von ihnen conſumirt werde. Die Fäulniſs, bey welcher ſie ſich entwickeln, iſt kein chemiſcher, kein aus chemiſchen Gründen begreiflicher, ſondern ein organiſcher Prozeſs, eine Analyſis, ein Zerfallen des Fleiſches in Infuſorien. Niemand hat jemals die Eyer, aus welchen ſie entſtehen ſollen, geſehen; — die Annahme, daſs dieſe durch die Luft oder das Waſſer herbeygeführt werden, widerlegt ſich durch die Verſchiedenheit der Infuſorien, welche in den neben einander ſtehenden und aus demſelben Waſſer bereiteten Infuſionen verſchiedener Subſtanzen, z. B. animaliſcher und vegetabiliſcher, ſich bilden. Die Annahme aber, daſs die Eyerchen in den Interſtitien der Muskelfaſern ſchon früher,

etwa

etwa von Anbeginn her, enthalten waren, die Infusion aber nur die zu ihrer Bebrütung günstigen Umstände herbeyführe, ist als unstatthaft zu erkennen aus dem Einflusse, welchen äussere Umstände, z. B. Verschiedenheit der Temperatur, höherer oder tieferer Standort, Einwirkung des Lichtes, der Electricität auf die Entstehung dieser oder jener Art von Infusorien in demselben faulenden Aufgusse äussern.

§. 616.

Das Leben der Infusorien ist stete Bewegung, — Analysis und Synthesis derselben unter sich; — zwey Infusorien wachsen unter sich zusammen, so dass sie ein neues, grösseres, etwa Zangenförmig gestaltetes Infusorium bilden, oder das grössere zerfällt in mehrere kleinere. Es ist aber bey jenem Zusammenwachsen an keine blosse Juxtaposition und Agglutination zu denken: sondern die beyden synthetisirten Infusorien werden vollkommen Eines und gelangen zu wechselseitiger Durchdringung. Das Reich der Infusorien ist das wahre organische Chaos, aus welchem alles besondere Leben hervorgeht, und in welches es wieder zerfällt. Die Infusorien sind die organischen Monaden, die einfachen Lebenskeime.

§. 617.

Die Erzeugung durch sich selbst — ist auch die Art der Entstehung der Priestley'schen grünen Materie, welche sich auf dem Wasser, besonders wenn darin animalische oder Pflanzenreste infundirt sind, aber auch, nur langsamer und unvollkom-

mener, im destillirten Wasser, — durch die Einwirkung des Lichtes, unter häufiger Entwicklung von Sauerstoffgass bildet. Eben so nehmen auf diese Weise die verschiedenen Arten des Schimmels ihren Ursprung. — Gewiss entstehen auch diejenigen Organismen, welche Produkte der Krankheiten der höhern Thiere sind, z. B. die Eingeweidewürmer der Menschen und Thiere durch aequivoque Zeugung, — mittelst der Synthesis der Infusorien, welche sich so häufig in der Mucosität des Darmcanals, im Wurmschleime, im diarrhoischen und dysenterischen Darmschleime finden. Da wo die Reproduction des Gebildes leidet, welche die Freyheit und Selbstständigkeit der Elemente überwältigt, und diese dem Organismus gleich macht, da vereinigen sich die losgetrennten Infusorien des selbst wurmartig gebildeten und sich peristaltisch bewegenden Darmes zum Wurme, — jene der Insectenartig gebildeten Haut zum Insecte. Denn auch der Acarus exulcerans, der sich in noch geschlossenen, nicht exulcerirten Krätzepusteln befindet, entsteht sicher nicht aus Eyern, und eben so scheinen bey der Phthyriasis die Läuse, z. B. die Morpionen, die man häufig in noch nicht geöffneten Knötchen der Haut antrifft, durch freywillige Erzeugung zu entstehen.

§. 618.

Es ist nur Eine Art der Fortpflanzung durch die ganze Reihe lebender Naturen. Die als verschieden angenommene Arten derselben, z. B. die Fortpflanzung durch Knospen, jene durch Befruchtung sind nur dem Grade der Entwicklung nach verschie-

den. Es sind nirgends die Individuen, welche zeugen, sondern es ist der unsterbliche Begriff, die Gattung, allein zeugungskräftig, eben so in der aequivoquen Zeugung, in dem Knospen und Sprossen, als in der Copulation der Geschlechter.

Alles Blendwerk, was die Physiologen von jeher in der Lehre von der Erzeugung irre führte, entsteht aus der ganz grundlosen Voraussetzung: es sey die Erzeugung durch die Concurrenz der Thätigkeit zweyer Individuen entgegengesetzten Geschlechtes bedingt. Nach den insgemein verbreiteten Begriffen werden aber diesen nur unwesentliche und ihnen als Besonderheiten zukommende Eigenschaften beygelegt; und keine Künstelei ist hinreichend, jemals einen wahrhaft schöpferischen Zeugungsakt aus der Synthesis solcher Zufälligkeiten und Nichtigkeiten begreiflich zu machen.

§. 619.

Die erste und einfachste Fortpflanzung geschieht durch Knospen und Sprossen. Denn in den lebenden Wesen ist die Kraft des Lebens so überschwenglich, dass sie, wie der Magnet an unmagnetisirtes Eisen die magnetische Kraft, so die Belebung an andere ohne eigenen Verlust übertragen, und somit sich selbst in diesen hervorbringen können. Daher selbst die mechanische Theilung ein Mittel ist, manche Thiere der Zahl nach zu vervielfachen, und also ihre Art fortzupflanzen. Die Knospe und der junge Sprössling sind zuerst Organe der Mutter: —

ſo wie aber in jedem Organe die Kraft iſt, als ein Organismus für ſich ſelbſt zu ſeyn, ſo trennen ſich dieſe vom mütterlichen Stamme, und entwickeln ſich, jenem gleich, für ſich ſelbſt: — nämlich die Sproſſen und beſonders die Knospen ſind wahre, neu entſtandene Zeugungsorgane, welche ſich aber mit den Erzeugten ſelbſt vom Hauptſtamme abſondern; ſo wie auch bey den höhern Thieren noch immer ein Theil der Zeugungsorgane den Jungen folgt, z. B. die Brüſte als Dotter bey den Vögeln. — Auf dieſe Art der Fortpflanzung folgt unmittelbar eine andere, bey welcher zwey Organe, die auch wohl noch andern Verrichtungen vorſtehen, in demſelben Thiere eine ſolche gegenſeitige Stellung annehmen, daſs ſie ſich wie entgegengeſetzte Geſchlechter verhalten: und daſs Eines das Andere befruchte. Ja es liegt nichts widerſinniges darin, mit Treviranus anzunehmen, daſs es Organismen gebe, bey welchen Ein Organ zugleich männlich und weiblich, zugleich befruchtend und weiblich fortbildend iſt. Kurz, es giebt einen unmittelbaren Uebergang von dem Knospen zur Erzeugung durch die Geſchlechter. Ehe die bildende Natur die Geſchlechter vollkommen frey giebt, und die Fortpflanzung von ihrer Concurrenz abhängen läſst, entſtehen, damit keine Zwiſchenſtufe übergangen und die Kette auf keine Weiſe unterbrochen werde, Thiere, bey welchen beyde Geſchlechter noch in Einem Individuum vereinigt ſind, die Selbſtbefruchtung aber dennoch nur bey der Copulation zweyer, obgleich hermaphroditiſcher, Individuen möglich iſt: — ferner Thiere, welche, obgleich hermaphrodit, dennoch

nur ein anderes Individuum von derſelben Art zu befruchten und von dieſem wieder befruchtet zu werden fähig ſind. — Weiter folgt auf dieſe die Reihe derjenigen Thiere, bey welchen Eine Befruchtung hinreicht, um längere Zeit fortzugebähren, ja bey welchen die Befruchtung Eines Individuums durch mehrere Generationen hindurch wirkſam iſt: — Beweiſe, daſs das Fortpflanzungsgeſchäft nur allmählich, in den höhern Thierclaſſen gleichſam gegen den Willen der Natur den Individuen überlaſſen wird, da ſonſt überall der allgemeine Naturgeiſt ſich in ihm wirkſam zeigt. — Uebrigens geht die Reihe derjenigen Thiere, bey welchen Eine Befruchtung für längere Zeit in demſelben weiblichen Individuum wirkſam iſt, noch durch die Claſſe der Vögel hindurch, und nur bey den Säugthieren erſtreckt ſich die Wirkung derſelben bloſs auf eine einzige Conception Eines oder mehrerer Jungen.

§. 621.

In den Uranfängen organiſcher Bildung und Geſtaltung im Reiche der Infuſorien, welches mit doppeltem Angeſicht durch die Zoophyten der Thierwelt, und durch die Phytozoen der Pflanzenwelt ſich entgegenkehrt, iſt die Geſchlechtsloſigkeit nicht bloſs anſcheinend, ſondern wahrhaft gegründet: der Polyp iſt männlich, nur in ſo ferne er geſchlechtlos iſt. Denn das weibliche Geſchlecht iſt das Geſchlecht κατ' ἐξοχήν. Das Männliche iſt etwas durch ſich ſelbſt, in allen ſeinen Attributen rein poſitiv: daher das Uranfängliche. Das Weibliche aber iſt rein negativ, nur im Gegenſatz des Männlichen,

nur durch dieses, und indem dasselbe ihm einen Theil seiner Wesenheit verleihet. Denn im organischen ist die Natur des Gegensatzes von solcher Art, daſs immer das Eine Glied desselben auch die Einheit der Entgegengesetzten in sich trägt, und sich somit wahrhaft positiv verhält. Da wo der Geschlechtsunterschied zuerst entstehet, im Reiche der Pflanzen, ist ein Uebergewicht des weiblichen Principes: — und folglich vereinigt die Pflanze auf Einem Stamme beyde Geschlechter. Wie an den beyden Endpunkten des Magnetes die Pole hervortreten, so die sich entgegengesetzten Geschlechter in der Blüthe der Pflanzen. Wie dagegen die beyden Formen der Electricität an sich entgegengesetzte Körper vertheilt sind; also kömmt es im Thierreiche zur Trennung der Geschlechter. Denn das Pflanzenleben ist von der Seele der ersten Dimension, das Thierleben aber von jener der zweyten beherrscht. Monoecie, und Hermaphroditismus ist daher das allgemeine Bildungsgesetz der Pflanzen, und die Vertheilung der entgegengesetzten Geschlechtsorgane an getrennte Stämme beweisst ein Thierischwerden der Pflanzen. Aber Trennung der Geschlechter ist das Bildungsgesetz im Thierreiche. Bey weitem die gröſste Anzahl der Thiergattungen ist getrennten Geschlechtes. Nur einige Würmer und Mollusken sind Hermaphroditen. Aber in jeder Thierclasse kommen einige, und gerade die vorzugsweise thierischen Gattungen vor, wo die Geschlechter getrennt sind. Bey den Insecten und Schaalthieren ist das Gesetz der Trennung schon bestimmt ausgesprochen und ohne Ausnahme; weiter hinauf bey den eigentlich

thierischen Thieren verschwindet aller Schein des Hermaphroditismus.

§. 621.

Die beyden Geschlechter verhalten sich unter einander wie Allgemeines und Besonderes. Das Eine ist das Erschaffende, wahrhaft erzeugende, positive, das andere ist das lediglich empfangende, negative; und der ganze Zeugungsprozess ist nur eine Vernichtung aller Negativität des Weiblichen durch die positive, belebende Kraft des Männlichen: — die Kraft des Mannes erschafft sich selbst und das ihr Gleiche in dem Weibe, und vereinigt sich mit ihm, auf solche Weisse, wie die Idee sich mit dem Sinnlichen, Empirischen vermischt, indem sie dieses zur Identität mit sich selbst emporhebt. — Es ist keine wechselseitige Durchdringung des Männlichen und des Weiblichen, d. h. eine Vermischung dessen, was zufällig an beyden ist, oder eine Neutralisirung; sondern eine wahre Erhebung des Weiblichen zu dem Männlichen, rein positiven. Das Weibliche ist überall mehr der Naturnothwendigkeit untergeben, darum in sich verschlossen, aber unvollendet, und der männlichen Kraft mit Lust unterworfen. Das Männliche aber wohnt im Reiche der Freyheit, und hat ursprünglich einen kräftigern Gegensatz in sich: — es bedarf des Weiblichen minder, aber seine Lust ist, dieses zu erheben und sich ihm mitzutheilen. Das Weibliche ist, so wie alles, an die Erde gebundene, und der Schwere untergebene, mehr pflanzenhaft: — das Männliche aber ist vorzugsweise thierisch, daher

und Wachen hat darin ſeinen Grund, daſs der beſondere Organismus gleiche Perioden mit dem Organismus des Ganzen durchläuft.

Die Senſibilität iſt die Vollendung des Organismus, und die höchſte Blüte des thieriſchen Lebens: — das Phyſiſche aber hat ſeine Vollendung nicht in ſich ſelbſt, ſondern in dem Pſychiſchen; — die Senſibilität und das ſenſible Syſtem iſt daher nothwendig eine Vermittlung zwiſchen Phyſiſchen und Pſychiſchen: Gehirn und Nervenſyſtem ſind für zwey Welten rührbar; ſie pflanzen die Anklänge aus der Einen in die andere fort: — in den untern Thieren iſt das Nervenſyſtem ſelbſt die Seele dieſer Thiere, und von ihrer Naturſeele nicht unterſchieden. Bey den höheren Thieren, bey welchen ſich die Seele über das Nervenſyſtem erhebt, und ſich mit Bewuſstſeyn dieſem entgegenſetzt, bleibt das Nervenſyſtem wenigſtens das Mittel, wodurch die Seele mit dem Leibe Gemeinſchaft pflegt. — Im Schlafe lebt das Nervenſyſtem bloſs ein phyſiſches Leben, gleich den andern Organen: — entweder die Seele iſt in ihm noch nicht aufgegangen, oder ſie iſt von ihm wieder getrennt. Daher hört im Schlafe die Unterordnung der übrigen Organe unter den centrirenden Einfluſs des Gehirns bis zu einem gewiſſen Grade auf; jedes Organ trit mehr in ſeiner Eigenthümlichkeit und Beſonderheit hervor, und entbehrt deſſen, was durch den Nerveneinfluſs und durch die Einwirkung des Gehirns ihm gegeben wird.

Bey dem Einſchlafen verläſst die Seele gleichſam theilweiſe das Nervenſyſtem, und zieht ſich nach

und nach in das Innerſte zurück. Zuerſt hört im Muskelſyſteme das nur durch abſichtliche Anſtrengung erzwungene Gleichgewicht zwiſchen Flexoren und Extenſoren auf, und der Körper fällt, bey dem natürlichen Uebergewichte von Thätigkeit auf der Seite der Flexoren, in einer halben Beugung aller Gelenke nieder. Alsdann ſchlafen die tieferen Sinne ein, das Gefühl, der Geſchmack, der Geruch ſind ſchon unempfindlich, indeſs die höheren Sinnesorgane, Auge und Ohr noch wachen. Daher iſt jeder etwas lebhaftere Eindruck auf die untern Sinne, beſonders auf das Gefühlorgan, ein Hinderniſs des Einſchlafens. Im leiſen Schlummer dauert noch einige Afficirbarkeit der höheren Sinnesorgane, beſonders des Gehörs, fort; — im tiefen Schlafe geht wenigſtens im Gehirne das pſychiſche Leben nicht gänzlich unter: das iſolirte Hervortreten deſſelben im Gehirne iſt eben der Traum: im tiefſten Schlafe erliſcht alles Bewuſstſeyn, und mit ihm der Traum.

Der Schlaf iſt eine Hingebung des egoiſtiſchen Seyns in das allgemeine Leben des Naturgeiſtes, ein Zuſammenflieſſen der beſonderen Seele des Menſchen mit der allgemeinen Naturſeele: — in demſelben Maaſse aber, als jene mit dieſer mehr Eines und inniger verbunden wird, in dem Maaſse iſt ſie weniger innig mit dem Leibe verbunden, und dieſer, minder beſeelt, bleibt in einem todtähnlichen Zuſtande zurück. Aber von jener Vereinigung der Seele mit dem allgemeinen Naturgeiſte kömmt die Erquickung, welche der Schlaf mit ſich führt, und das friſche kräftige Leben am Morgen.

Im Schlafe ist die Seele nicht vernichtet, nur mit dem Leibe ist sie weniger innig vereint; und die schwache Strahlung, mit welcher noch das psychische Leben das physische durchbricht und sich mit diesem vermischt, giebt den Traum. Jeder Traum ist schon eine Art des Somnambulismus, von dem vorzugsweise sogenannten Somnambulismus nur dem Grade nach verschieden. Es ist ganz falsch, dass die meisten Träume sich noch auf körperliche Affektionen beziehen. Es giebt zwar solche Beziehungen, z. B. in den wohllüstigen Träumen bey nächtlichen Saamenergiessungen; in den Träumen von Wasser, von Quellen, Fontainen bey Wassersüchtigen, von rothen Gegenständen bey den zur Apoplexie geneigten. Aber schon diese Träume beweisen eine Steigerung der Nerven des Gemeingefühles zu Sinnenerven, das Aufgehen eines neuen Sinnes in Nerven, welche sonst keine sensitive Nervenpolarität besitzen: z. B. der Ascitische sieht im Traume das in seiner Bauchhöhle stagnirende Wasser. — Aber es giebt entschieden auch divinatorische Träume, und die Entstehung mancher Traumbilder ist aus den gewöhnlichen Gesetzen der Ideenassociation nicht erklärbar.

§. 612.

Wachen und Schlaf sind nicht die einzigen Zustände des menschlichen Lebens. Es giebt einen dritten, welcher weder Schlaf noch Wachen, sondern das Ansich von beyden, und daher die unmittelbarste Erscheinung des urbildlichen Lebens selbst ist. Ein solcher ist der magnetische Schlaf, welcher

nur sehr uneigentlich für eine Modification des gewöhnlichen Schlafs gehalten wird. Wenn der Schlaf eine innigere Gemeinschaft der Seele mit dem allgemeinen Naturgeiste ist, eben darum aber eine grössere Zurückgezogenheit derselben von dem Leibe; wenn dagegen im Zustande des Wachens die Seele dem Leibe näher und inniger verbunden ist, aber in demselben Verhältnisse sich auch mehr vereinzelt, und in grösserer Abgeschiedenheit von dem allgemeinen Weltgeiste fühlt, so dass das Bewusstseyn selbst auf solcher Trennung beruhet, so ist dagegen im magnetischen Schlafe die Seele der Weltseele und zugleich dem Leibe auf das innigste verbunden, dem Leibe nicht mehr allein mittelst des Nervensystems, sondern in allen Theilen und Gliedern durchaus unmittelbar; so dass das Leben nicht mehr eine Besonderheit, sondern das urbildliche Leben selbst ist. Die Attribute des thierischen Magnetismus sind daher vorzüglich folgende: zwey Individuen in Rapport gesetzt, d. h. in die innigste Gemeinschaft von Thätigkeit, so dass Eine Seele in beyden ist, und indem nur das Wesentliche besteht, alles Zufällige, was sie trennt und scheidet, aufgehoben wird. Hiebey zeigt sich nun freylich auf der Einen Seite ein aktiver, und auf der andern ein passiver Rapport: der Magnetiseur ist gebend, die Magnetisirte empfangend. Aber diess Verhältniss kann auch sogleich umgekehrt werden, und die Somnambüle den Magnetiseur magnetisiren. Eben so ist der thierische Magnetismus nicht das Produkt der Einwirkung des Einen Individuums auf das andere, z. B. durch Manipulation; — son-

dern damit eine ſolche Einwirkung möglich ſey, muſs ſchon der Magnetismus beſtehen. — Die erſte Erſcheinung deſſelben iſt ein beſonderes Wohlbehagen, und Beruhigung der unangenehmen körperlichen Empfindungen: — nämlich die Anregung des wahrhaft poſitiven Gefühls der Exiſtenz, und Befreyung von (rein negativer) Affection. Im höhern Grade geht dieſe Beruhigung, d. h. das Auslöſchen des rein negativen im Bewuſstſeyn, und zuletzt des Bewuſstſeyns ſelbſt, — in Betäubung und tiefen Schlaf über. Magnetiſiren heiſst daher rein Poſitives an einen Andern übertragen, und Negatives in ihm vernichten. — Je vollſtändiger aber die Aufhebung des Negativen in der Magnetiſirten iſt, deſto eher erwacht das eigentlich poſitive in ihr, was in uns allen, indeſs wir zu wachen glauben, im tiefſten Schlafe liegt, und nur in der poetiſchen Begeiſterung, in wahrhaft philoſophiſcher Anſchauung eine ſchwache Lebensregung erhält. Das zweyte Attribut des thieriſchen Magnetismus iſt die Klarheit des Innern, und die totale Vermiſchung der Seele und des Leibes. Unmittelbar, nachdem dieſe Stuffe erreicht iſt, hören alle Gegenſätze, mit jenem der Seele und des Leibes, auf: — und zugleich jede Bedingung und Beengung der Erkenntniſs, welche nur von der beſtimmten Vereinigung unſerer Seele mit unſerem Leibe, und ſomit von der Anordnung der Sinne &c. herſtammt. Jede Erkenntniſs iſt nun ein unmittelbares Empfinden. Die Somnambüle ſchaut alle Theile ihres Leibes, wie mit leiblichen Augen; — eben ſo ſieht der Nachtwandler, bey welchem der Somnambulismus

nur auf andere Weiſe entſtanden iſt, mit geſchloſſenen Augen, und ſicher nicht durch die Augenlieder hindurch. — Auf dem höchſten Gipfel kömmt es zur Clairvoyence, und Zeit und Raum, welche nur Bedingungen unſerer Sinneerkenntniſs bey dieſer unſerer beſchränkten Sinnlichkeit ſind, engen die Erkenntniſs der Hellſehenden weiter nicht ein. Nun wird auch der Rapport mit dem Magnetiſeur inniger. Die Hellſehende ſieht in dieſem ſo gut als in ſich ſelbſt hinein; aber eben um der Unbeſtimmtheit und Schrankenloſigkeit des Zuſtandes willen, iſt es, wie Tardi bemerkt, nothwendig, durch öftere Fragen den Blick der Hellſehenden auf das Einzelne zu fixiren. — Der thieriſche Magnetismus hat nur dieſe zwey Stufen, die erſte der Beruhigung, die zweyte des Hellſehens, — und eine dritte, bey welcher alles Licht und Klarheit, und die Luſt der Magnetiſirten reine Seeligkeit iſt.

Es iſt für ſich ſelbſt einleuchtend, daſs aus dem magnetiſchen Schlafe in das Wachen herüber, in den bewuſsten Zuſtand aus jenem über alles Bewuſstſeyn erhabenen, auch nicht die leiſeſte Erinnerung ſich verbreiten könne: — eben ſo daſs der Uebergang vom Wachen in den magnetiſchen Schlaf, und das Erwachen aus dieſem nicht allmählich, ſondern plötzlich und ohne leiſen Uebergang ſeyn müſſe.

Anmerk. So viele Charletanerie und Betrügerei in Rückſicht des thieriſchen Magnetismus ehehin obwaltete, und auch wohl noch obwaltet; ſo gewiſs und hinreichend conſtatirt iſt doch das Phönomen ſelbſt, und von ſo wichtigem Einfluſſe iſt dieſer Gegenſtand für die geſamte Naturwiſſenſchaft.

Lebensfunctionen.

Classe II.

Lebensfunctionen der Gattung.

XXX. Kapitel.

Zeugung.

§. 613.

So herrlich die Besonderheit in den Dingen ist, wenn sie, durch die Urbilder derselben in ihnen gewirkt, als eine wahrhafte Individualität besteht; so fällt dennoch alles Besondere wieder dem Tode und der Verwandlung anheim; indem der in den Dingen allein thätige, lebendige Begriff sich als Gattung über sie erhebt, und, um seine Unsterblichkeit zu erhalten, sich von jenen, als vergänglichen, absondert. Ja den endlichen Dingen ist nicht bloss ein egoistischer Trieb der Selbsterhaltung, sondern auch ein Streben, sich in ihrer Besonderheit zu vernichten, eingebohren; und ihre Trefflichkeit ist eben diese, dass sie nichts für sich gelten, sondern nur Abbilder ihrer Ideen seyn wollen, und daher mit Lust und Sehnsucht dem Tode ihres vergänglichen Antheils entgegen gehen. Einer aber ist der herrlichste Lebensmoment jedes Dinges, da der in ihm wirksame unsterbliche Begriff sich ganz mit sei-

nem besondern Seyn vermischt; dieser ist, da in dem Individuum ganz und uneingeschränkt die Gattung lebendig wird, und jenes sich ein gleiches erschafft. Darauf aber folgt der Tod oder ein dem Tode ähnlicher Zustand von Entkräftung und Abstumpfung. — Die Welt ist noch nicht auserschaffen: jede Zeugung ist eine neue Schöpfung.

§. 614.

Wie aber das Erzeugende selbst wahrhaft erschaffend ist; so ist auch die Natur, als der lebendige Inbegriff alles Seyn's, in ihrer ewig schaffenden Urkraft, stets erzeugend, und alles aus sich gebährend. Dieſs ist die Bedeutung der alten Lehre von der Panspermie, nach welcher die erzeugende, hervorbringende und bildende Kraft als ein gemeinsames Eigenthum der ganzen Natur, nur nicht der todten, sondern der in sich selbst höchst lebenskräftigen, betrachtet wurde. Die lauterste und eben darum auch erste Offenbarung jener alles hervorbringenden Urkraft ist die freywillige Erzeugung (generatio aequivoca), welche von der Erzeugung durch die Concurrenz der Geschlechter im Wesentlichen nicht verschieden, und ihr nur der Art nach entgegengesetzt ist. Nichts Organisches kann untergehen. Mit welchem einmal das Leben sich vermischt hat, in solchem ist es unvertilgbar; und zerfällt die bestimmte Form seines Lebens, so ist jedes Element desselben ein neu Belebtes für sich. Dieſs ist das Gesetz der Entstehung der Infusorien aus faulenden animalischen und vegetabilischen Substan-

zen: ſie geben Zeugniſs von der Ewigkeit des Lebens auch in ſeinem Produkte.

§. 615.

Die Infuſorien bewohnen alle thieriſche Flüſſigkeiten, nicht bloſs den männlichen Saamen nach den Jahren der Pubertät, ſondern auch das Blut, die Galle, den Speichel u. ſ. f. Jede thieriſche Flüſſigkeit hat ihre Infuſorien von eigenthümlicher Art und Form. Alle weichen Theile des Leibes aber zerfallen in Infuſorien, wenn ſie infundirt, der Luft und einer beſtimmten Temperatur ausgeſetzt werden. Die Infuſorien entwickeln ſich nicht in den Zwiſchenräumen der Faſern des thieriſchen Fleiſches aus dort befindlichen Eyern; ſondern ſie ſind das in ſeine Elemente zerfallene Fleiſch ſelbſt. — Es iſt undenkbar, daſs das bey ihrer Entſtehung verſchwindende Fleiſch von ihnen conſumirt werde. Die Fäulniſs, bey welcher ſie ſich entwickeln, iſt kein chemiſcher, kein aus chemiſchen Gründen begreiflicher, ſondern ein organiſcher Prozeſs, eine Analyſis, ein Zerfallen des Fleiſches in Infuſorien. Niemand hat jemals die Eyer, aus welchen ſie entſtehen ſollen, geſehen; — die Annahme, daſs dieſe durch die Luft oder das Waſſer herbeygeführt werden, widerlegt ſich durch die Verſchiedenheit der Infuſorien, welche in den neben einander ſtehenden und aus demſelben Waſſer bereiteten Infuſionen verſchiedener Subſtanzen, z. B. animaliſcher und vegetabiliſcher, ſich bilden. Die Annahme aber, daſs die Eyerchen in den Interſtitien der Muskelfaſern ſchon früher,

etwa

etwa von Anbeginn her, enthalten waren, die Infusion aber nur die zu ihrer Bebrütung günstigen Umstände herbeyführe, ist als unstatthaft zu erkennen aus dem Einflusse, welchen äussere Umstände, z. B. Verschiedenheit der Temperatur, höherer oder tieferer Standort, Einwirkung des Lichtes, der Electricität auf die Entstehung dieser oder jener Art von Infusorien in demselben faulenden Aufgusse äussern.

§. 616.

Das Leben der Infusorien ist stete Bewegung, — Analysis und Synthesis derselben unter sich; — zwey Infusorien wachsen unter sich zusammen, so dass sie ein neues, grösseres, etwa Zangenförmig gestaltetes Infusorium bilden, oder das grössere zerfällt in mehrere kleinere. Es ist aber bey jenem Zusammenwachsen an keine blosse Juxtaposition und Agglutination zu denken: sondern die beyden synthetisirten Infusorien werden vollkommen Eines und gelangen zu wechselseitiger Durchdringung. Das Reich der Infusorien ist das wahre organische Chaos, aus welchem alles besondere Leben hervorgeht, und in welches es wieder zerfällt. Die Infusorien sind die organischen Monaden, die einfachen Lebenskeime.

§. 617.

Die Erzeugung durch sich selbst — ist auch die Art der Entstehung der Priestley'schen grünen Materie, welche sich auf dem Wasser, besonders wenn darin animalische oder Pflanzenreste infundirt sind, aber auch, nur langsamer und unvollkom-

mener, im destillirten Wasser, — durch die Einwirkung des Lichtes, unter häufiger Entwicklung von Sauerstoffgass bildet. Eben so nehmen auf diese Weise die verschiedenen Arten des Schimmels ihren Ursprung. — Gewiss entstehen auch diejenigen Organismen, welche Produkte der Krankheiten der höhern Thiere sind, z. B. die Eingeweidewürmer der Menschen und Thiere durch aequivoque Zeugung, — mittelst der Synthesis der Infusorien, welche sich so häufig in der Mucosität des Darmcanals, im Wurmschleime, im diarrhoischen und dysenterischen Darmschleime finden. Da wo die Reproduction des Gebildes leidet, welche die Freyheit und Selbstständigkeit der Elemente überwältigt, und diese dem Organismus gleich macht, da vereinigen sich die losgetrennten Infusorien des selbst wurmartig gebildeten und sich peristaltisch bewegenden Darmes zum Wurme, — jene der Insectenartig gebildeten Haut zum Insecte. Denn auch der Acarus exulcerans, der sich in noch geschlossenen, nicht exulcerirten Krätzepusteln befindet, entsteht sicher nicht aus Eyern, und eben so scheinen bey der Phthyriasis die Läuse, z. B. die Morpionen, die man häufig in noch nicht geöffneten Knötchen der Haut antrifft, durch freywillige Erzeugung zu entstehen.

§. 618.

Es ist nur Eine Art der Fortpflanzung durch die ganze Reihe lebender Naturen. Die als verschieden angenommene Arten derselben, z. B. die Fortpflanzung durch Knospen, jene durch Befruchtung sind nur dem Grade der Entwicklung nach verschie-

den. Es sind nirgends die Individuen, welche zeugen, sondern es ist der unsterbliche Begriff, die Gattung, allein zeugungskräftig, eben so in der aequivoquen Zeugung, in dem Knospen und Sprossen, als in der Copulation der Geschlechter.

Alles Blendwerk, was die Physiologen von jeher in der Lehre von der Erzeugung irre führte, entsteht aus der ganz grundlosen Voraussetzung: es sey die Erzeugung durch die Concurrenz der Thätigkeit zweyer Individuen entgegengesetzten Geschlechtes bedingt. Nach den insgemein verbreiteten Begriffen werden aber diesen nur unwesentliche und ihnen als Besonderheiten zukommende Eigenschaften beygelegt; und keine Künstelei ist hinreichend, jemals einen wahrhaft schöpferischen Zeugungsakt aus der Synthesis solcher Zufälligkeiten und Nichtigkeiten begreiflich zu machen.

§. 619.

Die erste und einfachste Fortpflanzung geschieht durch Knospen und Sprossen. Denn in den lebenden Wesen ist die Kraft des Lebens so überschwenglich, dass sie, wie der Magnet an unmagnetisirtes Eisen die magnetische Kraft, so die Belebung an andere ohne eigenen Verlust übertragen, und somit sich selbst in diesen hervorbringen können. Daher selbst die mechanische Theilung ein Mittel ist, manche Thiere der Zahl nach zu vervielfachen, und also ihre Art fortzupflanzen. Die Knospe und der junge Sprössling sind zuerst Organe der Mutter: —

ſo wie aber in jedem Organe die Kraft iſt, als ein Organismus für ſich ſelbſt zu ſeyn, ſo trennen ſich dieſe vom mütterlichen Stamme, und entwickeln ſich, jenem gleich, für ſich ſelbſt: — nämlich die Sproſſen und beſonders die Knospen ſind wahre, neu entſtandene Zeugungsorgane, welche ſich aber mit den Erzeugten ſelbſt vom Hauptſtamme abſondern; ſo wie auch bey den höhern Thieren noch immer ein Theil der Zeugungsorgane den Jungen folgt, z. B. die Brüſte als Dotter bey den Vögeln. — Auf dieſe Art der Fortpflanzung folgt unmittelbar eine andere, bey welcher zwey Organe, die auch wohl noch andern Verrichtungen vorſtehen, in demſelben Thiere eine ſolche gegenſeitige Stellung annehmen, daſs ſie ſich wie entgegengeſetzte Geſchlechter verhalten: und daſs Eines das Andere befruchte. Ja es liegt nichts widerſinniges darin, mit Treviranus anzunehmen, daſs es Organismen gebe, bey welchen Ein Organ zugleich männlich und weiblich, zugleich befruchtend und weiblich fortbildend iſt. Kurz, es giebt einen unmittelbaren Uebergang von dem Knospen zur Erzeugung durch die Geſchlechter. Ehe die bildende Natur die Geſchlechter vollkommen frey giebt, und die Fortpflanzung von ihrer Concurrenz abhängen läſst, entſtehen, damit keine Zwiſchenſtufe übergangen und die Kette auf keine Weiſe unterbrochen werde, Thiere, bey welchen beyde Geſchlechter noch in Einem Individuum vereinigt ſind, die Selbſtbefruchtung aber dennoch nur bey der Copulation zweyer, obgleich hermaphroditiſcher, Individuen möglich iſt: — ferner Thiere, welche, obgleich hermaphrodit, dennoch

nur ein anderes Individuum von derselben Art zu befruchten und von diesem wieder befruchtet zu werden fähig sind. — Weiter folgt auf diese die Reihe derjenigen Thiere, bey welchen Eine Befruchtung hinreicht, um längere Zeit fortzugebähren, ja bey welchen die Befruchtung Eines Individuums durch mehrere Generationen hindurch wirksam ist: — Beweise, dass das Fortpflanzungsgeschäft nur allmählich, in den höhern Thierclassen gleichsam gegen den Willen der Natur den Individuen überlassen wird, da sonst überall der allgemeine Naturgeist sich in ihm wirksam zeigt. — Uebrigens geht die Reihe derjenigen Thiere, bey welchen Eine Befruchtung für längere Zeit in demselben weiblichen Individuum wirksam ist, noch durch die Classe der Vögel hindurch, und nur bey den Säugthieren erstreckt sich die Wirkung derselben bloss auf eine einzige Conception Eines oder mehrerer Jungen.

§. 621.

In den Uranfängen organischer Bildung und Gestaltung im Reiche der Infusorien, welches mit doppeltem Angesicht durch die Zoophyten der Thierwelt, und durch die Phytozoen der Pflanzenwelt sich entgegenkehrt, ist die Geschlechtslosigkeit nicht bloss anscheinend, sondern wahrhaft gegründet: der Polyp ist männlich, nur in so ferne er geschlechtlos ist. Denn das weibliche Geschlecht ist das Geschlecht κατ' ἐξοχην. Das Männliche ist etwas durch sich selbst, in allen seinen Attributen rein positiv: daher das Uranfängliche. Das Weibliche aber ist rein negativ, nur im Gegensatz des Männlichen,

nur durch dieſes, und indem daſſelbe ihm einen Theil ſeiner Weſenheit verleihet. Denn im organiſchen iſt die Natur des Gegenſatzes von ſolcher Art, daſs immer das Eine Glied deſſelben auch die Einheit der Entgegengeſetzten in ſich trägt, und ſich ſomit wahrhaft poſitiv verhält. Da wo der Geſchlechtsunterſchied zuerſt entſtehet, im Reiche der Pflanzen, iſt ein Uebergewicht des weiblichen Principes: — und folglich vereinigt die Pflanze auf Einem Stamme beyde Geſchlechter. Wie an den beyden Endpunkten des Magnetes die Pole hervortreten, ſo die ſich entgegengeſetzten Geſchlechter in der Blüthe der Pflanzen. Wie dagegen die beyden Formen der Electricität an ſich entgegengeſetzte Körper vertheilt ſind; alſo kömmt es im Thierreiche zur Trennung der Geſchlechter. Denn das Pflanzenleben iſt von der Seele der erſten Dimenſion, das Thierleben aber von jener der zweyten beherrſcht. Monoecie, und Hermaphroditismus iſt daher das allgemeine Bildungsgeſetz der Pflanzen, und die Vertheilung der entgegengeſetzten Geſchlechtsorgane an getrennte Stämme beweiſst ein Thieriſchwerden der Pflanzen. Aber Trennung der Geſchlechter iſt das Bildungsgeſetz im Thierreiche. Bey weitem die gröſste Anzahl der Thiergattungen iſt getrennten Geſchlechtes. Nur einige Würmer und Mollusken ſind Hermaphroditen. Aber in jeder Thierclaſſe kommen einige, und gerade die vorzugsweiſe thieriſchen Gattungen vor, wo die Geſchlechter getrennt ſind. Bey den Inſecten und Schaalthieren iſt das Geſetz der Trennung ſchon beſtimmt ausgeſprochen und ohne Ausnahme; weiter hinauf bey den eigentlich

thierischen Thieren verschwindet aller Schein des Hermaphroditismus.

§. 621.

Die beyden Geschlechter verhalten sich unter einander wie Allgemeines und Besonderes. Das Eine ist das Erschaffende, wahrhaft erzeugende, positive, das andere ist das lediglich empfangende, negative; und der ganze Zeugungsprozess ist nur eine Vernichtung aller Negativität des Weiblichen durch die positive, belebende Kraft des Männlichen: — die Kraft des Mannes erschafft sich selbst und das ihr Gleiche in dem Weibe, und vereinigt sich mit ihm, auf solche Weisse, wie die Idee sich mit dem Sinnlichen, Empirischen vermischt, indem sie dieses zur Identität mit sich selbst emporhebt. — Es ist keine wechselseitige Durchdringung des Männlichen und des Weiblichen, d. h. eine Vermischung dessen, was zufällig an beyden ist, oder eine Neutralisirung; sondern eine wahre Erhebung des Weiblichen zu dem Männlichen, rein positiven. Das Weibliche ist überall mehr der Naturnothwendigkeit untergeben, darum in sich verschlossen, aber unvollendet, und der männlichen Kraft mit Lust unterworfen. Das Männliche aber wohnt im Reiche der Freyheit, und hat ursprünglich einen kräftigern Gegensatz in sich: — es bedarf des Weiblichen minder, aber seine Lust ist, dieses zu erheben und sich ihm mitzutheilen. Das Weibliche ist, so wie alles, an die Erde gebundene, und der Schwere untergebene, mehr pflanzenhaft: — das Männliche aber ist vorzugsweise thierisch, daher

mehr empfindend, und hat einen kräftigern Trieb, auch heftigern Geschlechtstrieb in sich. Durchaus ist das Männliche das Edlere: — nur da beyde in sich unvollendet sind, so streben sie sich wechselweise entgegen. Indem nun das Männliche, als das freygebildete, dem Weiblichen als dem, was unter ihm ist, entgegenstrebt, scheint sein Streben nach dem Unedleren und Vergänglichen gerichtet: das Weibliche aber sinnt dem Höhern und Edleren nach; und diess ist seine Unschuld und die in ihm wohnende heilige Begierde. Eigentlich strebt nicht das Eine dem Andern als einem Besondern nach: sondern jedes sucht durch das Zweyte sich zu vollenden, und das Ganze in sich herzustellen: darum ist die höchste Liebe jene des Geschlechtes.

§. 622.

Der Geschlechtsunterschied macht da, wo er mit grösster Bestimmtheit und Klarheit hervortrit, die Getrennten durchaus und in jeder Beziehung entgegengesetzt. Es ist nicht bloss eine Differenz der Geschlechtstheile; sondern das Weibliche ist das in jeder Beziehung umgekehrte Männliche: kein Geschlecht hat etwas, was dem andern fehlte: sondern das beyden Gemeinsame ist in jedem anderst. Das Weibliche ist durchaus stoffig; daher ist in ihm überall die Fülle unzerlegten Zellstoffes, durch welchen die edlern Gebilde verhüllt, in weniger deutlichen Umrissen und minder bestimmten Formen sich offenbaren. Es ist das vorzugsweise reproductive, nach Masse strebende, daher mehr zur Fettigkeit sich neigende Geschlecht. Das Männliche aber

ist sich selbst verzehrend, und hat gleichsam mehr Form und weniger Stoff. Im Ganzen ist das menschliche Weib kleiner, minder entwickelt, weicher in allen Theilen, und hat weniger Hartes, ein kleineres Knochengerüste. Seine Respiration ist mehr beschränkt, der Thorax minder geräumig, das Gefässsystem ist weniger entwickelt, das Muskelfleisch weniger straff, derbe und reitzbar. Das ganze irritable System ist bey dem Manne mehr als bey dem Weibe vorherrschend. Unter den Sinnesorganen ist das Auge des Mannes vollkommener gebildet als das weibliche Auge: grössere Vollkommenheit der Bildung aber kömmt dem weiblichen Ohre zu. Das Verhältniss des Gehirns zu den Nerven ist grösser bey dem Manne &c.

§. 623.

Im Ganzen verhalten sich in dem Weibe die untern Theile zu den obern, wie in dem Manne die obern Theile zu den untern: — oder die Verschiedenheit des Geschlechts bewirkt auch eine totale Umkehrung des Gegensatzes von oben und unten, so wie eine Inversion der übrigen Gegensätze. Bey dem Weibe ist die Beckengegend ein Centrum von Thätigkeit, und die dort liegenden Organe, besonders der Fruchthälter, zeigen eine ungleich wirksamere Influenz auf den ganzen Organismus, als bey dem Manne. Jene Region ist durchaus, und in allen Theilen mehr entwickelt: — die breitern Flächen der Beckenknochen sind mit grössern und stärkern Muskeln bedeckt: das Geflecht der Beckennerven ist doppelt so gross als jenes bey dem

Manne, die hypogaſtriſchen Arterien ſind verhältnifsmäſſig gröſser: — die untern Extremitäten ſind im Verhältniſſe zu den obern Nerven — und gefäſsreicher bey dem Weibe.

§. 624.

Aber beyde Geſchlechter ſind nur dem Grade der Entwicklung nach und in der Richtung verſchieden: das Weibliche iſt nur ein unvollendet gebliebenes Männliches. Das Weſen des Gegenſazes iſt dieſes, daſs Ein Grund in beyden Entgegengeſetzten ſey: denn wäre keine verborgene Einheit in ihnen, ſo könnten ſie nicht entgegengeſetzt ſeyn. Daher iſt das Männliche nicht ganz von dem *Weiblichen* frey und umgekehrt. In dem Weibe iſt die Clitoris, und die Nymphen am Eingang der Scheide, welche die getrennten nicht zu einem Penis verwachſenen cavernöſen Körper ſind, eine männliche Bildung; dagegen ſind die Brüſte des Mannes weibliche Organe. Wird von beyden vollkommen entwickelten Geſchlechtern hinweggenommen, was unweſentlich bloſs zufällig an ihnen iſt, und wodurch ſie ſich wechſelweiſe ausſchlieſsen; ſo entſteht der wahre Hermaphrodit, in welchem das poſitive beyder Geſchlechter, getrennt von allem negativen, — männliche Kraft mit weiblicher Zartheit, überſchwengliche Lebensfülle mit Grazie und Anmuth gepaart ſind. In ſolcher Beziehung iſt der Hermaphroditismus idealiſch, und die Wirklichkeit übertreffend. Was gewöhnlich unter dieſem Namen als Unvollkommenheit oder Monſtroſität angeführt wird, iſt eigentlich Geſchlechtsloſigkeit, Aphrodi-

tismus. Denn da, wo dieſer z. B. bey Menſchen erſcheint, iſt gewöhnlich weder die männliche noch die weibliche Geſchlechtsform mit Beſtimmtheit entwickelt; ſondern beyde ſind durch einander beſchränkt und bis zu einem gewiſſen Grade aufgehoben. Daher ſind bey menſchlichen Hermaphroditen die Zeugungstheile überhaupt ſehr unvollkommen gebildet, und ſie ſind zur männlichen und zur weiblichen Sexualfunction in der Regel gleich untauglich. Wird von denjenigen Monſtroſitäten und Bildungsfehlern der Harnwerkzeuge und der vordern Wandung des Unterleibs, welche zuweilen für Hermaphroditismus gehalten und damit verwechſelt wurden, abſtrahirt; ſo giebt es drey Grade des wahren Hermaphroditismus. Im erſten Grade iſt bey männlichen Hermaphroditen eine imperforirte Eichel, eine Vulva - ähnliche Theilung des Hodenſackes; bey weiblichen eine widernatürliche Verlängerung der Clitoris zugegen. Im zweyten Grade findet man bey einem ziemlich groſsen Penis aber mit imperforirter Eichel, zwiſchen weiblichen Schaamlefzen einen tiefen, Scheidenähnlichen Gang, in welchem ſich nach oben die Mündung der Harnröhre befindet, welcher aber ſo enge iſt, daſs er keine genauere Unterſuchung zuläſst. Die äuſſern Geſchlechtstheile ſind hier verkrüppelt, und unentſchieden zwiſchen beyden Formen. Aber nach dem Tode findet man entweder einen Fruchthälter mit Bläschenſtöcken und Trompeten, — oder im Unterleib zurückgebliebene Hoden, welche aber zuweilen ſchon in der Gegend des Bauchringes einige Geſchwulſt veranlaſſen. Das Geſchlecht des In-

dividuums läſst ſich hier während des Lebens mit gröſſerer Sicherheit aus der Bildung der übrigen Theile als aus jener der Genitalien beurtheilen. — Bey dem dritten Grade ſind nicht nur die äuſſern Genitalien zwitterartig gebildet, ſondern auch die innern. Man findet Hoden, Saamengänge und Bläschen neben einem Fruchthälter, Ovarien und Trompeten. Die Möglichkeit der ſimultanen Entwicklung von beyderley Zeugungsorganen neben einander in demſelben Individuum iſt hinlänglich durch Ackermann erwieſen. So wie aber jede Monſtroſität des menſchlichen Fötus nur ein Zurückſinken der menſchlichen Bildung auf eine tiefere thieriſche Entwicklungsſtufe iſt, und jede Art derſelben von daher ihre Eigenthümlichkeit mit einer beſondern Thierclaſſe gemein hat; ſo iſt auch der Hermaphroditismus, welcher nur den Schnecken &c. zukömmt, bey dem Menſchen als eine Miſsbildung zu betrachten, und daher ſind Hermaphroditen vom dritten Grade niemals Lebensfähig, jene vom zweyten niemals Zeugungsfähig.

§. 625.

Die Genitalien des Mannes entſprechen in ihrer beſondern Bildung jenen des Weibes; nur geſchieht die Evolution in ſich entgegengeſetzter Richtung. So die äuſſern Genitalien, und alſo die innern. Das Scrotum des Mannes ſtellt nur die in der Raphe zuſammengewachſenen weiblichen Schaamlippen dar. Nicht nur trennen ſich bey gebohrnen männlichen Hermaphroditen jene Lippen wieder in der Medianlinie; ſondern auch bey zufälliger Verſtümm-

lung, wenn durch Brand und Eiterung der mittlere Theil des Scrotums zerstöhrt wird, schlagen sich die Seitentheile desselben Schaamlippenartig, wulstig, den Vorhof einer Scheide bildend, zurück. In die Schaamlippen erstrecken sich auch von den Bauchringen her Fortsätze des Bauchfelles, wie solche mit den Hoden in das Scrotum herabsteigen. Auch ein der tunica Dartos ähnliches Gebilde nimmt das Innere der Lippen ein. Die Clitoris ist nicht das Analogon der ganzen Ruthe, sondern nur der Eichel; daher im Ganzen, nicht bloss an der Spitze mit einer Vorhaut versehen: wie auch bey der angegebenen Art von Verstümmlung die Eichel bey der allgemeinen Zerstöhrung sich erhielt, und einer Clitoris ähnlich zurückblieb: a) — den beyden cavernösen Körpern des Penis entsprechen die beyden Nymphen, welche, mit einem Gefässnetze versehen gleich jenen, einiger Erection fähig sind. In dem Maasse, als bey weiblichen Hermaphroditen die männliche Geschlechtsform mehr eingedrungen ist, zieht die Eichel, die Clitoris, die beyden cavernösen Körper, die Nymphen, mehr an sich, und wird penis - artig verlängert. So wie die Eichel bey dem Manne, so ist die Clitoris bey dem Weibe sehr nervenreich und vorzugsweise der Sitz wohllüstiger Empfindungen. Die harnbeschleunigenden

a) In einem von dem Verfasser beobachteten, nächstens durch eine ausführlichere Beschreibung bekannt zu machenden, zur Erläuterung der Bildungsgesetze der männlichen und weiblichen Genitalien sehr wichtigen Falle von Hermaphroditismus accidentalis.

Muskeln erscheinen hier als Constrictoren am Eingang der Scheide. In den frühern Bildungsperioden des Embryo vor dem vierten Monathe der Schwangerschaft ist auch die weibliche Form von der männlichen in den äussern Genitalien nicht verschieden: — die Clitoris ist bey weiblichen Embryonen unverhältnissmässig gross, in beständiger Erection gegen den Nabel zu, die Genitalien bilden eine eyförmige, durch eine Rinne in der Mitte gespaltene Wulst. Bey männlichen Embryonen vereinigen sich nun die allgemeinen Bedeckungen nach unten in der Raphe, und in demselben Verhältnisse wird auch der Beckenausgang enger, und die Sitzbeine nähern sich einander. Denn wird eine klaffende Spalte in den allgemeinen Bedeckungen vereinigt, so schliesst sich auch die Knochenspalte, die unter ihr ist. Bey weiblichen Embryonen entfernen sich aber die aufsteigenden Aeste der Sitzbeine immer mehr von einander, und die allgemeinen Bedeckungen, angezogen von dem die ganze Bildung beherrschenden Fruchthälter ziehen sich einwärts, und bilden zu einer Schleimhaut metamorphosirt die Scheide. Nur bey dem menschlichen Weibe schlagen sie sich an der Grenze der Scheide und ihres Vorhofs in eine Falte um, welche den Eingang zur Scheide unvollkommen verschliesst, und gewöhnlich bey dem ersten Beyschlafe zerrissen wird, welche aber auch auf andere Weise, z. B. durch Pockengeschwüre zerstöhrt und unter gegebenen Bedingungen selbst bey dem Beyschlafe wenigstens zum Theil erhalten werden kann.

An der männlichen Ruthe verlängern sich die cavernösen Körper offenbar durch die Anziehung der Eichel, welche, als das nervenreichste Gebilde, den ganzen Bildungsprozeſs überhaupt beherrscht, und welche an dem Penis von einer bisher gewöhnlich übersehenen, aber entschiedenen Wichtigkeit ist. Die Eichel allein ist im Stande, in der weiblichen Scheide jene eigenthümliche Empfindung hervorzubringen, und die Sensibilität des Weibes auf den Grad zu erhöhen, daſs Conception statt finden kann. In jeder Thiergattung ist sie von einer besondern und ganz eigenthümlichen Bildung, welche mit einer bestimmten Modification ihrer Sensibilität und jener der weiblichen Zeugungstheile in Uebereinstimmung ist. Die Eichel ist das sensibelste, nervenreichste Gebilde unter den Geschlechtstheilen: die cavernösen Körper sind die irritabelsten, gefäſsreichsten. — Die beyden cavernösen Körper der Ruthe und jener der Harnröhre sind nach aussen fibrös-häutig, nach innen aber mit den blutreichsten, jedoch mehr venösen, Capillargefäſsnetzen erfüllt; in welchen entschieden die vasculöse Natur fortbesteht, und keine Ergiessung des Blutes in Zellen geschieht. — Die Erection des Penis ist eine Folge der zur Zeit der Begattung erhöhten irritabeln Stimmung der Geschlechtstheile, folglich des vermehrten Zuflusses von Blut in die cavernösen Körper, welcher keineswegs vermittelst der Zusammendrückung des Bulbus der Harnröhre durch den Bulbocavernosus &c. bewirkt wird. — Die Erection bezeichnet ein Maximum von Sensibilität in den Geschlechtstheilen, und ist dasselbe,

was in andern Organen im geringern Grade der Eretismus ist.

§. 626.

Was im männlichen Geschlechte die Testikeln sind, das sind im weiblichen die Ovarien, was dort die abführenden Canäle, das sind hier die Fallopschen Röhren; und die getrennten Saamenbläschen des Mannes sind zusammengewachsen und mehr individualisirt in dem weiblichen Fruchthälter. Nämlich der ganze Unterschied dieser Reihe der — innern — Genitalien ist der, daſs im Manne die Hoden den höchsten Grad von individueller Bildung erreichen, und sich die übrigen Geschlechtstheile, auch die Saamenbläschen, unterordnen, daher auch alle Thiere männlichen Geschlechtes mit Hoden versehen sind, indeſs die übrigen Sexualorgane häufig fehlen; dagegen ist unter den weiblichen innern Genitalien der Fruchthälter die individuelleste Bildung, daher auch die Fallopschen Röhren mit ihm verwachsen bleiben, aber von den Ovarien losgerissen sind. Dieſs ist der bestimmende Grund von der geringeren Bedeutsamkeit der Bläschenstöcke. Da die Hoden einen gefäſsartigen Bau besitzen, und selbst durch die Knäulförmige Verwicklung der Saamenabsondernden Gefäſse gebildet sind, so ist die Bildung der Ovarien nur zellicht und loculamentös. Ja die Bläschen selbst sind im Ovarium vor der Befruchtung nicht als solche vorhanden, sondern erst durch die Wirkung der letzten wird die productive Drüsenthätigkeit in dem Bläschenstocke rege. Es entsteht

entſteht in der Mitte eines leicht und oberflächlich entzündeten Umkreiſes ein Bläschen, ſo wie alles neu entſtandene organiſche eine blaſige, zellige Bildung hat, und zu dieſer die fibröſe erſt ſpäter hinzukömmt. Ein ſolches Bläschen beſteht aus zwey Membranen, einer innern und einer äuſſern, zwiſchen welchen eine höchſt gerinnſtoffige Flüſſigkeit enthalten iſt. Indem ein ſolches Bläschen in der Folge berſtet, ergieſst ſich die eingeſchloſſene Flüſſigkeit, und da die beyden zelligen Membranen unter ſich verwachſen, bleibt eine Narbe, ein gelber Fleck zurück. Der Hoden aber iſt an und für ſich drüſig gebildet, von daher abſondernd. Die Subſtanz deſſelben beſteht aus der innigſten Durchdringung von Nerven Blut- Lymphe- und Saamengefäſsen: noch immer iſt in dem Hoden eine Spur von der loculamentöſen Bildung übrig, welche den Bläschenſtock auszeichnet. Aus dem Hygmorſchen Körper verbreiten ſich in ſtrahlender Richtung die Blutgefäſse in den Hoden hinein, und in demſelben convergiren wieder die Saamengefäſse. Der Nebenhoden iſt die Vollendung des Hodens, und entſtehet da, wo die Zuſammenmündung der Saamengefäſse in einen gemeinſamen Canal bereits entſchieden iſt. Sonſt entſteht der Hoden an derſelben Stelle, innerhalb der Bauchhöhle, wo der Bläschenſtock liegt. In der Folge ſteigt zwar der Hoden durch den Bauchring in das Scrotum herab: ſo wie bey dem Manne überhaupt alle Unterleibseingeweide gröſſere Neigung zu ſolchem herniöſem Herabſteigen aus dem Bauchringe haben, als bey dem Weibe: auch das

Ovarium möchte aus dem Bauchringe hervortreten, würde es nicht durch die ſtärkere Anziehung des mächtigern Fruchthälters in deſſen Nähe zurückgehalten. Aber auch bey dem Manne bleiben zuweilen die Teſtikeln in der Bauchhöhle oder am Bauchringe zurück, und nicht ſo ſehr ſelten ſind Inguinalbrüche der Bläschenſtöcke. Bey männlichen Hermaphroditen ſchon vom erſten Grade ſtrebt das ganze Sexualſyſtem ſich um die Saamenbläschen als um ſeinen Mittelpunkt zu organiſiren, und daher bleiben die Hoden in der Nähe von jenen, und in ihrer Abhängigkeit in der Bauchhöhle zurück. Auch verlaſſen die Hoden nicht einmal bey allen Säugthieren die Höhle des Unterleibes; und bey den übrigen Thierclaſſen ſind ſie immer darin eingeſchloſſen.

§. 627.

Das Secretionsprodukt der Hoden iſt der Saamen, welcher nicht rein für ſich, ſondern mit Schleim und Drüſenſaft, z. B. mit jenem der Vorſteherdrüſe, der Cowperſchen Drüſen, vermiſcht, bey dem Beyſchlafe ausgeleert wird. Dieſe Flüſſigkeiten dienen dem nur in geringer Quantität abgeſonderten Saamen, ſo wie er ſelbſt dem ihn begeiſtenden Princip, zur Baſis, zum Vehikel. Der Saamen hat einen eigenthümlichen Geruch, welcher bey allen thieriſchen, ſelbſt bey Pflanzenſaamen der nämliche iſt. Der mit jenen andern Flüſſigkeiten vermiſchte Saamen hat zwey verſchiedene Beſtandtheile. Der Eine iſt dicklich und halbgeronnen: der andere iſt klebrig, weiſs und leichtflüſſig. Er ent-

hält $\frac{90}{100}$ Waſſer, $\frac{1}{100}$ phosphorſaurer Kalkerde $\frac{6}{100}$ animaliſchen Kleber und $\frac{1}{100}$ Soda.

Der Saamen iſt ſehr reich an Infuſorien: er iſt dieſs aber nur nach den Jahren der Pubertät (d. h. erſt jetzt erſcheint wahrer Saamen), bey Hunden nur zur Zeit der Brunſt. Der Saamen impotenter Thiere, z. B. der Mauleſel, iſt ohne Cercarien: — ſie finden ſich ſchon in dem neu abgeſonderten Saamen in den Hoden; und ſind bey verſchiednen Thieren von verſchiedener Art und Bildung. Die Infuſorien im Saamen ſind Zeugen ſeiner belebenden Kraft. Aber weder Eine Cercarie wird zum Embryo, indeſs die übrigen ſterben: noch wächſt aus den einzelnen Cercarien der Embryo zuſammen: ſondern alle müſſen ſterben, als Cercarien zu ſeyn aufhören, damit der Embryo entſtehe. Die Fäulniſs und das ihr entſprechende ſind das Lebenselement der Infuſionsthiere: die heiteren Elemente ſind edleren Organismen hold. Wenn dieſe ſterben, erwachen die Infuſorien, und umgekehrt dieſe ſterben, wenn jene ſich bilden.

§. 628.

Das Saamenabführende Gefäſs hat da, wo es dem Blaſenhals anliegt, hinter ſich eine Darmähnlich gewundene, aber äſtig getheilte Erweiterung. Das Verhältniſs des Saamenbläschens zum abführenden Canal iſt ganz daſſelbe wie jenes der Gallenblaſe zum Lebergallengange. So wie dieſe, communicirt das Saamenbläschen mit dem Saamengange durch einen ſehr engen Hals: jedoch iſt es äſtig in meh-

rere zuſammenhängende, an Einem Stiel ſitzende Bläschen getheilt. So wie zur Zeit der Chylification theils Lebergalle, theils Blaſengalle in den Zwölffingerdarm überflieſst, ſo wird während des Beiſchlafes theils friſcher Saamen aus den Hoden, theils ſolcher Saamen, der ſchon einige Zeit in den Bläschen ſtagnirte, ergoſſen. So wie viele Thiere ohne Gallenblaſe ſind, und dann nur mittelſt der Lebergalle verdauen, ſo ſind auch viele ohne Saamenbläschen, und befruchten nur mittelſt des Hodenſaamens. — Cuviers acceſſoriſche Saamenbläschen bey den Nagethieren u. a. verdienen keineswegs dieſen Namen, ſondern verhalten ſich wie Blinddärme zur Saamenröhre.

§. 629.

Das ganze Syſtem der weiblichen Genitalien hat zum Mittelpunkt ſeiner Bildung und Thätigkeit den Fruchthälter: denn dieſs iſt das empfangende und den Embryo weiter fortbildende, folglich weibliche Organ. In weiblichen Organismen als ſolchen verhält ſich nur der Uterus rein poſitiv: und daher ſtrebt er auch nach Vorherrſchaft über alle übrigen. Der Fruchthälter iſt ein ſchlauchartiges Eingeweide, in dem kleinen Becken zwiſchen Urinblaſe und Maſtdarm an einem Umſchlage des Bauchfelles ſuspendirt; er iſt ganz nach dem Geſetze des Gegenſatzes gebildet. Grund und Hals, vordere und hintere Wandung u. ſ. f., Schleimhaut und Fleiſchhaut zeigen Polarität gegen einander. Das Muskelgewebe entwickelt ſich deutlicher in den Wandungen des Fruchthälters zur Zeit der Schwangerſchaft. Das

menſchliche Weib beſitzt einen Fruchthälter mit einfacher Höhle, welche ſich in eine einfache Scheide öffnet. Zuerſt legen ſich bey verſchiedenen Säugthieren zwey Hörner dem Fruchthälter an: aber die Höhle deſſelben iſt öfters wahrhaft gedoppelt, mit zwey Orificien verſehen. Bey den Beutelthieren iſt der Uterus nicht nur dreyfach, ja vierfach; ſondern der Beutel ſelbſt iſt noch als eine Zugabe eines fünften äuſſern Fruchthälters zu betrachten. Auch bey Menſchen iſt der Fruchthälter in ſeltnen Fällen doppelthöhlig, doppeltmündig, ja in eine doppelte Scheide ſich öffnend. Nur den Säugthieren iſt übrigens ſo wie eine Schwangerſchaft, ſo ein Fruchthälter eigen. Die Eyergebährenden Thiere geben ihren Jungen ſo wie die Bruſt im Dotter, ſo auch den Uterus in der Schaale des Eyes ſelbſt mit.

§. 630.

Der Fruchthälter iſt bey dem menſchlichen Weibe der Sitz einer beſondern Abſonderung, — jener des monatlichen Blutes. Joh. Hunter ſah daſſelbe deutlich bey der Section einer unter Menſtruation Verſtorbenen an der Schleimhaut des Fruchthälters hervordringen. Bey der Imperforation des Muttermundes fand man die Höhle deſſelben mit Blut angefüllt. Wohl kann aber im krankhaften Zuſtande, und in den erſten Monaten der Schwangerſchaft — in der Scheide Menſtrualblut abgeſondert werden, ſo wie die Meniſcheſis aus den verſchiedenſten Organen eintrit. Daſs das Menſtrualblut aber wirklich abgeſondert werde, und nicht aus geborſtenen Gefäſsen hervordringe, beweiſst vorzüglich die Analogie

rere zusammenhängende, an Einem Stiel sitzende Bläschen getheilt. So wie zur Zeit der Chylification theils Lebergalle, theils Blasengalle in den Zwölffingerdarm überfliesst, so wird während des Beischlafes theils frischer Saamen aus den Hoden, theils solcher Saamen, der schon einige Zeit in den Bläschen stagnirte, ergossen. So wie viele Thiere ohne Gallenblase sind, und dann nur mittelst der Lebergalle verdauen, so sind auch viele ohne Saamenbläschen, und befruchten nur mittelst des Hodensaamens. — Cuviers accessorische Saamenbläschen bey den Nagethieren u. a. verdienen keineswegs diesen Namen, sondern verhalten sich wie Blinddärme zur Saamenröhre.

§. 629.

Das ganze System der weiblichen Genitalien hat zum Mittelpunkt seiner Bildung und Thätigkeit den Fruchthälter: denn diess ist das empfangende und den Embryo weiter fortbildende, folglich weibliche Organ. In weiblichen Organismen als solchen verhält sich nur der Uterus rein positiv: und daher strebt er auch nach Vorherrschaft über alle übrigen. Der Fruchthälter ist ein schlauchartiges Eingeweide, in dem kleinen Becken zwischen Urinblase und Mastdarm an einem Umschlage des Bauchfelles suspendirt; er ist ganz nach dem Gesetze des Gegensatzes gebildet. Grund und Hals, vordere und hintere Wandung u. s. f., Schleimhaut und Fleischhaut zeigen Polarität gegen einander. Das Muskelgewebe entwickelt sich deutlicher in den Wandungen des Fruchthälters zur Zeit der Schwangerschaft. Das

menſchliche Weib beſitzt einen Fruchthälter mit einfacher Höhle, welche ſich in eine einfache Scheide öffnet. Zuerſt legen ſich bey verſchiedenen Säugthieren zwey Hörner dem Fruchthälter an: aber die Höhle deſſelben iſt öfters wahrhaft gedoppelt, mit zwey Orificien verſehen. Bey den Beutelthieren iſt der Uterus nicht nur dreyfach, ja vierfach; ſondern der Beutel ſelbſt iſt noch als eine Zugabe eines fünften äuſſern Fruchthälters zu betrachten. Auch bey Menſchen iſt der Fruchthälter in ſeltnen Fällen doppelthöhlig, doppeltmündig, ja in eine doppelte Scheide ſich öffnend. Nur den Säugthieren iſt übrigens ſo wie eine Schwangerſchaft, ſo ein Fruchthälter eigen. Die Eyergebährenden Thiere geben ihren Jungen ſo wie die Bruſt im Dotter, ſo auch den Uterus in der Schaale des Eyes ſelbſt mit.

§. 630.

Der Fruchthälter iſt bey dem menſchlichen Weibe der Sitz einer beſondern Abſonderung, — jener des monatlichen Blutes. Joh. Hunter ſah daſſelbe deutlich bey der Section einer unter Menſtruation Verſtorbenen an der Schleimhaut des Fruchthälters hervordringen. Bey der Imperforation des Muttermundes fand man die Höhle deſſelben mit Blut angefüllt. Wohl kann aber im krankhaften Zuſtande, und in den erſten Monaten der Schwangerſchaft — in der Scheide Menſtrualblut abgeſondert werden, ſo wie die Meniſcheſis aus den verſchiedenſten Organen eintrit. Daſs das Menſtrualblut aber wirklich abgeſondert werde, und nicht aus geborſtenen Gefäſſen hervordringe, beweiſst vorzüglich die Analogie

verſchiedener Hämorrhagien, welche meiſtens Produkte krankhafter Abſonderung, ſelten Folgen der Zerreiſſung von Gefäſsen ſind, u. ſ. f. Das Menſtrualblut hat durch die ſecernirende Thätigkeit der Schleimhaut des Fruchthälters wohl einige, aber ſehr geringe Veränderung, keineswegs aber eine Verderbniſs erlitten.

Die Menſtrualperiode iſt jedesmal mit einer beſondern Modification der Senſibilität verbunden. Die vorzügliche Geneigtheit zur magnetiſchen Criſe in dieſer Epoche iſt bekannt: eben ſo die Leichtigkeit der Conception unmittelbar nach dem Aufhören der Menſtruation; die Geneigtheit zur Recidive aus kaum überſtandenen Krankheiten bey dem Eintrit der monatlichen Periode. Die Menſtruation influirt auf alle Organe und Functionen, beſonders aber auf das Stimmorgan, auf den Puls, auf die Hautausdünſtung u. ſ. f.

Der wahre Grund der Menſtruation iſt das Uebergewicht der Reproductionskraft und der irdiſchen Natur im Weibe; da daſſelbe wirklich zu ſehr nach Production und Maſſebildung ſtrebt, gleich der Erde einen Pflanzenorganismus in ſich aufzunehmen und dieſen aus ſeinem Schooſe zu ernähren vermögend iſt. Das Weib bildet wirklich zu viel Blut: und es iſt kein Zweifel, daſs alle Monathe ſowohl allgemeine als örtliche Plethora eintrete. Das Nervenſyſtem würde dem Blutſyſtem im Weibe ganz unterliegen, daſſelbe ganz irdiſch werden, träte nicht die monathliche Blutabſonderung ein. Eben ſo gewiſs iſt auch die Periode eine Emunction, eine Reinigung, gleich jeder andern

Abſonderung, nämlich eine Wiederherſtellung des Gleichgewichtes antagoniſtiſcher Thätigkeiten im Proceſs der Hämatoſe. — Die Menſtruation als ſolche iſt zwar nur dem menſchlichen Weibe eigen, weil deſſen Geſchlechtsfunction an keine beſtimmte Periode gebunden iſt, und daſſelbe in beſtändigem aber monathlich erneutem Oeſtrus lebt: — allein auch bey andern Thieren trit ein Blutſchleimfluſs aus der Scheide zur Zeit der Brunſt ein. — Die Periodicität der Reinigung iſt beſtimmt durch das alle Perioden beſtimmende und Vermittelnde. Alles iſt periodiſch: — und allerdings ſteht die Menſtruation unter dem Einfluſſe des Mondes: die meiſten Frauenzimmer werden gegen das Neulicht hin menſtruirt; und dieſe Abſonderung hält im Zuſtande vollkommener Geſundheit die beſtimmteſte und unwandelbarſte Periode ein. Nur beſondere Himmelsveränderungen, z. B. Sonnenfinſterniſs u. a. bringen eine Abweichung von der Regel hervor. — Der Eintrit der erſten Menſtruation iſt bey dem Weibe das Zeichen der Geſchlechtsreife, — in den gemäſsigten Climaten gewöhnlich gegen das 14. Lebensjahr: — ſo wie der Eintrit in jede neue Bildungsperiode, ſo wie die Dentition, u. a. iſt auch die erſte Menſtruation gewöhnlich mit mehreren heftigern oder gelindern krankhaften Erſcheinungen verbunden. In der Regel iſt die Abweſenheit der Menſtruation ein Zeichen der Unfruchtbarkeit. Wenn die Epoche der Decrepidität eintrit, wird die Menſtruation zuerſt unregelmäſsig, und bleibt alsdann ganz aus. Das ſchwangre Weib iſt in der Regel nicht menſtruirt. — Jede Menſtruation dauert zwey bis vier Tage, und

der Blutverlust beträgt im Ganzen drey bis sechs ℥. Aber die vollkommne Regelmässigkeit der Menstruation wird auch durch die leisesten Einwirkungen gestöhrt: und daher walten in diesen weiblichen Dingen die grössten Verschiedenheiten ob.

§. 631.

Der Zeugungsakt selbst ist ein ganz dem thierischen Magnetismus angehöriger und nur aus diesem erklärbarer Prozess. Das Verhältniss des Mannes zu dem Weibe ist hiebey ganz jenes des aktiven Rapports, und das Verhältniss des Weibes ist jenes des passiven Rapports. Die körperliche Vermischung ist für sich allein eitel und unkräftig, wenn nicht eine gänzliche Vereinigung des Wesens in beyden zugleich statt findet. Die Erscheinungen unter dem Beyschlafe sind ganz jene der Crise: — zuerst ist hier wie dort die höchste Wohllust, ein Stumpfwerden aller Sinne, so dass Thiere unter der Begattung die ihnen zugefügten heftigen Schmerzen oft nicht empfinden: — ein allgemeines Gefühl von Wärme, wahre convulsivische und epileptische Bewegungen, die höchste innere Klarheit bey äusserer Unafficirbarkeit. Die Empfindungen, welche geschwängerte Weiber unmittelbar nach der Conception haben, sind solche unmittelbare Anschauungen der innern Theile ihres Leibes. — Auf die Begattung folgt natürlich, so wie auf die magnetische Manipulation — Schlaf. Die Begattung hat bey verschiedenen Thieren verschiedene Grade von Innigkeit der Vermischung: — und mit dieser stimmt das Verhältniss überein, in welchem die männli-

chen und weiblichen Zeugungsglieder zu einander ſtehen. Die Scheide der weiblichen Thiere ſteht überall im Verhältniſs der Länge, Dicke und der übrigen Beſchaffenheit des Penis. Wo die Scheide doppelt iſt, da iſt auch die Ruthe geſpalten. Uebrigens iſt in den höhern Claſſen nur bey den Säugthieren, den Senſibilitätsthieren, die Vermiſchung der Geſchlechter höchſt innig; denn bey andern geſchieht die Befruchtung theils auſſerhalb des Leibes der Mutter, theils iſt die männliche Ruthe ſehr klein, nur eine gefäſsreiche Papille, wie z. B. bey den Vögeln. — Dieſe werden in der Innigkeit der Vermiſchung der Geſchlechter bey weitem von den untern Thieren, beſonders von den Inſekten übertroffen. Die Ruthe dieſer Thiere iſt gewöhnlich ſehr lang, voluminös, fleiſchig. — Die Weibchen ſind mit tiefen Scheiden, mit eigenen Beuteln, u. ſ. f. verſehen; und die Begattung dauert ſehr lange Zeit.

§. 632.

Es iſt entſchieden, daſs bey Thieren, bey welchen die Geſchlechter getrennt ſind, das Männliche allein erzeuge: und daſs das Weibliche bloſs empfange, das Erzeugte aufnehme, und fortbilde. Das weibliche Ey iſt ohne die Befruchtung eitel, ein Windey; — es iſt bloſs das Behältniſs, gleichſam das Netz zur Aufnahme des männlichen Zeugungsſaftes. Durch die ganze Thierreihe herauf, von den wenigſt thieriſchen angefangen, wird der Zeugungsprozeſs ſtets mehr immateriell, zuletzt ein rein dynamiſcher Prozeſs; und gleichzeitig wird dasjeni-

ge, was das Weib zur Zeugung beyträgt, immer bedeutungsloſer.

Bey jenen Thieren, bey welchen die Befruchtung auſſerhalb des Körpers der Mutter geſchieht, wird der männliche Saamen unmittelbar auf das weibliche Ey geſpritzt: — oder der letzte gelangt, mit Waſſer vermiſcht, zu den Eyern. Aber auch hier iſt es nicht lediglich die materielle Vermiſchung von beyderley Zeugungsſtoffen, wodurch die Befruchtung bedingt iſt: ſondern der männliche Saamen wirkt zuweilen ohne unmittelbare Berührung durch verſchiedene, ihm materiell undurchdringliche Medien, z. B. durch eine zolldicke Schleimlage hindurch auf die Eyer. So wie bey andern rein dynamiſchen Thätigkeiten und Agentien verhalten ſich hier einzelne Materien als Leiter, andere, z. B. eyweiſsſtoffige Flüſſigkeiten, als Iſolatoren. Der Saamen ſelbſt iſt nämlich, ſeinem materiellen Antheil nach betrachtet, eine mehr ſchleimige Flüſſigkeit, und er wirkt daher durch andere ihm gleiche, ſchleimige Flüſſigkeiten hindurch. Merkwürdig iſt es, daſs das Eyweiſs ſich hiebey als Iſolator verhält; da es in allen Eyern nach auſſen gelagert, in der Folge die innern Theile des befruchteten Eyes umgiebt, und ſo die Wirkungsſphäre des männlichen Saamens begrenzt. — Eben ſo findet entſchieden bey den Pflanzen keine Vermiſchung des männlichen Saamens mit dem weiblichen ſtatt. — Bey den Thieren, bey welchen die Befruchtung innerhalb des Körpers der Mutter geſchieht, hat niemand genügend dargethan, daſs eine ſolche Vermiſchung wirklich vor ſich gehe,

niemand kann bestimmt angeben, wo sie statt finde, ob in den Ovarien, was das unwahrscheinlichste ist, — ob in den Fallop'schen Röhren, oder in der Höhle des Uterus. Ja es ist sogar zweifelhaft, ob der männliche Saamen überhaupt auch nur in den letzten eindringe: wenigstens geschieht diess nicht durch die Gewalt der Ejaculation: — sondern eher durch das von Haller angenommene Einsaugungsvermögen des Muttermundes, was im Momente der Copulation selbst thätig seyn kann. Bey verschiedenen Säugthieren, Vögeln und andern ist das Verhältniss des introducirten männlichen Zeugungsgliedes zu der Scheide, und das Verhältniss derselben zu dem Fruchthälter ein solches, dass der männliche Saamen in den letzten nicht eindringen kann. Da, wo verschiedene Beobachter bey kürzere oder längere Zeit nach der Copulation getödeten Thieren, oder verstorbenen Menschen den männlichen Saamen in der Höhle des Uterus angetroffen zu haben versichern, bleibt es immer zweifelhaft, ob nicht bloser ebenfalls an Infusorien sehr reicher Schleim, oder weiblicher Zeugungssaft sie getäuscht habe. Auf jeden Fall aber kann, was hier ausgemittelt zu haben genüget, die Befruchtung ohne materielle Vermischung der Zeugungssäfte geschehen: folglich liegt das Wesentliche der Befruchtung nicht in jener Vermischung. — Auch geschieht die Befruchtung wohl eher, als diese Vermischung möglich ist; eher, als bey den Säugthieren das Graav-sche Ey berstet, und der enthaltene Zeugungssaft sich entleert, — eher, als die gefranzten Mündungen der Fallop'schen

Röhren ſich den Ovarien anlegen, den weiblichen Zeugungsſaft aufnehmen, und in die Höhle des Fruchthälters durch periſtaltiſche Bewegung leiten. Denn die Befruchtung geſchieht doch wohl im Momente der höchſten Wohlluſt bey der Begattung: — die Anlegung der gefranzten Mündungen aber erfolgt erſt einige Zeit nach dieſem Akt. — Der männliche Saamen wirkt nicht bloſs auf das weibliche Ey, ſondern er wirkt auf den ganzen weiblichen Körper, und bringt unmittelbar nach einer fruchtbaren Begattung, ja während derſelben Erſcheinungen hervor, welche rein nervös ſind, und jenen des thieriſchen Magnetismus gleichen. Wenn nun der ihm einwohnende Geiſt, und das imponderable Princip, nach der Art eines electriſchen Leitungsprozeſſes, das ganze Nervenſyſtem des empfangenden Weibes durchdringt, ſo wird ſich doch wohl ſeine Wirkung zunächſt auch ganz beſonders auf die weiblichen Genitalien, und unter dieſen auf die Ovarien erſtrecken: und belebend auf den weiblichen Zeugungsſaft wirken. Es iſt daher gewiſs, daſs die Bläschen erſt, nachdem ſie befruchtet ſind, berſten — und durch die Fallop'ſchen Röhren herabſteigen (wornach es ſich erklären läſst, wie ſich Embryonen in den Ovarien, in den Fallop'ſchen Röhren, und in der Höhle des Unterleibes entwickeln können), — daſs aber der flüſſige und materielle Antheil des männlichen Saamens nur das Caput mortuum, die Baſis des begeiſtenden und eigentlich zeugungskräftigen Princips im Saamen ſey; — und daſs entweder keine Vermiſchung des weiblichen und männlichen Zeugungsſaftes ſtatt fin-

de, oder, wenn ſie ſtatt findet, ſie eher eine Folge als die wahrhaft begründende Urſache der Befruchtung ſey. — Befruchtung iſt ein wahrhaft ſchöpferiſcher Prozeſs, der nicht langſam auf drey Tage hinausgeſponnen, ſondern mit Einem Schlage gegeben ſeyn muſs. Wann geſchieht nun die Befruchtung nach der Lehre derer, welche die Vermiſchung der Zeugungsſäfte als nothwendig und wenſentlich anſehen? nicht im Momente der höchſten Wohlluſt, ſondern während mehrer Tage, indeſs das Graavſche Ey langſam durch die Trompeten herabſteigt, und zuletzt ſich mit dem ſchon ſehr veränderten Saamen verbindet. So wenig die Kuhpockenlymphe auf der Impfungslancette, oder der Eiter aus der Pockenpuſtel das eigentlich anſteckende iſt, und ſo wie dennoch durch Einimpfung ſolches eiterförmigen Stoffes dort Kuhpocken und hier Menſchenpocken hervorgebracht werden, — ſo wie aber auch das begeiſtende Princip der Anſteckung ſich über ſein eiterförmiges Vehikel erhebt, flüchtig wird, und nun erſt recht im Groſsen Anſteckung verbreitet; auf eben ſolche Weiſe verhält es ſich mit dem männlichen Saamen.

§. 633.

Das Geheimniſs der Fortpflanzung aber iſt dieſes. Das Männliche unterwirft ſich das Weibliche vollkommen: ohne ſolche Unterwerfung iſt keine Zeugung denkbar. Würden ſich beyde bloſs durchdringen, ſo möchte das Produkt leicht null ſeyn. Der Zeugungsprozeſs iſt ein rein poſitiver Prozeſs; und alles negative muſs, damit er wahr werde, rein

ausgetilgt werden. Es muſs aus beyden Geſchlechtern wieder, ſo wie bey den Zoophyten, Ein Individuum werden, und dieſs Eine iſt erzeugend: — daher iſt die Fortpflanzung durch Sproſſen von jener durch Keime nicht wahrhaft verſchieden: — der Mann bringt folglich ſich, und ſich allein im Weibe hervor: denn er iſt Menſch vorzugsweiſe, und er allein giebt ſeinem Geſchlechte ſo wie das Seyn, ſo den Namen. — Daher iſt auch der männliche Saamen bey allen Thier- und Pflanzengattungen ſtets Eine in ſich ſelbſt homogene Flüſſigkeit: — die gröſste Verſchiedenheit aber findet in der Beſchaffenheit des mehr zufälligen, weiblichen Zeugungsſaftes ſtatt. Ganz verwerflich iſt daher *die* Theorie der Einſchachtlung, nach welcher die Embryonen ſchon bis in das fernſte Glied in einander verſteckt liegen, und durch die Zeugung nur eine Analyſis der präformirten Keime geſchieht, eine Lehre, welche nicht einmal der Baſtarderzeugung und der Entſtehung der Miſsgeburten zur Rede ſtehen kann. Einerley Baſis mit der Evolutionstheorie hat auch die Oviparistiſche, welche ſo wie jene dem Weibe den vorzüglichſten Antheil an der Erzeugung zuſchreibt. Wer die Keime in den weiblichen Eyern präformirt annimmt, geſteht dennoch ein, daſs dieſe präformirten Keime zu ihrer Entwicklung, der Erweckung und Belebung durch den männlichen Saamen bedürfen. Ein Keim aber, der in ſich ſelbſt nicht lebenskräftig iſt, ſondern äuſſerer Belebung bedarf, iſt ein reiner Widerſpruch. Das Factum der Erzeugung ſpricht am richtigſten die Lehre von der Epigenesis aus, welcher jede Zeugung als

eine neue Schöpfung gilt. Nur mag ſie ſich von dem Materialismus und von der Atomiſtik der Saamenthierchenlehre rein halten. Herrlich iſt die Buffon'ſche Anſicht der Epigeneſe und ſeine Lehre von den organiſirenden Partikeln. Denn es ſind nicht die Zeugungstheile allein, welche erzeugen: der ganze Leib wird bey der Copulation ein Zeugungsorgan: das Haupt des Vaters erzeugt das Haupt des Embryo, des Vaters Auge bringt ſich im Auge des Embryo hervor. Daher die Uebereinſtimmung der Bildung, daher die erblichen Krankheiten u. ſ. f. Ueberhaupt aber war die Lehre von der Erzeugung immer der Tummelplatz der verſchiedenſten Meynungen und Hypotheſen. Alle giengen hervor aus einer nur einſeitigen Auffaſſung des Problems. Denn es ſind nicht die Individuen, welche zeugen; ſondern ſo wie in dieſen der unſterbliche Begriff das allein Lebendige, ſo iſt er auch das allein Leben hervorbringende: — und die Zeugung iſt nur eine ſtets neue Bewährung der Vergänglichkeit alles Beſondern, und des alleinigen Beſtehens der Idee durch den Wechſel des Seyns.

§. 634.

Gewöhnlich entſteht durch eine fruchtbare Begattung nur Ein menſchlicher Embryo. In den höhern Thierclaſſen nimmt die Anzahl der Früchte immer mehr ab. Da ſie bey den Fiſchen, Inſecten u. ſ. f. in die Tauſende geht, iſt ſie bey den Amphibien ſchon mehr beſchränkt; ſie verringert ſich noch mehr bey den Vögeln und Säugthieren. Aber auch bey dem Menſchen kommen Zwillingsſchwan-

gerſchaften vor, — im Verhältniſs zu jener der Einlinge wie 1 : 80. Trillinge verhalten ſich zu den Einlingen wie 1 : 7000. Dieſe ſind ſchon äuſſerſt ſelten lebensfähig. Die Anzahl der durch Eine Befruchtung erzeugten Embryonen hängt keineswegs von der Anzahl der geborſtenen Bläschen ab. Zwillinge bey dem Menſchen haben gewöhnlich, jeder eine beſondere Nabelſchnur, mit einer ihm angehörigen Portion des Mutterkuchens: — ſie haben ein gemeinſchaftliches Chorion, aber jeder ein beſonderes Amnios. — Die Superfötation findet bey dem menſchlichen Weibe in der Regel nicht ſtatt: da ſie bey mehreren Thieren, z. B. Hunden, nicht geläugnet werden kann. Denn nach der Empfängniſs ſchlieſst ſich bey dem menſchlichen Weibe der *Muttermund*: die Hunter'ſche Haut verſchlieſst die Mündung der Trompeten. In ſehr ſeltenen Fällen ſcheint jedoch ſehr bald nach der erſten Empfängniſs eine neue Schwängerung ſtatt gefunden zu haben.

§. 635.

In jeder Thiergattung findet ein beſtimmtes Verhältniſs der Anzahl männlicher Individuen zu jener der weiblichen ſtatt: ſo wie die Blüthen der Pflanzen ſich durch eine beſtimmte Menge von Staubfäden und von Piſtillen unterſcheiden. Daher werden im Menſchengeſchlechte in der Regel immer 21 Knaben gegen 20 Mädchen gebohren. Das Geſchlecht des Embryo wird daher zunächſt weder durch die Zeugungsthätigkeit des Vaters noch durch

jene

jene der Mutter determinirt: ſondern es iſt durch jenes Verhältniſs der gleichzeitigen Geburten unter ſich prädeſtinirt. Die Frage, warum in einem gegebenen Falle ein Mädchen und nicht ein Knabe erzeugt werde, hat ſo wenig Sinn, als die Frage, warum in der Blume an einer beſtimmten Stelle ein Piſtil und kein Staubfaden entſtehe. Vollkommen eitel ſind alle auf die Verſchiedenheit der beyden Hoden oder der beyden Bläschenſtöcke, oder auf deren gegenſeitiges Verhältniſs gegründete Erklärungen und Zeugungsvorſchriften. So wie das edlere Geſchlecht das männliche iſt, ſo begünſtigt die Präpotenz der Zeugungskraft von der Seite des Mannes allerdings das Entſtehen männlicher Embryonen: aber ganz falſch iſt es, daſs jemehr die Weiblichkeit im Weibe überwiege, deſto eher ein Mädchen erzeugt werde. Die tägliche Erfahrung widerſpricht laut. Auch ſucht das Weibliche nirgendswo ſich ſelbſt, — es ſtrebt auch nicht, ſich wieder herzubringen; ſondern ſein Streben iſt auf die Hervorbringung des männlichen gerichtet. Sonſt hängt die Beſtimmung des Geſchlechtes des Embryo auch beſonders von der Jahreszeit, von der Jahresconſtitution, von climatiſchen Einflüſſen und andern ab. Denn zu gewiſſen Zeiten werden mehr Knaben, zu andern mehr Mädchen erzeugt.

XXXI. Kapitel.

Schwangerschaft: — Physiologie des Fötus.

§. 636.

Die Schwangerschaft, welche im eigentlichsten Sinne des Wortes nur den Säugthieren zukömmt, ist mit den wichtigsten Veränderungen im Leibe der Mutter verbunden. Sie ist ein Zustand von reiner Positivität für dieselbe; da sie dem Fötus Leben giebt, ersteht ein neues höheres Leben in ihr selbst. Schwangere geniessen Immunität vor der Pest und andern contagiösen Krankheiten; Phthisische, Abzehrende gedeihen wunderbar aufs neue für einige Zeit unter dem Verlaufe der Schwangerschaft. Nevrosen, hysterische Krämpfe hören auf, mit der Empfänglichkeit für den thierischen Magnetismus. — Das Verhältniss von Mutter und Fötus unter der Schwangerschaft ist aber nur aus dem Wesen der Irritabilität zu erkennen: — denn zwischen beyden ist die vollkommenste äussere Trennung und Entgegensezung, und dennoch die höchste innere Einheit und dynamische Gemeinschaft. Die Mutter verhält sich offenbar männlich unter dem Verlaufe der Schwangerschaft; alle ihre Weiblichkeit ist gesättiget. Es ist zwischen ihr und dem Fötus ein magnetischer Rapport, von ihrer Seite activ, und passiv von jener des Fötus. Daher steht dieser unter beständiger Influenz, und in vollkommener Abhängigkeit von der Mutter: — sie bestimmt fortdauernd seine Bildung.

Obgleich keine Nervenverbindung zwischen beyden ist, und keine Gemeinschaft des Blutes, so circuliren dennoch höchst wirksame Agentien und imponderable Flüssigkeiten zwischen beyden. Daher wirken die Vorstellungen der Mutter auf den Fötus und bestimmen seine Bildung: — dieser aber empfindet die körperlichen Leiden der Mutter, so wie die Magnetisirte jene des Magnetiseurs. Die Schwangerschaft ist daher eine fortwährende, stets neue Erzeugung von der Seite der Mutter.

§. 637.

Insbesondere aber hat der Fruchthälter einen wirksamern Gegensatz in sich, und ein höheres irritables Leben zur Zeit der Schwangerschaft. Seine Gefäfse erweitern sich, und werden Blutreicher; seine Wandungen verdichten sich und es entwickelt sich das Muskelgewebe in ihnen. Gleichzeitig dehnt sich die Höhle desselben mehr aus, und zwar fängt die Ausdehnung vom Grunde an, sie setzt sich durch den Körper fort, und endet mit dem gänzlichen Zusammenfliessen der Höhle des Halses mit der Höhle des Körpers. Diese langsame Ausdehnung ist nicht die Folge vom Wachsthum des Fötus oder von der Vermehrung des Fruchtwassers, kurz, von der Vergrösserung des Eyes; was schon die gleichzeitige Veränderung der Figur des Fruchthälters und die ungleichmässige Ausdehnung seiner einzelnen Theile beweisst; sondern sie ist die Folge eigenthümlicher, expansiver Thätigkeit; da besonders im Anfange der Schwangerschaft der Grund sich ausdehnt, indess der

Muttermund ſich verengert und ſchlieſst. Auch nehmen die membranöſen Wandungen des Fruchthälters in gleichem Verhältniſs an Dicke zu, wie ſeine Höhle an Capacität.

Die Ausdehnung des Uterus iſt auch mit einer Veränderung ſeiner Lage und ſeiner räumlichen Beziehung auf die ihn umgebenden Theile verbunden. Zuerſt ſinkt derſelbe vermöge ſeiner Gewichtszunahme etwas im Becken herab, wodurch der Canal der Mutterſcheide verkürzt wird: aber in der Folge ſteigt er bey zunehmender Ausdehnung mehr in die Höhe, verläſst das kleine Becken, und durchläuft, ſenkrecht ſich erhebend, aber mit einer Inclination, gewöhnlich nach vorne, die verſchiedenen Unterleibsgegenden: — ſein Grund erreicht zuletzt ſelbſt die Magengegend. Hiebey übt nun der Fruchthälter einen Druck auf die Unterleibseingeweide aus, verdrängt dieſe aus ihrer Lage, verhindert gegen das Ende der Schwangerſchaft das Herabſteigen des Zwergfelles, drückt auch wohl, wenn er wieder herabzuſinken anfängt, auf die Urinblaſe, auf den Blaſenhals. Dadurch entſtehen allerdings verſchiedene Beſchwerden. Aber die meiſten krankhaften Erſcheinungen zur Zeit der Schwangerſchaft, z. B. das Erbrechen, die Ueblichkeiten, haben gewöhnlich einen ganz andern, rein nervöſen, Grund.

§. 638.

Sobald der Akt der Erzeugung und Conception vollbracht iſt, — hat der Embryo ein eigenes Leben für ſich. Daher nicht angenommen werden kann, daſs irgend eine weitere Bildung an demſel-

ben durch einen Anſatz mittelſt eines Niederſchlages aus einem vom Fruchthälter abgeſonderten Safte geſchehe: — ſeine ganze Bildung iſt nun eine fortwährende Entwicklung aus ſich ſelbſt; es werden dem Embryo nur ernährende Stoffe dargebothen, welche er bey der ihm einwohnenden höchſt thätigen Aſſimilationskraft in ſeine Sphäre zieht, und ſich darin, als in ſeiner Baſis, hervorbringt. Da die Zeugung ſelbſt ein plaſtiſcher Prozeſs iſt, ſo iſt auch die bildende, aſſimilirende Kraft die erſte Lebensäuſſerung des Embryo. — An ſich geſchieht die Bildung aller Theile des Embryo gleichzeitig: denn dieſer wird Menſch ſogleich im Momente der Conception. Daher auch im Produkte der Conception ſehr bald nach derſelben durch ſolche Reagentien, welche eine Gerinnung des Eyweiſsſtoffes veranlaſſen, der ganze Embryo in allen ſeinen Theilen dargeſtellt werden kann. Aber für die Entwicklung findet ein ſucceſſives Hervortreten der einzelnen Theile ſtatt: und der Streit der Bonnet'ſchen Theorie hierüber mit deren Gegnern iſt kein anderer, als jener des ewigen Seyns mit der Erſcheinung.

Die Art, wie die Mutter den Embryo ernährt, und dieſem zur Baſis ſeiner Bildung und Geſtaltung wird, iſt bey den Säugthieren, welche allein im eigentlichen Sinn des Wortes lebendig gebährend ſind, eine eigenthümliche. Bey allen andern Thieren iſt der Embryo in einem Ey eingeſchloſſen, welches, mit einer mehr oder weniger harten Schaale umgeben, auſſer dem Keime ſelbſt auch noch das Material ſeiner Suſtentation enthält. Er iſt hierdurch ſelbſt bey den Eyerlebendiggebährenden Thieren,

bey welchen das befruchtete Ey im Körper der Mutter zurückbleibt und dort bis zur Zeit des Ausschliefens bebrütet wird, mehr von der Wirkungssphäre der Mutter isolirt, und nur den imponderabeln Agentien zugängig, welche zur Zeit des Bebrütens zwischen Mutter und Embryo circuliren. Bey dem Menschen und den Säugthieren aber ist die Gemeinschaft zwischen Mutter und Embryo inniger, und die erste bereitet während der Schwangerschaft fortwährend das Material zur Ernährung des Embryo. Die Cotyledonen zwischen den Häuten des Eyes der vierfüssigen Thiere, in welchen sich die Blutgefässe des Nabelstranges verbreiten, bringen eine neue Isolation des Embryo hervor; bis bey dem Menschen und den hierin Menschenähnlichen Thieren die Cotyledonen verschwinden, und die Häute des Eyes ihre Gefässe, mit ihnen ihre Belebung von dem Fruchthälter erhalten: wesswegen sie auch entleert, z. B. wenn der Embryo durch den Abortus verlohren gieng, zuweilen noch fortwachsen, und absondern.

§. 639.

Das in den Uterus herabgestiegene, befruchtete Ey der Säugthiere bringt in diesem eine leichte, oberflächliche Entzündung hervor; unter deren Verlauf sich die Gefässe des Uterus conisch erweitern, und das Ey selbst durch adhäsive Entzündung mit der innern Oberfläche jenes Eingeweides verwächst. Diese Adhäsion beruht auf demselben Bildungsgeseze, wie die Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel: oder jene der Lungen mit der Pleura.

Die Hunter'ſche Haut iſt urſprünglich flockig, dann gallertartig, und unterſcheidet ſich nicht von andern Pſeudomembranen, durch welche benachbarte Organe an einander geheftet werden. Zuerſt ſind die Flocken der Schleimhaut des Uterus von jenen der äuſſern Oberfläche des Eyes getrennt, aber ſehr bald verwachſen ſie unter einander, die decidua und die decidua reflexa ſind nun Eines. Zuletzt verliert die Hunter'ſche Haut gänzlich ihre Selbſtſtändigkeit, ſo wie ſie mit dem Fortrücken der Schwangerſchaft immer mehr dünne wird. Sie verwächſt mit dem Chorion und bildet deſſen äuſſere, wollige und flockige Schichtung. So wie die blaſige Bildung der Anfang aller thieriſchen Geſtaltung, keine Blaſe aber einfach, ſondern immer aus zwey Häuten gebildet iſt, welche Polarität gegen einander zeigen, und zwiſchen welchen ſich eine Flüſſigkeit als Ausdruck der Indifferenz befindet (dieſs iſt die Bildung der organiſchen Hydatiden), ſo iſt auch das befruchtete Ey der Säugthiere eine ſolche aus zwey im Gegenſatz gebildeten Membranen beſtehende Blaſe. Das Chorion iſt eine den ſeröſen Häuten vergleichbare, durch die ganze Schwangerſchaft hindurch in beſtändiger Metamorphoſe begriffene Membran, ohne Nerven, und bey dem Menſchen ohne blutführende Gefäſse. Denn obgleich die letzten im Zellengewebe zwiſchen der Hunter'ſchen Haut und dem Chorion ſehr häufig zugegen ſind, ſo gelangen doch nur die feinſten Verzweigungen derſelben als exhalirende Gefäſse zu dem Chorion ſelbſt. Das Amnion ſchwimmt urſprünglich als eine kleinere Blaſe in der gröſſern, im Chorion, von

ihm durch eine Flüſſigkeit getrennt, welche nicht krankhaften Urſprunges iſt. In der Folge nähern ſich beyde einander, vermöge des raſchern Wachsthums der Schafshaut. Sie verbinden ſich unter einander durch zarte Flocken, welche ſich von Einer zur andern erſtrecken, welche nicht zellicher Natur, ſondern nach Fr. Lobstein Gefäſse ſind, die von den gröſſern Blutgefäſsen der decidua herſtammen, das Chorion durchdringen, um zu dem Amnion zu gelangen, und dort die arterielle Exhalation des Schafswaſſers zu vollbringen.

§. 640.

Die amniotiſche Flüſſigkeit nimmt in den *ſpätern* Monathen der Geſtation immer mehr *ab; ſie* iſt am Ende der Schwangerſchaft eine ſeröſe Flüſſigkeit, welche ſehr vieles Waſſer, nur eine ſehr geringe Quantität von Eyweiſsſtoff, von kochſalzſaurer Soda und phosphorſaurer Kalkerde enthält, und durch eine in ihr aufgelöste milchige Flüſſigkeit getrübt wird. Merkwürdig iſt die Miſchung des Fruchtſaftes darum, weil er zugleich ein freies Alkali und eine freie Säure (die Amnios - Säure) enthält. Wahrſcheinlich iſt das Fruchtwaſſer in den frühern Monathen der Schwangerſchaft ungleich reicher an Albumen, und ernährendem Stoff. Die amniotiſche Flüſſigkeit wurde ehmals irrig für eine Excretionsflüſſigkeit des Fötus, für deſſen Schweiſs, Urin gehalten. Sie wird aber entſchieden von dem Amnios, ſo wie von den ſeröſen Häuten die Dunſtflüſſigkeit an ihrer innern Oberfläche abgeſondert, und ſie iſt im Ey der Säugthiere daſſelbe, was das

Eyweiſs im Vogeley iſt. Die Behauptung, daſs der Fruchtſaft von den Gefäſsen des Uterus exhalirt, von den lymphatiſchen Gefäſsen der Placenta eingeſogen, und in die Höhle des Eyes ergoſſen werde, ſetzt die unrichtigſten Vorſtellungen von dem Verlaufe und der Endigung der lymphatiſchen Gefäſse voraus.

§. 641.

Der Embryo entſteht aus einer thieriſchen Flüſſigkeit. Sein erſter Lebensprozeſs iſt ein plaſtiſcher, ein Cohäſions- und Geſtaltungsprozeſs. Alles organiſche ſteht mitten inne zwiſchen dem Starren und Flüſſigen, und der Tod iſt in der vollendeten Herrſchaft des einen oder des andern Elementes. Nicht nur die unterſten Organismen, die Pristley'sche grüne Materie, jeder Organismus von was immer für einem Grade von Vollkommenheit, geht aus dem Waſſer hervor. Anfangs ſchwebt der Embryo noch wie ein Wölkchen in dem Fruchtwaſſer. So bald ſich aus dieſem irgend etwas mit Beſtimmtheit geſtaltet, unterſcheidet man zwey Bläschen, deren eines dem Kopfe, das andere dem Rumpfe entſpricht. Das Kopfbläschen iſt unverhältniſsmäſsig gröſſer als das andere. Der Gegenſatz der beyden Bläschen iſt gleich dem von Gehirn und Herz: und beyde centrirende Organe ſind auch die zuerſt unterſcheidbaren. Das Gehirn behauptet in ſeiner Entſtehung ſelbſt noch den Primat vor dem Herzen, nur iſt daſſelbe vermöge ſeiner Durchſichtigkeit nicht früher unterſcheidbar. Das Herz iſt im Momente ſeines Entſtehens ſogleich Bewegung, da-

her ein hüpfender Punkt. Indem aber das Gehirn ſogleich ſeine anziehende Kraft auf alle übrigen Organe ausübt, entſtehen die Nerven: denn dieſe ſind nur die ſichtbar gewordene actio in diſtans des Gehirns. Eigentlich iſt aber im Momente der Entſtehung des Gefäſsſyſtems überall ein Herz: denn das Blut bildet ſich fleckenweiſs und in einzelnen Tropfen, jeder als ein einzelner für ſich: — erſt in der Folge flieſsen dieſe in Eine Strömung zuſammen. Auch bemerkt man das Blut früher als ſeine Gefäſse. Das erſte alſo, was ſich im Embryo entwickelt, ſind die drey einfachen Gebilde, das zellige oder bläſige, das nervige, und die Gefäſsbildung. Aus deren Durchdringung entſtehen die einzelnen Organe, aber alle ſpäter als jene; — die *Leber*, die Lungen, Magen, Darmcanal, Nieren, Muskeln u. ſ. f. Eigenthümlich iſt die Entſtehungsgeſchichte jedes beſondern Organes. So entſtehen die Lungen im Zuſtande vollkommner Unthätigkeit in der Bruſthöhle; das Muskel - und Knochenſyſtem bildet ſich bey einer totalen Flexion aller Gelenke.

Nach Oken geht die Bildung des Gedärmes von dem Nabelbläschen aus, welches bey den menſchlichen Embryonen dieſelbe Bedeutung wie die tunica Erythroides bey den Thieren hat. Der dünne Darm und der dicke entſtehen, jeder beſonders, aus dem Bläschen, welches ſich in einen Hals verlängert, in dem die beyden Därme an einander gewachſen liegen. Später erſt ziehen ſich beyde, wenn die muskulöſe und häutige Bildung der vordern Bauchwandung ſchon vollendet iſt, in die Höhle des Unterleibs durch den Nabelring zurück;

ſie ſondern ſich hiebey von dem Bläschen ab, deſ-ſen Hals nun obliterirt als Wurmfortſatz zurückbleibt.

§. 642.

Der menſchliche Fötus durchläuft in der Höhle des Uterus ſeine Metamorphoſe auf ſolche Weiſe, daſs er alle Thierclaſſen durchgeht, aber, in keiner zurückgehalten, immer mehr das ihm eingebohrne Menſchliche entwickelt. Jede in ſeiner Metamorphoſe unterſcheidbare, einer beſtimmten Thierclaſſe entſprechende, Bildungsſtufe iſt durch das Hervortreten einer konkreten Function bezeichnet. Zuerſt hat der Embryo ganz die Geſtalt des Wurms. Die Art ſeiner Ernährung, ſein einfacher Bau, alle privativen Eigenſchaften, welche jenen Thieren zukommen, zeichnen ihn hier aus. Von den Inſekten kömmt dem Embryo nur ihr Zuſtand vor der Verwandlung zu: — denn was univerſell in dieſen iſt, das hat auch ſchon die Raupe: die Verwandlung iſt nur eine einſeitige Entwicklung, beſonders der Sinnes- und Bewegungsorgane, zu dem höchſten Grade der auf dieſer Stufe erreichbaren Vollkommenheit.

Die Differenzirung der Geſchlechtstheile, das ſichtbare Hervortreten des Geſchlechtsunterſchiedes iſt indeſſen ſein Gewinn bey dem Durchgange durch dieſe Claſſe. Die Entſtehung der Leber, der innern Organe, das Hervortreten verſchiedener Secretionen, u. ſ. f. bezeichnen deutlich das Fortrücken des Embryo aus der Claſſe der Würmer in jene der Mollusken. Nämlich noch immer iſt der Embryo

Weichwurm, ohne hartgewordenes nach innen zurückgedrängtes Skelet: der käſige Ueberzug ſeines Leibes zeigt ſelbſt die Tendenz nach Incruſtation, nach Uebergewicht der Epidermoidalbildung. Bis dahin ſtand er, gleich den übrigen weiſsblütigen Thieren, unter der Herrſchaft des Bildungstriebes; daher ſein raſches Wachsthum in der erſten Periode der Schwangerſchaft, welches um ſo langſamer wird, je mehr er ſich dem Zeitpunkte der Geburt annähert. Das irritable Leben und der durch dieſes beſtimmte Gegenſatz erwacht in ihm, ſo bald er rothes Blut und ein in ſich geſchloſſenes Gefäſsſyſtem hat. Iſt dieſe Metamorphoſe vollendet, ſo entſtehen einzelne Knochen: — und wieder iſt *der* erſte Anſatz zur Knochenbildung jene am *Schedel* und an den Wirbelbeinen. Nun iſt der Embryo in die Reihe der rothblütigen, mit Wirbelbeinen verſehenen Thiere hinübergetreten. Hirn- und Rückenmark iſt, ſo wie bey dieſen allgemein, gebildet: fünf Sinnesorgane werden deutlich unterſchieden: die Lymphgefäſse ſind vom Syſtem der rothes-Blutführenden Gefäſse abgeſondert. Die Nieren haben ihre vollkommne Ausbildung erreicht u. ſ. f. Alle dieſe Bildungen ſind wie mit Einem Schlage gegeben: der Embryo iſt Fötus geworden. Aber der Fötus iſt kaltblütiges Thier. Die vorher ſchon im erſten Monath der Schwangerſchaft, gleich dem Inſektenauge offnen und nackt hingelegten Augen ſind jetzt unter Augenliedern verborgen, da ſie die allgemeinen Bedeckungen anziehen, und dieſe als häutige Falten ſich an ſie anheften. Die Gliedmaſſen ſind noch ſehr klein, beſonders die untern.

Die Respiration ist eine Kiemenrespiration: so wie aber die Bildung der Placenta vollkommner geworden ist, beginnt auch der Gegensatz zwischen den beyden Ventrikeln des Herzens, die Kreutzung der Blutströme, — die vordern Extremitäten erlangen ein rascheres Wachsthum; die Linse im Auge verkleinert sich, es entsteht wässerige Feuchtigkeit; der Fötus ist Amphibion. Die Aeusserung von Muskelthätigkeit, und die Ortsveränderungen einzelner Gliedmassen des Fötus zeigen seinen Uebergang in eine höhere Thierclasse an. Sensibilitätsthier aber wird der Fötus erst durch die Geburt. Denn bis dahin liegt das sensible System in ihm die Sinnesorgane in tiefem Schlafe, ohne Eindrücke von aussen zu empfangen.

§. 643.

Die Placenta ist ein sehr gefäsreiches, kiemenartiges Gebilde, gewöhnlich am Grunde des Fruchthälters eingepflanzt. Indem nämlich die Flocken der Schleimhaut des Fruchthälters an allen andern Stellen mit den Flocken des Eyes verwachsen, und die Hunter'sche Haut bilden, entwickeln sie sich im Grunde in sich entgegengesetzter Richtung durch die feinste Verzweigung immer mehr, ohne in einander überzugehen. So entstehen hier zwey sich begegnende, und in sich selbst wiederkehrende Gefäsausbreitungen, deren eine dem Fötus, die andere der Mutter angehört, welche nirgends in einander offen stehen, und sich wie Blutgefäse und Luftgefäse in den Lungen verhalten. Der kindliche Antheil an der Placenta ist bey weitem der

grössere. Dieser bildet Cotyledonen, warzenförmige Erhabenheiten, welche in ihnen entsprechende Buchten im mütterlichen Antheil aufgenommen werden, — und ähnliche Vertiefungen, in welche die Gefässkegel des mütterlichen Antheils eindringen. — Innerhalb des Parenchyms der Placenta münden die Arterien der Mutter entschieden nur mit den Venen der Mutter zusammen; das Blut extravasirt daher nicht, obgleich jene Venen allerdings beträchtliche sinuöse Erweiterungen bilden. Eben so stehen die arteriellen Endigungen der Nabelgefässe mit ihren venösen Anfängen in unmittelbarer Verbindung. Die Nabelarterien anastomosiren aber nicht mit den Venen des Uterus, und dessen Arterien anastomosiren *nicht* mit den Venen das Nabelstranges: — es giebt somit keine Kreutzung der Blutströme von Mutter und Kind in der Placenta, keine kreutzförmige Verschlingung ihrer beyderley Gefässsysteme. Da auch in dem Parenchym der Placenta das mütterliche Blut nicht extravasirt, und die Venen des Nabelstranges nur das von den Arterien verführte Blut zurückführen, keineswegs aber das Geschäft der Einsaugung vollbringen; so geht überhaupt mittelst der Placenta kein Blut, und keine andere ernährende Flüssigkeit von der Mutter zu dem Kinde: — sondern im Parenchym derselben geräth das kindliche Blut der Nabelgefässe nur in die Wirkungssphäre des mütterlichen Blutes: so wie die dem Wasser beygemischte Sauerstoffluft in den Kiemen der Fische, einiger Mollusken u. s. f. auf das venöse Blut einwirkt, welches jene Kiemen durchgeht; so die Aura oxygenea im arteriellen Blut der Mutter auf

das venöſe Blut des Fötus. — Die Placenta iſt ſomit das Reſpirationsorgan des Fötus, und zwar ein auſſer ihm liegendes Reſpirationsorgan, ſo wie auch die Kiemen nach auſſen zurückgedrängte Lungen ſind. Das Gefäſsſyſtem des Fötus iſt von daher in ſich ſelbſt geſchloſſen und kreiſig wiederkehrend. Der Fötus bereitet ſein eigenes Blut; die Zahl der Pulsſchläge an der Nabelſchnur ſtimmt nicht überein mit der Zahl der Pulsſchläge der Mutter: — bey Verblutungen der Mutter entleeren ſich die Gefäſse des Fötus nicht: — die Austreibung der Placenta iſt nicht mit groſsem Blutverluſt verbunden.

§. 644.

Einſaugende Gefäſse, welche in der Placenta irgend eine Flüſſigkeit abſorbiren, und dem Fötus zuleiten könnten, giebt es in dem Nabelſtrange nicht. Gewiſs aber iſt das Verhältniſs der Gefäſse in der Placenta in deren frühern Bildungsperioden ein ganz anderes. So lange die Placenta nur aus verlängerten Filamenten und Flocken der Hunterſchen Haut beſteht, gelanget mittelſt jener Gefäſsflocken entſchieden eine von den Gefäſsflocken des Fruchthälters abgeſonderte chylöſe Flüſſigkeit zu dem Embryo. Die Venen des Nabelſtranges, welche ſich früher als die Arterien zeigen, ſind urſprünglich einſaugende Gefäſse: und erſt nachdem die Arterien ſich gebildet haben, entſteht das Capillargefäſsſyſtem, welches die Endigungen von beyden in ſich aufnimmt, und ſo das Gefäſsſyſtem als eine in ſich wiederkehrende Totalität ſchlieſst. Daher ſind bey den Venen die Aeſte früher als die Stäm-

me vorhanden, und die Stämme entſtehen nur durch die Zuſammenmündung der Aeſte. Bey den Arterien aber ſind die Stämme die früheſt gebildeten, und die Aeſte entſtehen nur durch die Expanſion des Stammes. Die Ernährung des Fötus iſt ſomit keineswegs durch die ſchon gebildete, reiſe Placenta, wohl aber während eines ſehr kurzen Zeitraumes durch die ſich bildende Placenta vermittelt. Die Periode, in welcher der Fötus mittelſt der filamentöſen Gefäſse, welche das Rudiment des künftigen Mutterkuchens darſtellen, den von der Schleimhaut des Fruchthälters abgeſonderten Milchähnlichen Nahrungsſaft abſorbirt, fällt zwiſchen diejenige, wo er die Flüſſigkeit des Nabelbläschens conſumirt, und diejenige, wo er durch die Einſaugung des Fruchtwaſſers ernährt wird. Denn das in dem Nabelbläschen Enthaltene iſt entſchieden kein Harn, ſo wenig als der Fruchtſaft Schweiſs iſt. Sondern die Flüſſigkeit des Nabelbläschens iſt ſehr nahrungsreich: ſie iſt in deſto gröſſerer Quantität vorhanden, je kleiner der Embryo iſt, der zuerſt wie ein kleiner Knopf auf der ſehr groſsen Blaſe aufſitzt. Durch den Urachus wird dieſe Flüſſigkeit dem Embryo zugeleitet; bey dem Menſchen ſchlieſst ſich dieſer, ſobald das im Nabelbläschen enthaltene conſumirt iſt.

§. 645.

In der dritten ungleich längſten Periode ernährt ſich aber der Fötus durch die Zerſetzung des amniotiſchen Waſſers. Unter allen zur Ernährung tauglichen Beſtandtheilen des Eyes iſt der Liquor amni-

amnios der constanteste: man findet ihn nicht nur in den Eyern der warmblütigen Thiere, sondern auch in weit tieferen Thierclassen, und zwar bey solchen, in deren Eyern man weder einen Mutterkuchen noch Nabelgefäße antrifft. Gewiss ist also wenigstens bey diesen, bey welchen der Fötus auf keine andere Weise ernährt werden kann, die Ernährung durch die Zersetzung des Schaafswassers vermittelt. Dasselbe ist bisweilen bey menschlichen Embryonen der Fall, welche ohne Mutterkuchen, oder ohne Nabelgefäss sich lange Zeit in dem Eye ernährten. Der Liquor amnios ist eine Flüssigkeit, welcher vermöge des Eyweissstoffes, den sie enthält, zur Ernährung sehr geschickt ist. Zwar ist nach Vauquelin und Buriva die Quantität des im Schaafswasser aufgelösten Eyweissstoffes sehr geringe. Aber beyde untersuchten den Liquor, so wie er bey der Geburt ausgeflossen war. Nun ist aber das Schaafswasser in der letzten Periode der Schwangerschaft weniger nahrhaft, weswegen auch das Wachsthum des Fötus hier weit langsamer, und geringer, als in einer frühern Epoche ist. Das Schaafswasser erleidet um diese Zeit nicht nur eine quantitative Verminderung, sondern auch eine qualitative Veränderung, welche in einer Verminderung des darin enthaltenen Eyweissstoffes besteht. Eben diese quantitative Verminderung deutet auf die Zersetzung dieser Flüssigkeit, und auf deren Verwendung zur Ernährung des Fötus hin. Die Ernährung des Fötus muss durch eine Flüssigkeit geschehen, welche nicht durch seine eigene Gefäße, sondern durch jene der

Mutter abgesondert wird; (denn die Materie zur Ernährung muss dem Fötus, so wie jedem organischen Körper, von aussen gegeben werden) diess ist aber bey dem Liquor amnios des Menschen, und der hierin Menschenähnlichen Thieren der Fall. Gegen diese Theorie der Ernährung des Fötus bleibt immer die Ernährung des Fötus der mit wahren Cotyledonen versehenen Thiere eine Schwierigkeit. Denn bey diesen sind die exhalirenden Gefäße des Schaafshäutchens offenbar Zweige der Nabelgefäße. Die Ernährung des Fötus ist gewiss durch das Lymphgefässsystem vermittelt; darauf deutet die Entwicklung des Systems der Lymphgefäße und der lymphatischen Drüsen bey dem Fötus, dessen grose *Thätigkeit* durch Versuche erwiesen ist, und dessen Präponderanz auch noch geraume Zeit in das kindliche Alter hinein fortdauert. Das lymphatische System kann nur aber in so ferne die Ernährung des Fötus vermitteln, als die absorbirenden Gefäße, welche an der Oberfläche der äussern Haut, oder an jener der Schleimhäute ausmünden, das Schaafswasser aussaugen. Man hielt die letzte Art der Absorption ehemals für das Mittel zur Ernährung des Fötus, indem man glaubte, dass der Fötus das Schaafswasser verschlucke, in seinem Magen digerire, und dass diess auf solche Weise zuerst in die chylösen Sauggefäße &c. gelange. Diess ist aber keineswegs wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass der Fötus sich zu einer Zeit von dem Schaafswasser ernähret, in welcher seine Verdauungswerkzeuge, selbst sein Mund noch wenig ausgebildet sind: ferner, dass menschliche Fötus mit imperforirtem Mund und Nasenlö-

chern ſich ſehr gut ernährten; — ferner, daſs die Flüſſigkeit, welche man gewöhnlich in dem Darmcanal antrifft, die vorausgeſetzte Aehnlichkeit mit dem Schaafswaſſer keineswegs habe. Wenn man deſſen ohngeachtet das Schaafswaſſer zuweilen gefroren in der Mundhöhle, im Schlunde, und Magen des Fötus angetroffen hat, ſo ſcheint dieſs bloſs zufällig, und vielleicht in der letzten Zeit des Lebens dahin eingedrungen zu ſeyn. Wenn es dahin gelanget, ſo wird es dort durch die chylöſen Gefäſse, welche hier die Stelle von gewöhnlichen Lymphgefäſsen vertreten, zerſetzt, und aufgeſogen, ſo wie von den abſorbirenden Gefäſsen anderer Schleimhäute, als von jener der Urinblaſe, der Geſchlechtstheile &c., ohne daſs man eine wahre Digeſtion des Schaafswaſſers durch die noch zarten Verdauungsorgane des Fötus annehmen kann. Denn der Liquor amnios iſt eine ſchon animaliſirte, und dem Fötus bis zu einem gewiſſen Grade aſſimilirte Flüſſigkeit, welche, um zur Ernährung zu dienen, derjenigen Veränderungen nicht bedarf, die den Verdauungsprozeſs der erſten Wege bilden.

Die Quantität, in welcher der Liquor in einer beſtimmten Periode der Schwangerſchaft angetroffen wird, ſteht im direkten Verhältniſſe der Gröſse der ſecernirenden Oberfläche der Schaafshaut, relativ zur Gröſse des Flächeninhaltes der abſorbirenden Haut des Fötus, und da nun zwar die abſolute Gröſse des Eyes progreſſiv in dem Verlaufe der Schwangerſchaft zunimmt, die relative Gröſse aber eine wirkliche Verminderung erleidet; ſo iſt hier-

aus zu ersehen, warum die Menge des Schaafswassers um so mehr abnimmt, je mehr der Fötus der Geburt nahe ist. Man hat den käsigen Ueberzug der Epidermis des Fötus als ein Hinderniss der Absorption des Schaafswassers durch seine Haut angeführt. Aber dieser findet in der ersten Zeit der Gestation nicht statt, und erst in der Folge schlägt sich derselbe entweder als Sediment des zäheren und viskösen Theiles des Schaafswassers, oder als Produkt der Hauttranspiration des Fötus nieder; und gerade in dieser ist auch das Wachsthum des Fötus das schnelleste.

§. 646.

So wie die Respiration des Fötus eine *wahre* Kiemenrespiration ist; so stimmt auch der Kreislauf des Blutes bey demselben mit jenem der kaltblütigen Thiere überein. Die vordern und hintern Höhlen des Herzens, welche durch das eyförmige Loch in einander offen stehen, sind gleich dem Einsackigen, in mehrere Buchten getrennten Herzen einiger Amphibien. So wie dort die Lungengefäſse kein besonderes Gefäſssystem für sich darstellen, sondern dem Aorten- und Hohladersystem untergeordnet sind; so sind diesem auch die Nabelgefäſse verbunden, da die Nabelschlagadern aus den hypogastrischen entstehen, die Nabelblutader aber in die Hohlvene aufgenommen wird. Diese führt das arterielle, im Mutterkuchen neu oxydirte Blut dem Fötus zu; und da der gröſste Theil dieses Blutes auch noch die bey dem Fötus sehr voluminöse fettige, und mit einer wahren Talgmasse in ihrem

Parenchym durchdrungene Leber durchgeht, da die Gallenabſonderung aber ſchon früher als andere Secretionen, gegen die Mitte der Schwangerſchaft eintrit; ſo gelangt ein ſehr dephlogiſticirtes Blut in den vordern Herzensſack. Dieſes wird auf die §. 387. angegebene Weiſe mehr dem Haupte und den obern Theilen, das Blut der obern Hohlader aus dem rechten Herzensventrikel durch den Botalſchen Canal und die abſteigende Aorte mehr den untern Theilen zugeführt.

Aber das Blut der Arterien und Venen des Fötus iſt ſowohl in der Farbe, als in den übrigen Eigenſchaften nur wenig unterſchieden; ſo wie auch bey den kaltblütigen Thieren die Verſchiedenheit des arteriellen und des venöſen Blutes nicht groſs iſt. Man will ſogar das Blut der Nabelvene dunkler und mehr livid als jenes der Nabelarterien gefunden haben. Die Reſpiration des Fötus in der Placenta iſt nämlich ſehr unvollkommen; und davon hängt auch die geringere Temperatur des Fötus gegen die Blutwärme der Mutter ab; da nach Authenrieth's Unterſuchung eine Verſchiedenheit von einigen Graden zwiſchen beyden obwaltet.

Der Fötus vollbringt in den ſpätern Perioden der Schwangerſchaft Muskelbewegungen, welche mit Ortsveränderungen verbunden ſind. Er ſchwimmt im Fruchtſafte, als ein ovaler Körper, aber nicht alſo zuſammengedrängt und gebogen, etwa um den geringſten Raum einzunehmen, ſondern weil er aus dem Oval entſtanden, und ſeine einzelnen Theile, Haupt, Gliedmaſsen, nur innerhalb jener Urgeſtalt vom Ganzen losgetrennte Parcellen ſind.

XXXII. Kapitel.

Geburt. Wochenbett. Lactation.

§. 647.

Vierzig Wochen vollenden gewöhnlich die Bildungsperiode des menſchlichen Fötus, während welcher er in der Höhle des Fruchthälters eingeſchloſſen iſt. Aber ſchon neun Wochen früher iſt er zu einer ſolchen Reife gelanget, daſs er getrennt von der Mutter lebensfähig iſt. — Eben ſo gut kann auch in ſeltnen Fällen der Fötus länger als vierzig Wochen innerhalb der Höhle der Gebährmutter eingeſchloſſen bleiben.

§. 648.

Am Ende dieſer Epoche iſt nun der Fötus zu einem Grade von Selbſtſtändigkeit, und Individualität gelanget, daſs er unabhängig, und auſſerhalb des Leibes der Mutter zu leben vermag. Es entſtehen nun ſchmerzhafte Zuſammenziehungen des Uterus; Wehen, welche man in die vorbereitenden, erſchütternden, und Nachwehen unterſcheidet. Die Wehen haben das Eigenthümliche, daſs bey ihnen der Grund des Uterus ſich contrahirt, aber der Mund erweitert, ſo wie im Anfange der Schwangerſchaft der Grund zuerſt ſich erweiterte und der Muttermund ſich ſchloſs. Der Grund iſt das meiſt expandirte, folglich geht dort zuerſt die expanſive

Bewegung in die contractive über; indeſs noch fortdauernd der verſtrichene Hals weiterhin expandirt wird. — Zur Erweiterung des Muttermundes trägt das keilförmige Eindringen der Blaſe, in welcher der Fötus mit dem noch übrigen Schaafswaſſer enthalten iſt, vieles bey. Dieſe Blaſe ſpannt ſich immer mehr an, reiſst endlich, und nun trit der Kopf, mit welchem das Kind bey regelmäſsigen Geburtslagen eintrit, in den Muttermund ſelbſt ein; dieſer beſchreibt bey ſeinem Durchgange durch die Beckenhöhle eine drehende Bewegung, eine wahre Axendrehung; ſeine Knochen ſchieben ſich vermöge der bloſs membranöſen Verbindung der einzelnen Knochen über einander; das Volumen des Kopfes wird hierdurch um ſehr vieles vermindert, dieſer durchbricht endlich den Ausgang des Beckens, dehnt die weichen Geburtstheile aus, wird gebohren, und gewöhnlich ohne groſses Hinderniſs folgen alsdann die Schultern, und der übrige Körper nach.

In der engſten Beziehung ſtehen auf einander die Gebährmutter und die Brüſte. Zu gleicher Zeit trit die Periode der Reife in beyden Organen ein, und zugleich fallen beyde in Decrepidität. Gewiſs gehören die Brüſte in die Reihe der Geſchlechtstheile ſelbſt, und ſie drücken den weiblichen Geſchlechtscharacter in der männlichen Form aus. —

Die Sympathie der Brüſte und Zeugungstheile ſuchte man aus ihrer Nerven- und Gefäſsverbindung zu erklären: dieſe iſt aber nicht die Urſache ſondern die Folge von jener. —

Die Brüſte turgesciren ſchon während der Schwangerſchaft an; aber am meiſten ſind ſie nach der Geburt angeſchwollen. Die Bruſtdrüſen ſtellen eine viel körnigte Drüſe dar, welche an der äuſſern Oberfläche des Thorax in häufiger fettiger Celluloſität gelagert, und in einzelne fächerförmige Parthien getrennt iſt. — Die Ausführungsgänge derſelben laufen nicht baumförmig, oder gefiedert, ſondern mehr gegen Ein Zentrum ſtrahlend zuſammen, und öfnen ſich mit mehrern vereinzelten Ausmündungen in die Bruſtwarze. Die ganze Bildung der Bruſtdrüſe ſtellt ſo, wie jede andere Drüſenbildung nur eine excentriſche Metamorphoſe einer Schleimhaut dar; und dieſe Schleimhaut, *welche* in die Bildung der Bruſtdrüſe hineingezogen wird, iſt nach B i c h a t die dritte Gruppe im Syſtem der Schleimhäute. Die Bruſtdrüſen beſitzen relativ zu ihrem Umfange ſehr wenige Blutgefäſse: dagegen ſind die lymphatiſchen Gefäſse in ihnen überwiegend: zu den Blutgefäſsen wie 8 - 1. Die Lymphgefäſse, welche in bewunderungswürdiger Menge in die Bildung der Brüſte eingehen, nehmen bey ſäugenden Frauen ſehr vieles am Durchmeſſer zu, und bey genauen Injectionen ſieht man deutlich, wie ſich mehrere von ihnen in einen Stamm vereinigen, der ſich gegen die Bruſtwarze zukehrt, und einen Milchleiter bildet. Dieſs beweiſst wenigſtens einen unmittelbaren Uebergang der Lymphgefäſse der Brüſte in ihre drüſigten Ausführungsgänge: und ſomit iſt hier die Secretion durch Gefäſse der unterſten Ordnung, nämlich durch lymphatiſche Ge-

Gefäſse, ſo wie in andern Drüſen durch die Thätigkeit der Blutgefäſse vermittelt.

Die Bruſtdrüſen ſelbſt gleichen daher, ſo wie der Stoff zur Abſonderung der Milch ihnen von den lymphatiſchen Gefäſsen zugeführt wird, in ihrem Baue auch mehr den lymphatiſchen, als den conglomerirten Drüſen. Man entdeckt unter allen drüſigten Eingeweiden an den Brüſten am ſchwereſten den körnigten Bau.

Zur häufigen Secretion der Milch trägt beſonders das Säugen des Kindes ſelbſt, und das Betaſten der Brüſte vieles bey. Die Bruſtwarzen gerathen hiebey in eine wahre Erection, und die vorher flacciden, und eingefallenen Brüſte ſtrotzen nun von Milch.

Die Milchabſonderung findet auch zuweilen bey unverheuratheten Mädchen, bey Knaben ſtatt.

Die Milchabſonderung iſt die fortgeſetzte Beziehung des Bildens und Producirens der Mutter auf den Fötus, und vermittelt eine fortdauernde Gemeinſchaft, auch des ernährenden Stoffes zwiſchen der Mutter und dem Neugebohrnen. Bey dem Saugen zieht theils der Neugebohrne die kegelförmige Spitze der Bruſtwarze gegen ſich an, theils macht er durch das Ausſaugen in den Ausführungsgängen der Milch einen luftleeren Raum, und nun flieſst die Milch von ſelbſt aus.

Die Milch iſt meiſtens der Quantität und Qualität nach betrachtet proportional den genoſſenen Nahrungsmitteln; gewöhnlich macht ſie 1/3 ihres Gewichtes aus; ihre Conſiſtenz und ernährende Ei-

genſchaft aber wird von der ernährenden Eigenſchaft der genoſſenen Speiſen und Getränke der Amme beſtimmt. Die Conſiſtenz der menſchlichen Milch iſt geringer, als jene der Milch der Ziege, der Kuh, der Eſelin. Die Milch beſteht aus den Molken, welche Milchzuckerſäure und Milchzucker, in geringerer oder gröſſerer Quantität Waſſers aufgelöst, enthalten, — aus dem käſigten Theile, welcher ein ſehr oxydirter Eyweiſsſtoff iſt, — und aus dem butterigten, welcher ein fettes Oel in einem geringen Oxydationsgrade darſtellt. Die Milch alſo enthält ſehr wenig Azot, dagegen vielen Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und Sauerſtoff. — Die in ihr enthaltenen Salze ſind beſonders kochſalzſaure *Soda*, kochſalzſaure Pottaſche, und phosphorſaure Kalkerde. —

Die Milch hat alſo in ihren Miſchungsverhältniſſen ſehr wenig Analogie mit dem Chylus der Amme, wohl aber iſt ſie als der Chylus des Säuglings zu betrachten. Die Milch iſt zwar höchſt leicht verdaulich für die noch ſchwachen Verdauungsorgane des Kindes (beſonders die Milch von einer Amme, welche gleiche Perioden mit dem Kinde durchläuft); aber ſie erfordert doch eine eigenthümliche Subaction.

Was die Milch für die Säugthiere, das iſt der Dotter in den Eyern der Vögel und anderer. Denn dieſer zieht ſich kurze Zeit vor dem Ausſchliefen des Fötus durch den Dottergang in den Darmcanal, bey andern, z. B. bey einigen Knorpelfiſchen in den Magen herein: — und dient wäh-

rend der erſten Wochen zur Ernährung des Neugebohrnen.

Leztes Kapitel.

Von dem Tode und von der Fäulniſs.

§. 649.

Iſt das Werk der Erzeugung und Fortpflanzung vollbracht, und die neue Generation herangewachſen, ſo wird die Vorhergehende dem Tode und der Verwandlung ihres ſterblichen Antheiles übergeben. Denn ſie iſt unkräftig und alternd geworden; und ſie weicht dem jüngern und kräftigern, in welchem das Leben noch friſch und neuer Entfaltung fähig iſt. Daher ſteht in jeder Thiergattung die Kindheit im Verhältniſſe der Lebensdauer. Denn die Erziehung iſt noch ein Theil der Fortpflanzung.

§. 650.

Auch der Tod und die Fäulniſs gehören dem Leben an: nirgends iſt eine Vertilgung des Lebens, überall nur Verwandlung und Wiedergeburt zu neuem Seyn. Der Tod iſt ſelbſt ein beſtändiger Begleiter des Lebens. Mit der Geburt ſterben mehrere Organe des Fötus: der Wechſel des Stoffes iſt ein ſtets ſich erneuender Tod. — Mit dem Eintrite der Decrepidität werden viele Organe, z. B. die Brüſte, der Fruchthälter des weiblichen Geſchlechtes dem Tode übergeben; daher degeneriren ſie ſo leicht

um diese Zeit, und in den Ovarien bildet sich die Wallrathmasse, welche überall ein Rückstand von langsamer Verwesung ist. Das ganze Greisenalter ist der Anfang des eigentlichen Todes: — und bey dem Tode aus Marasmus sterben nur einzelne Organe und Systeme, da jetzt das Leben in andern unter neuen bisher nicht gekannten Thätigkeitsformen erwacht.

§. 651.

Aller Tod, sowohl der natürliche als der zufällige, durch Krankheiten oder Verletzungen herbeygeführte, geht von dem Gehirne oder von dem Herzen aus. Das Erlöschen der Lebensthätigkeit in dem Einen bringt auch die Lähmung des andern, und jene der übrigen Organe hervor. Daher sind die Phönomene des Todes zusammengesetzt aus den Phönomenen der Starrsucht und jenen der Ohnmacht: die erste ist ein Scheintod des Gehirns (der Nerven), die zweyte ist ein Scheintod des Herzens (des Blutes). Aber nur in einer Hemmung der Function des Nervensystems, im Aufhören der Muskelbewegung, des Athemholens und des Blutumlaufes besteht der insgemein sogenannte Tod. Weiter hinab erstreckt sich seine Wirkung nicht, und die Ernährung, das Wachsthum einiger Theile, z. B. der Haare, die Einsaugung, selbst einige Absonderungen dauern noch einige Zeit nach dem Tode fort.

§. 652.

Die erste Zeit nach dem Tode, so lange die Verwesung noch nicht begonnen hat, ist überhaupt

von dem Scheintode wenig oder nicht unterſchieden. Die Empfänglichkeit für die Wiederbelebung iſt in beyden Fällen problematiſch; und ſo wie die letzten Lebensjahre des Greiſen ein Zuſtand von äuſſerer Unthätigkeit und Entkräftung waren, ſo fällt auch in dieſe Periode die eigentliche Todesruhe: es ſind jetzt nur einige Organe mehr unthätig geworden, und das Senſorium hat auf die gewöhnliche Weiſe zu wirken aufgehört. Nichts berechtigt aber anzunehmen, daſs die Seele jetzt mit ihrem dem Tode übergebenen Leibe auf keine Weiſe mehr in Verbindung ſtehe; und denen, welche aus dieſem Zuſtande in das Leben wiederkehren, folgt, obgleich kein Bewuſstſeyn des vergangenen Zuſtandes, doch die Erinnerung an die genoſſene höchſte Luſt und an eine verklärte Art des Seyns.

§. 653.

Indem aber dennoch bey dem Tode das Band zerreiſst, welches die Seele mit dem Leibe zuſammenhält, dieſe aber beſonders auf das Nervenſyſtem ſchaffend und belebend, d. h. ſich daſſelbe als Baſiſches unterwerfend, einwirkt, ſo daſs nun die übrigen Syſteme, z. B. das Muskelſyſtem, dem Nervenſyſtem eben ſo, wie dieſes ſelbſt der Seele, unterworfen ſind; — ſo hört auch mit dem Tode die Unterordnung der niedern Syſteme unter die höhern unmittelbar auf. Beſonders ſagt ſich das Muskelſyſtem ſchon im Momente des Todes von der Herrſchaft des Nervenſyſtems los, und da nun die Muskelthätigkeit der Nerventhätigkeit nicht mehr untergeordnet, d. h. da ſie eine unwillkührliche gewor-

den ist, so trit im Momente des Todes eine allgemeine Contraction und darauf folgende Steifigkeit aller Muskeln und Unbiegsamkeit der Gelenke ein. Da nur der Nerveneinfluss und die Macht des Willens das natürliche Uebergewicht der Streckkraft im Muskelsysteme aufhebt, und die Beugekraft in das Gleichgewicht mit derselben setzt, so stellt sich im Momente des Todes das Uebergewicht der Streckkraft wieder her, und der Erstarrte stirbt im Momente der grössten Streckung aller Gelenke. Die Todtenkälte und Blässe, welche dem Leichnam in dieser Periode zukömmt, ist eine Folge der Unthätigkeit des Gefässsystems, welches sein Leben nur von den Gefässnerven hat, und mit diesen erstorben ist.

Aber diese Periode, welche durch die Herrschaft des Muskelsystems bezeichnet ist, geht nach einigen Tagen zu Ende, und nun fängt eine neue Lebensregung im Blute, und im Gefässystem an. *Das* Blut fängt an sich aufzulösen, es wird durch die dabey entbundene Wärme mehr ausgedehnt; neu flüssig, kehrt es von den innern Theilen nach den äussern zurück. Gleichzeitig beginnt die Gasentwicklung im Unterleib; und jetzt entsteht bey allen Leichnamen ein Meteorismus, wenn er nicht schon während der Krankheit, welche dem Tode vorhergieng, zugegen war. In dem letzten Falle war diese Periode der Verwesung schon während des Lebens eingetreten. Immer fängt die Verwesung in den Eingeweiden des Unterleibes, in den Zeugungstheilen und in der Haut an. Merkwürdig ist die Anschwellung und der Erethismus der Zeugungstheile schon während des Todes, nicht bloss bey Gehenkten, sondern auch bey vielen andern Todesarten. So wie bey der Suppuration das Eiter zuerst nur in Einem abscedirten Punkte entsteht, und von diesem aus durch Contagion die benachbarten Gebilde sich assimilirt, so wird vorzüglich im Unterleibe das Ferment der faulen Gährung bereitet, welches, von ihm ausgehend, sich den übrigen Organen mittheilt. Die im Unterleib erzeugten Gasarten dehnen diesen

übermässig aus, bis zum Zerbersten. Ueberhaupt sind alle Theile des Leibes in dieser Periode von dem Triebe, sich zu verflüchtigen, in das Reich der Atmosphäre zu versenken, und in den Lichtzustand überzugehen (zu phosphoresciren, zu leuchten) beherrscht; und hierin offenbart sich die eigenthümliche Bedeutung der Fäulniss, welche nur eine andere Art der Verbrennung, und Ausdruck der Sehnsucht der endlichen Dinge ist, von welcher getrieben sie dem konkreten Seyn zu entrinnen, und durch die Aufnahme in das Reich der Lüfte in das ursprüngliche Seyn zurückzukehren trachten. Alle thierischen und vegetabilischen Körper leuchten bey der Verwesung: — von verwesenden Körpern ist der fixe Rückstand, so wie von verbrannten, sehr geringe; und besonders die schnelle Fäulniss hat mit dem spontanen Verbrennen, welches bey einigen Menschen beobachtet wurde, die grösste Aehnlichkeit. Im Anfange der zweyten Periode der Fäulniss entbindet sich zwar die verhältnissmässig grösste Quantität von Stickgass und von Ammonium; aber in der Folge nimmt das Wasserstoffgass, im gephosphorten, geschwefelten und gekohlten Zustande immer mehr die Oberhand, und insbesondere ist dieser Gassart und dem mit ihr verflüchtigten Phosphor ihr Vermögen zu leuchten und sich zu entzünden, der fürchterliche und wahrhaft verpestende Geruch, zuletzt der schillernde Glanz und das bunte Farbenspiel, welches faulenden Körpern eigenthümlich ist, zuzuschreiben. Gegen das Ende der Verwesung entbindet sich vorzüglich kohlensaures Gass; nun verliert sich der widrige aashafte Geruch immer mehr und weicht einem Duft wie von frischer Erde: zugleich wird auch die Farbe der verwesten Leichname dunkler. Der letzte Rückstand von der Verwesung ist eine Verbindung von einem besondern Oele mit verschiedenen Salzen von erdiger Basis, — eine fettige, talgartige Erde, — ein schleimiges, seifenartiges Wesen, welches, aller besonderer Qualitäten beraubt, in einem Potenzlosen Zustande eben darum jeder Potenzirung fähig, und mit der grössten Re-

ceptivität begabt, die Grundlage aller thierischen und vegetabilischen Gebildung ist. Keineswegs ist also die Fäulniss ein Zerfallen in Infusorien; sondern diese sind eben sowohl, als andere lebende Wesen, schon eine besondere Modification der belebten Materie, keineswegs die einfachen Lebenskeime; damit sie bey der Fäulniss entstehen, müssen die ihrem Leben günstigen Bedingungen in der faulenden infundirten Substanz eintreten.

§. 654.

Je vollkommner und schneller die Fäulniss vor sich geht, desto geringer ist auch der Rückstand jener öligen Erde. Dagegen erscheint als Produkt der sehr langsamen und unvollkommenen, im Anfang der zweyten Periode unterbrochenen Verwesung die Wachstalgmasse, in welche sich die Leichname in der Umgebung vieler anderer verwesender Körper, dadurch der Einwirkung der Luft und des Wassers beraubt, nach einigen Jahren verwandeln. Denn so wie Luft, Wärme und Wasser die allgemeinen Bedingungen des Lebens und aller vitalen Prozesse sind, so ist auch das gute Vonstattengehen der Verwesung an diese Bedingungen gebunden. Alle Theile des Leibes ohne Ausnahme, selbst fibröse und knorpliche Theile, werden hiebey in solche Fett - Talgmasse verwandelt; ja die Knochen selbst werden mit derselben innerlich durchdrungen.

§. 655.

Also ist die Fäulniss nur der letzte unter den vitalen Prozessen; überall aber und in allen ist nur das Leben allein thätig, rastlos, bestrebt sich selbst umzugestalten, seine Erzeugnisse wieder verzehrend, und durch den ewigen Wechsel der Dinge allein in steter Selbstgleichheit und Unvergänglichkeit ruhend.

Bayerische Staatsbibliothek München

Sinnstörende Druckfehler.

Der Leser wird ersucht, folgende sinnstörende Druckfehler vor Durchlesung des Buches zu verbessern:

Seite	Zeile	statt	liefs
1	7	Blutlauf	Blutumlauf
3	l. Zeile:	vorzüglich von Campetti	vorzüglich an Campetti
24	16	linken Ventrikel	rechten Ventrikel
71	5	blofsen Muskelfasern	blafsen Muskelfasern
82	11	sowohl mechanische	sowohl durch die mechanische
82	18	asphyxheten	asphyxirten
86	14	System	System der gröfsern Gefäfse
86	24	Organes	Organismus
115	15	Nicht nur das	Nicht das
115	17	sondern auch das	sondern das
120	4	Mayer	Mayow
121	28	Spine	Spina
139	27	arteriellen	materiellen
144	22	zwischen	des
151	27	Refinitäten	Afinitäten
271	26	negative	positive
284	8	drücken	deuten
288	27	durchgängig gleich	durchgängig
291	4	Sehnerve	Hörnerve
305	8	breiteren	schmalern
321	23	Iris	Chorioidea

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Walther, Philipp Franz <<von>>,

Physiologie des Menschen, mit durchgängiger Rücksicht auf die comparative Physiologie der Thiere

Bd.: 2

Landshut (1808)

Bibl.Mont. 3807-2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10723778-3